



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Министерство образования Республики Беларусь  
Белорусский государственный университет  
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины  
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  
Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, Россия).

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

# ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО

## Часть 1

В.Г. Кротов, Е.А. Ровба, Е.А. Сетько,  
К.А. Смотрицкий, А.П. Старовойтов, В.Н.Худенко

---

Общая информация

Часть I. Теория

Часть II. Задачи

---

ЭУМК предназначен для информационно-методического обеспечения преподавания дисциплины «Теория функций комплексного переменного» по всем специальностям в высших учебных заведениях Республики Беларусь.

Дата сборки: 7 февраля 2017 г.



Меню

Общая информация



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

# Общая информация

Методические указания

Типовые программы курсов

Рекомендуемая литература



Меню

Общая информация  
Методические указания



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

# Методические указания

Запуск ЭУМК

Принцип построения и структура

Замечания по навигации

Рекомендации для преподавателя

Рекомендации для студента



## Запуск ЭУМК

ЭУМК поставляется на компакт-диске. Стандартный комплект включает:

- данный файл в формате pdf, находящийся в корневом каталоге диска;
- дистрибутив свободно распространяемого программного средства Adobe Reader для чтения файлов в формате pdf.

ЭУМК не предъявляет никаких специальных требований к системе. Для работы достаточно компьютера с установленной на нём любой современной операционной системой и программой просмотра файлов формата pdf. Для семейства операционных систем MS Windows рекомендуется программа Adobe Reader версии не ниже 9 или Foxit Reader версии не ниже 4.0.

Инсталляция программы Adobe Reader осуществляется стандартным образом. Запустите файл setup.exe дистрибутива и следуйте инструкциям.

УМК можно запустить непосредственно с компакт-диска или скопировать все файлы в каталог на жёстком диске. Для запуска учебника обычно достаточно дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши, указав на pdf-файл учебника. В случае необходимости можно открыть учебник программным средством, отличным от установленного по умолчанию. Для этого следует выделить файл учебника левой кнопкой мыши и нажать на правую кнопку. В выпавшем контекстном меню можно выбрать требуемое программное средство, например, Adobe Reader.



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Принцип построения и структура

ЭУМК состоит из следующих структурных частей:

- методических указаний, содержащих различную методическую и справочную информацию;
- теоретической части с лекционными материалами по курсу;
- практической части с заданиями для практических занятий.

В левой части экрана расположена панель навигации, содержащая систему вложенных закладок на структурные элементы учебника. Окно с текстом учебника снабжено дополнительными кнопками навигации. Все учебные материалы связаны между собой гиперссылками.



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Замечания по навигации

Работа с данным электронным учебником возможна в нескольких направлениях:

- 1) изучение (повторение) всего материала целиком или некоторых тем по отдельности,
- 2) повторение основных понятий и определений.

Вне зависимости от цели при работе с гиперссылками следует придерживаться следующих правил.

- 1) При возвращении на предыдущее место в электронном учебнике следует использовать кнопки навигации, расположенные в верхней части страницы.
- 2) Кнопка «Перейти к основному тексту» в предметном указателе и списке определений позволяет перейти в тому месту в учебнике, где вводится соответствующее понятие. Аналогичным образом используется кнопка «Вернуться к условию» в решениях и указаниях, а также ответах к задачам.



Меню

Общая информация  
Методические указания  
Рекомендации для преподавателя



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Рекомендации для преподавателя

Лекции

Организация практических занятий



Меню

Общая информация

Методические указания

Рекомендации для преподавателя

Лекции



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Лекции

Несомненным достоинством данного ЭУМК является возможность его использования на лекциях в качестве презентационного материала. Для этого необходимо перейти к странице, которая будет использоваться в качестве начальной в презентации к данной лекции и включить полноэкранный режим с помощью специальной кнопки, комбинации клавиш `Ctrl+L` либо клавиши `F11`. Далее по страницам перемещаются, используя гиперссылки и встроенные в страницы средства навигации.

Целесообразно выдавать данный ЭУМК студентам до начала чтения курса. Можно рекомендовать студентам распечатать лекционные материалы на одной стороне листов бумаги, переплести и использовать полученный альбом в качестве конспекта лекций. При этом чистые стороны листов используются для записи пояснений и дополнений лектора к представленному материалу. Это избавляет студентов от необходимости переписывать содержание презентаций и, в то же время, позволяет зафиксировать комментарии и дополнения лектора.

Эффективное использование ЭУМК для изучения теоретического материала предполагает организацию самостоятельной работы студентов перед лекциями. Следует требовать, чтобы перед лекцией студенты ознакомились с соответствующими статьями ЭУМК.





Меню

[Общая информация](#)

[Методические указания](#)

[Рекомендации для преподавателя](#)

[Организация практических занятий](#)



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Организация практических занятий

Для организации практических занятий целесообразно использовать систему задач и упражнений, включённую в ЭУМК.

Задачи и упражнения структурированы по разделам курса. Большинство из них снабжены ответами, а некоторые — решениями или указаниями.



Меню

Общая информация  
Методические указания  
Рекомендации для студента



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Рекомендации для студента

Изучение теоретического материала

Практические занятия



Меню

[Общая информация](#)

[Методические указания](#)

[Рекомендации для студента](#)

[Изучение теоретического материала](#)



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Изучение теоретического материала

Перед лекцией изучите материалы ЭУМК, связанные с темой следующей лекции. Будьте готовы к тому, что преподаватель не будет повторять на лекциях материалы, включённые в настоящий ЭУМК. Зафиксируйте вопросы, которые у Вас возникли с тем, чтобы задать их преподавателю. Если лектор до начала чтения курса лекций выдал вам лекционные материалы, распечатайте их на одной стороне листов бумаги, переплетите и используйте полученный альбом в качестве конспекта лекций. При этом чистые стороны листов можно использовать для записи пояснений и дополнений лектора к представленному материалу. Это избавит Вас от необходимости переписывать содержание презентаций и, в то же время, позволит зафиксировать комментарии и дополнения лектора.



Меню

[Общая информация](#)  
[Методические указания](#)  
[Рекомендации для студента](#)  
[Практические занятия](#)



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Практические занятия

Получите у преподавателя номера задач. Большинство задач снабжены гиперссыками на ответы, некоторая часть — на решения или указания. Прежде, чем смотреть решение, указание или ответ, постарайтесь решить задачу самостоятельно.



Меню

Общая информация  
Типовые программы курсов



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

# Типовые программы курсов

[Указатель по направлениям и специальностям](#)

[Список учебных программ](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Указатель по направлениям и специальностям

1–31 03 01 Математика (по направлениям):

- 1–31 03 01–01 Математика (научно-производственная деятельность),
- 1–31 03 01–02 Математика (научно-педагогическая деятельность),
- 1–31 03 01–03 Математика (экономическая деятельность).

1–31 03 02 Механика и математическое моделирование.



Меню

Общая информация  
Типовые программы курсов  
Список учебных программ



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Список учебных программ

Теория функции комплексного переменного. Регистрационный номер: ТД-G.488/тип. Составители:  
В.Г. Кротов , И.Л. Васильев, Э.И. Зверович.



## Рекомендуемая литература

- [1] Сидоров Ю.В., Федорюк М.Ф., Шабунин М.И. Лекции по ТФКП. М.: Наука, 1989.
- [2] Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. Ч.1. М.: Наука, 1976.
- [3] Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. М.: Наука, 1973.
- [4] Зверович Э.И. Вещественный и комплексный анализ. Т.6. Мн.: Вышэйшая школа, 2008.
- [5] Александров И.А., Соболев В.В. Аналитические функции комплексного переменного. М.: Высшая школа, 1984.
- [6] Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций комплексного переменного. М.: Наука, 1970.
- [7] Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т.1,2. М.: Наука, 1968.
- [8] Евграфов М.А. Аналитические функции. М.: Наука, 1968.
- [9] Свешников А.Г., Тихонов А.Н. Теория функций комплексной переменной. М.: Наука, 1974.
- [10] Сборник задач по теории аналитических функций / Под. ред. М.А. Евграфова. М.: Наука, 1972.
- [11] Поля Г., Сёге Г. Задачи и теоремы из анализа. Т.1,2. М.: Наука, 1978.
- [12] Гурвиц А., Курант Р. Теория функций. М.: Наука, 1968.





# Часть I

# Теория

Глава 1. Введение в комплексный анализ

Глава 2. Дифференцируемость

Глава 3. Интегральные теорема и формула Коши

Глава 4. Последовательности и ряды

Глава 5. Ряды Лорана

Глава 6. Теория вычетов

Глава 7. Дополнительные главы комплексного анализа

Предметный указатель

Определения



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

# Глава 1

## Введение в комплексный анализ

- 1.1. Множество комплексных чисел
- 1.2. Расширенная комплексная плоскость
- 1.3. Предел и непрерывность
- 1.4. Кривые и области



Меню

Часть I. Теория

Глава 1. Введение в комплексный анализ

1.1. Множество комплексных чисел



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 1.1. Множество комплексных чисел

1.1.1. Операции с комплексными числами

1.1.2. Поле комплексных чисел

1.1.3. Алгебраическая форма записи

1.1.4. Тригонометрическая форма записи



### 1.1.1. Операции с комплексными числами

Всюду ниже множество всех действительных чисел обозначается общепринятым символом  $\mathbb{R}$ .

**Определение 1.1.** *Множество всех комплексных чисел (комплексная плоскость)*  $\mathbb{C}$  определяется как множество

$$\mathbb{C} := \{z = (x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

всех упорядоченных пар действительных чисел, на котором определены отношение равенства и две операции — сложения и умножения.

*Равенство.* Две пары  $z_1 = (x_1, y_1) \in \mathbb{C}$  и  $z_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{C}$  называются равными, если  $x_1 = x_2$  и  $y_1 = y_2$ .

*Сложение.* Суммой элементов  $z_1 = (x_1, y_1) \in \mathbb{C}$  и  $z_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{C}$  называется

$$z_1 + z_2 := (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

*Умножение.* Произведением элементов  $z_1 = (x_1, y_1) \in \mathbb{C}$  и  $z_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{C}$  называется

$$z_1 \cdot z_2 := (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1).$$

Как и в случае действительных чисел мы чаще будем опускать знак операции умножения (точку) и писать просто  $z_1z_2$  вместо  $z_1 \cdot z_2$ .

Первый элемент пары  $z = (x, y) \in \mathbb{C}$  будем называть *действительной частью*  $z$ , а второй — *мнимой частью*  $z$  (основания для этого у нас скоро появятся). Для них используются следующие стандартные обозначения

$$\operatorname{Re} z := x, \quad \operatorname{Im} z := y.$$

Как множество комплексная плоскость  $\mathbb{C}$  совпадает с обычной плоскостью  $\mathbb{R}^2$ . Отношение равенства и операция сложения тоже определяются точно так же, как и для  $\mathbb{R}^2$ . Специфика множества комплексных чисел  $\mathbb{C}$  начинает проявляться тогда, когда мы вводим умножение — напомним, что в  $\mathbb{R}^2$  умножение вообще не вводится.



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 1.1.2. Поле комплексных чисел

Непосредственной проверкой легко убедиться (мы рекомендуем выполнить это самостоятельно), что сложение комплексных чисел обладает следующими свойствами:

- 1)  $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$  для любых  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$  (коммутативность сложения),
- 2)  $z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$  для любых  $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$  (ассоциативность сложения),
- 3)  $z + (0, 0) = z$  для любого  $z \in \mathbb{C}$  (элемент  $(0, 0)$  является нейтральным элементом для сложения),
- 4) для любого  $z = (x, y) \in \mathbb{C}$  существует противоположный элемент  $-z = (-x, -y) \in \mathbb{C}$  со свойством  $z + (-z) = (0, 0)$ .

Свойства 1)–4) означают, что  $\mathbb{C}$  является коммутативной группой относительно введенной операции сложения.

Умножение комплексных чисел обладает такими свойствами:

- 5)  $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$  для любых  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$  (коммутативность умножения),
- 6)  $z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3) = (z_1 \cdot z_2) \cdot z_3$  для любых  $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$  (ассоциативность умножения),
- 7)  $z \cdot (1, 0) = z$  для любого  $z \in \mathbb{C}$  (элемент  $(1, 0)$  является нейтральным элементом для умножения),
- 8) для любого  $z = (x, y) \in \mathbb{C}$ ,  $z \neq (0, 0)$ , в  $\mathbb{C}$  существует обратный элемент

$$z^{-1} = \left( \frac{x}{x^2 + y^2}, -\frac{y}{x^2 + y^2} \right)$$

со свойством  $z \cdot z^{-1} = (1, 0)$ .

Свойства 5)–8) означают, что  $\mathbb{C}$  является коммутативной группой относительно введенной операции умножения.

Кроме того, операции сложения и умножения связаны дистрибутивным законом

- 9) для любых  $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$  выполнено равенство  $z_1(z_2 + z_3) = z_1z_2 + z_1z_3$ .

Полный набор свойств 1)–9) говорит нам о том, что множество комплексных чисел  $\mathbb{C}$  с указанными операциями сложения и умножения является полем. Оно называется *полем комплексных чисел* и обозначается тем же символом  $\mathbb{C}$ .



### 1.1.3. Алгебраическая форма записи

Множество действительных чисел  $\mathbb{R}$  естественным образом вкладывается в  $\mathbb{C}$ . Это делается с помощью взаимно-однозначного отображения

$$\mathbb{R} \ni x \mapsto (x, 0) \in \mathbb{C}.$$

Мы будем ниже систематически использовать это отождествление действительных чисел, как комплексных, и часто вместо  $(x, 0)$  будем писать просто  $x$ . Таким образом, пара  $(0, 0)$  отождествляется нами с действительным числом  $0$ , а пара  $(1, 0)$  — с  $1$ . Скоро мы увидим выгоду от этого.

Рассмотрим еще одно специальное комплексное число  $i = (0, 1)$ , которое в дальнейшем будет называться *мнимой единицей*. По определению умножения комплексных чисел легко убедиться (сделайте это самостоятельно), что

$$i^2 = -1.$$

Используя мнимую единицу и наше соглашение об обозначениях для действительных чисел, мы приходим к так называемой *алгебраической (декартовой) форме* записи комплексных чисел

$$x + iy := (x, y). \quad (1.1)$$

В самом деле,

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (0, 1) \cdot (y, 0) = x + iy.$$

Если  $\operatorname{Re} z = 0$ , то комплексное число  $z$  называется мнимым или, для большей выразительности, *чисто мнимым*. Кроме того, комплексное число  $\bar{z} = x - iy$  называется *комплексно-сопряженным* числом для  $z = x + iy$ .



### 1.1.4. Тригонометрическая форма записи

Используя полярные координаты на плоскости  $\mathbb{R}^2$ , можно получить другое представление для комплексных чисел. Действительно, для  $z = (x, y) \neq 0$  рассмотрим полярные координаты

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \end{cases} \quad (1.2)$$

где

$$r := \sqrt{x^2 + y^2} \leq 0, \quad (1.3)$$

а  $\varphi$  — угол (между векторами  $(x, y)$  и  $(1, 0)$ ), определяемый системой уравнений

$$\cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Число (1.3) называется *модулем* комплексного числа  $z$  и обозначается  $|z|$ . Оно определяется по комплексному числу  $z$  вполне однозначно.

Угол  $\varphi$  в (1.2) называется *аргументом* комплексного числа  $z \neq 0$  и обозначается  $\text{Arg } z$ . Он определен не однозначно, а лишь с точностью до слагаемого вида  $2\pi k$ , где  $k \in \mathbb{Z}$  — любое целое число. Однако множество  $\text{Arg } z$  содержит единственное число, принадлежащее промежутку  $(-\pi, \pi]$ , которое называется *главным значением аргумента* и обозначается  $\arg z$ <sup>1</sup>. Таким образом, мы можем записать, что

$$\text{Arg } z = \{\arg z + 2\pi k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

В терминах координат (1.2) можно записать *тригонометрическую форму* комплексного числа

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Комплексное число изображается на плоскости точкой или радиусом-вектором, проведенным в эту точку (см. рисунок 1.1).

<sup>1</sup>Иногда для выделения главного значения аргумента вместо  $(-\pi, \pi]$  берется  $[0, 2\pi)$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран




Рис. 1.1





Меню

Часть I. Теория

Глава 1. Введение в комплексный анализ

1.2. Расширенная комплексная плоскость



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 1.2. Расширенная комплексная плоскость

1.2.1. Топология плоскости

1.2.2. Компактность

1.2.3. Связность

1.2.4. Стереографическая проекция

1.2.5. Сферическая метрика



## 1.2.1. Топология плоскости

На комплексной плоскости имеется естественное (евклидово) расстояние, определяемое с помощью модуля комплексного числа

$$|z_1 - z_0| = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}, \quad z_k = x_k + iy_k \quad (k = 0, 1).$$

Оно порождает открытые

$$B(z_0, r) := \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r\}$$

и замкнутые

$$\bar{B}(z_0, r) := \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq r\}$$

круги с центром в точке  $z_0 \in \mathbb{C}$  радиуса  $r > 0$ .

Введем еще обозначения для «проколотых» открытого

$$B^\circ(z_0, r) := \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - z_0| < r\}$$

и замкнутого

$$\bar{B}^\circ(z_0, r) := \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - z_0| \leq r\}$$

кругов с центром в точке  $z_0 \in \mathbb{C}$  радиуса  $r > 0$ , а также

$$C_r(z_0) := \{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta - z_0| = r\}$$

для окружности радиуса  $r > 0$  с центром в точке  $z_0 \in \mathbb{C}$  — границы кругов  $B(z_0, r)$  и  $\bar{B}(z_0, r)$  (см. [рисунок 1.2](#)).

Евклидова метрика порождает естественную топологию на комплексной плоскости  $\mathbb{C}$  следующим образом.

**Определение 1.2.** Множество  $A \subset \mathbb{C}$  называется *открытым*, если для любой точки  $z \in A$  существует открытый круг  $B(z, r)$  положительного радиуса  $r > 0$  с центром в этой точке, содержащийся в  $A$ .




Рис. 1.2

**Теорема 1.1 (свойства открытых множеств).** Семейство открытых множеств в  $\mathbb{C}$  обладает следующими свойствами:

- 1) множества  $\mathbb{C}$  и  $\emptyset$  открыты,
- 2) для любого семейства открытых множеств  $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$  их объединение  $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$  открыто,
- 3) любое пересечение  $\bigcap_{k=1}^n G_k$  конечного числа открытых множеств  $G_k$  ( $k = 1, 2, \dots, n$ ) открыто.

**Определение 1.3.** *Окрестностью точки*  $z \in \mathbb{C}$  называется любое открытое множество, содержащее эту точку. Если  $G \subset X$  — окрестность точки  $x \in X$ , то  $G^\circ = G \setminus \{x\}$  называется *проколотой* окрестностью этой точки.

Ясно, что открытое множество является окрестностью любой своей точки.

**Определение 1.4.** Точка  $z \in \mathbb{C}$  называется *предельной* для множества  $A \subset \mathbb{C}$ , если в любой проколотой окрестности  $x$  есть точки из  $A$ .

Другими словами, это означает, что в любой окрестности точки  $z$  есть точки из  $A$ , отличные от  $z$ . Подчеркнем, что здесь не требуется принадлежности точки  $z$  множеству  $A$ . Множество всех предельных точек для  $A$  обозначается  $A'$ .



Точка  $z \in \mathbb{C}$  является предельной для множества  $A \subset \mathbb{C}$  тогда и только тогда, когда существует такая последовательность попарно различных точек  $\{z_n\} \subset A$ , что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |z - z_n| = 0,$$

а также тогда и только тогда, когда в любой окрестности точки  $z$  бесконечно много точек из  $A$ .

Точки множества, не являющиеся предельными для него, называются *изолированными* точками множества.

**Определение 1.5.** Множество называется *замкнутым*, если оно содержит все свои предельные точки.

**Теорема 1.2 (принцип двойственности).** Множество  $A \subset \mathbb{C}$  замкнуто тогда и только тогда, когда его дополнение  $A^c = \mathbb{C} \setminus A$  открыто.

**Определение 1.6.** *Замыканием* множества  $A$  называется множество  $\bar{A} = A \cup A'$ .

*Границей* множества  $A$  в метрическом пространстве называется множество

$$\partial A = \bar{A} \cap \overline{A^c}. \quad (1.4)$$

Точки, принадлежащие границе множества, называются *граничными* точками для него.

Точка  $x$  является граничной тогда и только тогда, когда в любой окрестности этой точки есть точки из  $A$  и из  $A^c$ .

**Определение 1.7.** Непустое множество в  $\mathbb{C}$  называется *ограниченным*, если оно содержится в некотором круге.



## 1.2.2. Компактность

Семейство множеств  $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$  называется *открытым покрытием* множества  $A$ , если все множества  $G_\alpha$ ,  $\alpha \in I$ , открыты и

$$A \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha.$$

Другими словами, это означает, что каждая точка  $z$  множества  $A$  принадлежит по крайней мере одному из множеств  $G_\alpha$ .

**Определение 1.8.** Множество  $A \subset \mathbb{C}$  называется *компактным* или *компактом*, если из любого открытого покрытия этого множества можно выделить конечное подпокрытие.

**Теорема 1.3.** *Множество  $A \subset \mathbb{C}$  компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено.*



Меню

Часть I. Теория

Глава 1. Введение в комплексный анализ

1.2. Расширенная комплексная плоскость

1.2.3. Связность



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

### 1.2.3. Связность

**Определение 1.9.** Множество  $A \subset \mathbb{C}$  называется *связным*, если не существует таких двух открытых множеств  $G_1 \subset \mathbb{C}$  и  $G_2 \subset \mathbb{C}$ , что

$$G_1 \cap G_2 = \emptyset, \quad A \cap G_1 \neq \emptyset, \quad A \cap G_2 \neq \emptyset, \quad A \subset G_1 \cup G_2.$$

Другими словами, связность означает, что множество нельзя разбить на непустые части, содержащиеся в непересекающихся открытых множествах.



## 1.2.4. Стереографическая проекция

Потребности теории функций комплексного переменного обуславливают необходимость расширения комплексной плоскости  $\mathbb{C}$ , получающегося из последней добавлением нового элемента — бесконечно удаленной точки  $z = \infty$ . Для наглядного представления расширенной комплексной плоскости Риман предложил использовать способ, который сейчас будет описан.

Рассмотрим трехмерное евклидово пространство

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, \omega) : x, y, \omega \in \mathbb{R}\}$$

и будем отождествлять комплексную плоскость  $\mathbb{C}$  с подмножеством в  $\mathbb{R}^3$  с помощью взаимно-однозначного отображения

$$\mathbb{C} \ni z = x + iy \leftrightarrow (x, y, 0) \in \mathbb{R}^3.$$

Введем так называемую *сферу Римана*

$$S = \left\{ (x, y, \omega) : x^2 + y^2 + \left( \omega - \frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} \right\}.$$

Пусть  $z = x + iy \in \mathbb{C}$ . Соединим «северный полюс» сферы Римана — точку  $P(0, 0, 1)$  — с точкой  $z$  отрезком

$$\Gamma_z = \{(tx, ty, 1 - t) : t \in [0, 1]\}.$$

Если  $z \neq 0$ , то этот отрезок имеет единственную общую точку с  $S$  и соответствующее значение равно  $t = (x^2 + y^2 + 1)^{-1}$ . Непосредственная проверка показывает, что эта точка есть

$$z' = \left( \frac{x}{|z|^2 + 1}, \frac{y}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2}{|z|^2 + 1} \right).$$

Будем называть ее *стереографической проекцией*  $z$ . Стереографической проекцией точки  $z = 0$  является «южный полюс» сферы Римана  $(0, 0, 0)$ .



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран




Рис. 1.3

Таким образом,  $S \setminus \{(0, 0, 1)\}$  взаимно-однозначно отображается на комплексную плоскость  $\mathbb{C}$ . «Северный полюс» сферы Римана  $(0, 0, 1)$  оказался при этом незадействованным. Мы сопоставим точке  $(0, 0, 1)$  новое «идеальное» комплексное число  $z = \infty$  и образуем расширенную комплексную плоскость

$$\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}.$$

Конечно, мы не имеем возможности использовать  $z = \infty$  в алгебраических операциях. Но иногда, впрочем, некоторым операциям с  $z = \infty$  можно приписать смысл

$$a + \infty = \infty + a = \infty, \quad \frac{a}{\infty} = 0, \quad \frac{\infty}{a} = \infty \quad \text{при } a \in \mathbb{C},$$

$$a \cdot \infty = \frac{a}{0} = \infty \cdot a = \infty, \quad \text{при } a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Однако, операции  $0 \cdot \infty$ ,  $\infty \pm \infty$ ,  $0/0$  и  $0^0$  лишены смысла.





Меню

Часть I. Теория

Глава 1. Введение в комплексный анализ

1.2. Расширенная комплексная плоскость

1.2.4. Стереографическая проекция



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Итак, функция

$$F(z) = \begin{cases} \left\{ \frac{\operatorname{Re} z}{|z|^2+1}, \frac{\operatorname{Im} z}{|z|^2+1}, \frac{|z|^2}{|z|^2+1} \right\}, & z \in \mathbb{C}, \\ (0, 0, 0), & z = \infty \end{cases} \quad (1.5)$$

осуществляет взаимно-однозначное отображение расширенной комплексной плоскости  $\mathbb{C}$  на сферу Римана  $S$ .

В качестве базы окрестностей точки  $z_0 = \infty$  удобно взять семейство

$$\{z \in \mathbb{C} : |z| > r\}, \quad r > 0.$$

Тем самым мы дополняем топологию плоскости  $\mathbb{C}$  до топологии на  $\widehat{\mathbb{C}}$ . **Отображение (1.5)** непрерывно в каждой точке и обратное к нему также всюду непрерывно.

Отметим, что комплексная плоскость  $\mathbb{C}$  некомпактна (она неограничена), в то же время образ  $\widehat{\mathbb{C}}$  при **отображении (1.5)** (сфера Римана) компактен. Поэтому процесс отождествления  $\widehat{\mathbb{C}}$  и сферы Римана с помощью **(1.5)** называют часто компактификацией  $\mathbb{C}$ .



## 1.2.5. Сферическая метрика

Наряду с евклидовой метрикой в  $\mathbb{C}$  будем рассматривать еще *сферическую метрику* в  $\widehat{\mathbb{C}}$ , определяя ее равенством

$$d_S(z_1, z_2) = \begin{cases} \frac{|z_1 - z_2|}{\sqrt{(1 + |z_1|^2)(1 + |z_2|^2)}}, & z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \\ \frac{1}{\sqrt{1 + |z_1|^2}}, & z_1 \in \mathbb{C}, z_2 = \infty. \end{cases}$$

Другими словами, сферическое расстояние — это евклидово расстояние в  $\mathbb{R}^3$  между стереографическими проекциями. Нетрудно показать, что это — действительно метрика на  $S$ .

Использование сферической метрики приводит к другому подходу к определению топологии на  $\widehat{\mathbb{C}}$  — она дает возможность определить базу окрестностей точки на  $S$  как множество пересечений  $S$  и евклидовых шаров с центрами в этой точке.

Итак, на расширенной комплексной плоскости имеется две топологии и естественно их сравнить. Ответ является совершенно естественным — они совпадают.



Меню

Часть I. Теория

Глава 1. Введение в комплексный анализ

1.3. Предел и непрерывность



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 1.3. Предел и непрерывность

1.3.1. Функции комплексного переменного

1.3.2. Непрерывность

1.3.3. Равномерная непрерывность



### 1.3.1. Функции комплексного переменного

Нашим основным объектом изучения будут функции вида  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ , отображающие подмножества  $D \subset \mathbb{C}$  в комплексную плоскость  $\mathbb{C}$ . Под этим мы понимаем (как это обычно делается в математике), что любому числу  $z \in D$  поставлено в соответствие единственное комплексное число  $f(z) \in \mathbb{C}$ .

В теории функций комплексного переменного часто приходится использовать расширенное понятие функции: если каждому  $z \in D$  поставлено в соответствие некоторое множество комплексных чисел, то будем говорить о *многозначной* функции, заданной на  $D$ .

Термин «функция» всегда будет использоваться в обычном понимании (как в первом абзаце). Иногда, впрочем, чтобы подчеркнуть, что мы имеем дело именно с такой (обычной) трактовкой понятия функции, мы будем говорить об *однозначной* функции.

В теории функций комплексного переменного вместо термина «взаимно однозначная» функция обычно используется «*однолистная*» функция. Мы также придерживаемся этой традиции.



## 1.3.2. Непрерывность

Мы будем рассматривать функции вида  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  (или  $f : D \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ ), где  $D \subset \mathbb{C}$  или  $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ . При этом понятия предела и непрерывности таких функций мы всегда будем понимать в смысле топологий, введенных выше. Приведем их в явном виде.

**Определение 1.10.** Число  $w_0 \in \mathbb{C}$  называется *пределом функции*  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  в предельной точке  $z_0$  множества  $D \subset \mathbb{C}$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall z \in D \quad (0 < |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - w_0| < \varepsilon).$$

Точка  $\infty \in \widehat{\mathbb{C}}$  является пределом функции  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$

1) в предельной точке  $z_0$  множества  $D \subset \mathbb{C}$ , если

$$\forall A > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall z \in D \quad (0 < |z - z_0| < \delta \implies |f(z)| > A),$$

2) в бесконечно удаленной точке неограниченного множества  $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ , если

$$\forall A > 0 \quad \exists \Delta > 0 \quad \forall z \in D \quad (|z| > \Delta \implies |f(z)| > A),$$

Во всех случаях это факт мы записываем, как обычно, так:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0.$$

**Определение 1.11.** Функция  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $D \subset \mathbb{C}$ , называется *непрерывной* в предельной точке  $z_0 \in D$ , если

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0).$$

В изолированной точке области определения любая функция считается непрерывной.

Мы говорим, что функция  $f : D \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$  *непрерывна на множестве*  $D \subset \mathbb{C}$ , если она непрерывна в каждой точке этого множества. Класс всех таких функций обозначаем символом  $C(D)$ .



Меню

Часть I. Теория

Глава 1. Введение в комплексный анализ

1.3. Предел и непрерывность

1.3.2. Непрерывность



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

**Теорема 1.4 (глобальный критерий непрерывности).** Следующие условия равносильны:

- i) функция  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  непрерывна на множестве  $D \subset \mathbb{C}$ ,
- ii) для любого открытого множества  $V \subset \mathbb{C}$  его прообраз  $f^{-1}(V)$  открыт относительно  $D$ .<sup>2</sup>.

**Теорема 1.5.** Если  $D \subset \mathbb{C}$  и  $f \in C(D)$ , то для любого компакта  $K \subset D$  его образ  $f(K)$  компактен.

**Теорема 1.6.** Если  $D \subset \mathbb{C}$  и  $f \in C(D)$ , то для любого связного множества  $A \subset D$  его образ  $f(A)$  СВЯЗЕН.

---

<sup>2</sup>Это означает, что существует такое открытое множество  $G$ , что  $f^{-1}(V) = D \cap G$ .



### 1.3.3. Равномерная непрерывность

**Определение 1.12.** Пусть  $D \subset \mathbb{C}$ . Функция  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  называется *равномерно непрерывной* на  $D$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall z', z'' \in D \quad |z' - z''| < \delta \implies |f(z') - f(z'')| < \varepsilon.$$

Конечно, из равномерной непрерывности функции на множестве вытекает ее непрерывность на этом множестве.

**Теорема 1.7 (Кантора).** Пусть  $K \subset \mathbb{C}$  — компакт и  $f \in C(K)$ . Тогда  $f$  равномерно непрерывна на  $K$ .

**Теорема 1.8 (Арцела–Асколи).** Пусть  $K \subset \mathbb{C}$  — компактное множество и  $S$  — некоторое бесконечное множество непрерывных функций  $f : K \rightarrow \mathbb{C}$ .

Для того, чтобы  $S$  содержало равномерно сходящуюся на  $K$  последовательность, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия

1) равномерной ограниченности

$$\sup_{f \in S} \sup_{z \in K} |f(z)| < \infty,$$

2) равностепенной непрерывности

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall z_1, z_2 \in K \quad \forall f \in S \quad |z_1 - z_2| < \delta \implies |f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon.$$



Меню

Часть I. Теория

Глава 1. Введение в комплексный анализ

1.4. Кривые и области



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 1.4. Кривые и области

1.4.1. Кривые и контуры

1.4.2. Области

1.4.3. Многосвязные области





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

### 1.4.1. Кривые и контуры

**Определение 1.13.** Множество  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  называется *кривой*, если существует непрерывная функция  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ , для которой

$$\Gamma = \gamma([\alpha, \beta]).$$

Отображение  $\gamma$  называется *параметризацией* кривой.




Рис. 1.4

Точки  $\gamma(\alpha)$  и  $\gamma(\beta)$  называются *концами* кривой  $\Gamma$ . В этом случае также говорят, что кривая  $\Gamma$  соединяет точки  $\gamma(\alpha)$  и  $\gamma(\beta)$ .

Для каждого  $t \in [\alpha, \beta]$  его образ  $\gamma(t) \in \Gamma$  можно записать в виде

$$\gamma(t) = x(t) + iy(t). \quad (1.6)$$

Возникающие таким образом функции  $x, y : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$  называются координатными функциями параметризации кривой  $\Gamma$ .

**Определение 1.14.** Кривая  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  называется *жордановой*, если она имеет взаимно-однозначную параметризацию.

Для жордановой кривой точки «самопересечения» (как на [рисунке 1.4](#)) невозможны.




Рис. 1.5

Параметризация жордановой кривой определяется неоднозначно. Действительно, легко видеть, что если  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  — параметризация кривой  $\Gamma$ , то для любой строго монотонной непрерывной функции  $\varphi : [\alpha_1, \beta_1] \leftrightarrow [\alpha, \beta]$  композиция  $\gamma \circ \varphi$  также является параметризацией  $\Gamma$ .

Класс всех параметризаций кривой  $\Gamma$  обозначается  $\mathcal{P}(\Gamma)$ . Если  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \Gamma$  — параметризация жордановой кривой  $\Gamma \subset \mathbb{C}$ , то любую непрерывную строго монотонную функцию  $\varphi : [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow [\alpha, \beta]$  будем называть *заменой параметра*.

Таким образом, предыдущее утверждение можно переформулировать так: если  $\gamma$  параметризация жордановой кривой и  $\varphi$  — замена параметра, то  $\gamma \circ \varphi$  также является параметризацией. Справедливо и обратное.

**Теорема 1.9.** Для любых двух параметризаций  $\gamma_k : [\alpha_k, \beta_k] \rightarrow \mathbb{C}$  ( $k = 1, 2$ ) жордановой кривой  $\Gamma$  существует замена параметра  $\varphi$ , для которой  $\gamma_2 = \gamma_1 \circ \varphi$ .

**Доказательство.** Замена параметра, о которой говорится в формулировке, определяется как  $\varphi = \gamma_1^{-1} \circ \gamma_2$ . □

Непрерывность  $\gamma_1^{-1}$ , а, следовательно, и  $\varphi$  гарантируется следующей леммой.

**Лемма 1.1.** Если  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  — жорданова кривая и  $\gamma \in \mathcal{P}(\Gamma)$  — ее параметризация, то  $\gamma^{-1} \in C(\Gamma)$ .

**Доказательство.** В самом деле, пусть  $z_n \in \Gamma$ ,  $z_n \rightarrow z_0 \in \Gamma$ , но  $|\gamma^{-1}(z_n) - \gamma^{-1}(z_0)| \geq \delta > 0$ . По свойству Больцано–Вейерштрасса из ограниченной последовательности  $t_n = \gamma^{-1}(z_n)$  можно выделить



сходящуюся подпоследовательность  $t_{n_j} \rightarrow t_0$ .  $z_{n_j} \rightarrow \gamma(t_0) = z_0$  в силу непрерывности  $\gamma$ . В то же время  $|t_{n_j} - t_0| \geq \delta > 0$  — противоречие.  $\square$




Рис. 1.6

Если  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  — жорданова кривая и  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$  — ее параметризация, то для любого разбиения

$$\Pi : \alpha = t_0 < \dots < t_n = \beta$$

ее области определения положим

$$l(\Pi) := \sum_{k=1}^n |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})|.$$

Геометрический смысл  $l(\Pi)$  — длина ломаной, вписанной в кривую  $\Gamma$  в точках  $\gamma(t_k)$ ,  $k = 0, \dots, n$  (см. рисунок 1.7).




Рис. 1.7



**Определение 1.15.** Если множество  $\{\Gamma(\Pi)\}$  ограничено, то жорданова кривая  $\Gamma$  называется *спрямляемой*. В таком случае *длиной кривой* называется число

$$l_{\Gamma} := \sup_{\Pi} l(\Pi).$$

Можно доказать, что длина кривой не зависит от выбора ее параметризации. Кроме того, справедливо равенство

$$l_{\Gamma} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} l(\Pi).$$

Задать *ориентацию* жордановой кривой — это значит задать порядок во множестве ее концов. Жорданова кривая с заданной ориентацией называется *ориентированной*. Другими словами, задание ориентации кривой задает направление ее обхода.

Все параметризации ориентированной жордановой кривой разбиваются тогда на два класса — сохраняющие и меняющие ориентацию. Две параметризации одного класса связаны возрастающей заменой параметра.

В самом деле, в силу *леммы 1.1* функция  $\varphi = \gamma_1^{-1} \circ \gamma_2$  непрерывна и взаимно однозначна (как композиция непрерывных и взаимно-однозначных отображений), поэтому  $\varphi$  строго монотонна и является заменой параметра.

**Определение 1.16.** Множество  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  называется *контуром* (*замкнутой жордановой кривой*) в  $\mathbb{C}$ , если существует непрерывная взаимнооднозначная функция  $\gamma : C \rightarrow \mathbb{C}$ , для которой  $\gamma(C) = \Gamma$  (здесь  $C = \{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta| = 1\}$  — единичная окружность).

Если  $\gamma$  — функция из *определения 1.16* и  $\eta(t) = \cos t + i \sin t$ ,  $t \in [0, 2\pi)$ , то композиция  $\gamma \circ \eta : [0, 2\pi) \rightarrow \Gamma$  называется *параметризацией* контура  $\Gamma$ . Функция  $\gamma^{-1}$  является непрерывной (это доказывается как в *лемме 1.1*).

Длина контура определяется точно так же, как и для жордановой кривой в *определении 1.15*.

Жорданова кривая (или контур) называется

— *гладкой*, если некоторая ее параметризация  $\gamma$  имеет непрерывно-дифференцируемые *координатные функции* (1.6) и  $[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 \neq 0$  при  $t \in [\alpha, \beta]$ ;

— *кусочно-гладкой*, если она является объединением конечного числа гладких жордановых кривых с последовательно соединенными началами и концами.




Рис. 1.8

Гладкая (кусочно-гладкая) жорданова кривая  $\Gamma$  является спрямляемой и ее длина вычисляется по формуле

$$l_{\Gamma} = \int_{\alpha}^{\beta} \left( [x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 \right)^{1/2} dt,$$

где

$$\gamma(t) = x(t) + iy(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$$

— любая (кусочно) непрерывно-дифференцируемая параметризация. Это же утверждение справедливо и для контура.




Рис. 1.9

Отрезок в  $\mathbb{C}$  с началом в точке  $z_0 \in \mathbb{C}$  и концом в точке  $z_1 \in \mathbb{C}$  определяется как множество

$$[z_0, z_1] = \{(1-t)z_0 + tz_1 : t \in [0, 1]\}.$$



*Ломаной* называется жорданова кривая, являющаяся объединением конечного числа отрезков с последовательно соединенными началами и концами. Ясно, что ломаная является кусочно-гладкой жордановой кривой.

*Полигон* — контур, являющийся объединением конечного числа отрезков с последовательно соединенными концами и началами, причем конец последнего совпадает с началом первого.




Рис. 1.10

Условимся в дальнейшем *многоугольником* называть любое открытое ограниченное множество в  $\mathbb{C}$ , границей которого является полигон.

Если  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  — контур, то *ориентацию* его можно задать «порядком прохождения» трех его точек

$$z_1 \rightarrow z_2 \rightarrow z_3 \rightarrow z_1 \quad \text{или} \quad z_1 \rightarrow z_3 \rightarrow z_2 \rightarrow z_1.$$

Все параметризации контура тогда разбиваются на два класса — *сохраняющие ориентацию* и *меняющие ориентацию*.

Задание ориентации не зависит от выбора точек  $z_1, z_2, z_3$  в том смысле, что если параметризация «проходит» какие-то три точки  $z'_1, z'_2, z'_3$  в определенном порядке, то любая параметризация того же класса проходит их в том же порядке.

Одну из ориентаций можно назвать положительной, а другую — отрицательной.

Принято в качестве *положительной* выбирать ту, для которой при обходе контура с помощью параметризации, сохраняющей эту ориентацию, область, ограниченная контуром, остается слева (обход совершается «против часовой стрелки»). Положительно и отрицательно ориентированный контур  $\Gamma$  будем обозначать соответственно  $\Gamma^+$  и  $\Gamma^-$ .



Меню

Часть I. Теория

Глава 1. Введение в комплексный анализ

1.4. Кривые и области

1.4.1. Кривые и контуры



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Это определение знака ориентации контура не является, конечно, вполне строгим, но оно интуитивно ясно в случае, когда контур является гладким или кусочно-гладким (например, для полигона).

Отметим также, что при определении ориентации неявно использовалось свойство ориентируемости плоскости, то есть возможность выбора одной из ее сторон. По умолчанию мы выбираем ту сторону  $\mathbb{C}$ , на которую «смотрим сверху». Если бы выбрали сторону, на которую нужно смотреть снизу, то ориентация контура изменилась на противоположную.



## 1.4.2. Области

Множество  $A \subset \mathbb{C}$  называется *линейно связным*, если для любых двух его точек существует кривая, соединяющая эти точки, лежащая в  $A$ .

Легко показать (сделайте это самостоятельно), что линейно связное множество является связным (см. [определение 1.9](#)).

**Определение 1.17.** Непустое открытое связное множество в  $\mathbb{C}$  называется *областью*.

Область называется *жордановой*, если ее *границей* является *контур*.

Мы будем всегда считать (если не оговорено противное), что граница жордановой области ориентирована положительно (см. предыдущий раздел) и будем обозначать ее тогда  $(\partial D)^+$ .

Для областей понятия связности и линейной связности совпадают. Это показывает следующее утверждение.

**Лемма 1.2.** *Любая область линейно связна. Более того, любые две точки области можно соединить ломаной, лежащей в области.*

**Доказательство.** Пусть  $z_0 \in D$  — фиксированная точка. Обозначим  $D_1$  множество точек из  $D$ , которые можно соединить с  $z_0$  ломаной, содержащейся в  $D$ . Тогда  $D_1$  содержит некоторый круг  $B(z_0, r)$ . Это же верно и для любой другой точки из  $D_1$ . Таким образом,  $D_1$  открыто.

Множество  $D_2 = D \setminus D_1$  также открыто, так как если  $z \in D_2$  и круг  $B(z, r)$  содержится в  $D$ , то ни одна точка  $B(z, r)$  не входит в  $D_1$ .

Итак, множества  $D_1$ ,  $D_2$  открыты,  $D = D_1 \cup D_2$  и  $D_1 \neq \emptyset$ . Так как  $D$  связно, то  $D_2 = \emptyset$  и  $D = D_1$ .  $\square$

Мы будем всегда считать (если не оговорено противное), что граница жордановой области ориентирована положительно (см. предыдущий раздел) и будем обозначать ее тогда  $(\partial D)^+$ .

**Теорема 1.10 (Жордана).** *Контур (замкнутая жорданова кривая) разбивает расширенную комплексную плоскость  $\mathbb{C}$  на две односвязные области, для которых она является общей границей.*

Мы не будем приводить доказательство этой теоремы, так как оно является весьма сложным и громоздким (хотя ее утверждение).





### 1.4.3. Многосвязные области

Несмотря на то, что **область** — **связное множество**, ее граница может не быть связной. Примером может служить кольцо (см. например, область слева на [рисунке 1.11](#)).




Рис. 1.11

**Компонентой связности** границы области называют любое связное подмножество границы, не являющееся собственным подмножеством другого связного подмножества границы. Область называется **одно-связной**, если ее граница является связным множеством, в противном случае область называется **многосвязной**.

**Порядком связности** области называется число компонент связности ее границы. Область называется  $m$ -связной, если ее порядок связности конечен и равен  $m$ , если же порядок связности бесконечен, то область называется бесконечносвязной.

На [рисунке 1.11](#) слева — двусвязная область, а справа — трехсвязная.



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 2

# Дифференцируемость

- 2.1. Комплексное дифференцирование
- 2.2. Аналитические функции и конформные отображения
- 2.3. Дробно-линейные отображения
- 2.4. Элементарные аналитические функции



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 2.1. Комплексное дифференцирование

2.1.1. Производная и дифференцируемость

2.1.2. Правила дифференцирования

2.1.3. Условия Коши–Римана



### 2.1.1. Производная и дифференцируемость

**Определение 2.1.** Пусть функция  $f$  задана в окрестности точки  $z_0 \in \mathbb{C}$ . Если существует конечный предел

$$f'(z_0) := \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0},$$

то он называется *производной* функции  $f$  в точке  $z_0$ .

Если ввести обозначения

$$h = z - z_0, \quad \alpha(h) = \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} - f'(z_0),$$

то условие существования производной легко переписать в виде

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = f'(z_0)h + \alpha(h),$$

где  $\alpha(h) = o(h)$  при  $h \rightarrow 0$ .

**Определение 2.2.** Функция  $f$  заданная в некоторой окрестности точки  $z_0 \in \mathbb{C}$  называется  *$\mathbb{C}$ -дифференцируемой*<sup>1</sup> в этой точке, если существует такое комплексное число  $D \in \mathbb{C}$ , что

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = Dh + o(h), \quad h \rightarrow 0. \quad (2.1)$$

Таким образом, замечание перед последним определением говорит нам о том, что существование производной функции  $f$  в точке  $z_0$  равносильно ее  $\mathbb{C}$ -дифференцируемости в этой точке. При этом число  $D$  в **определении 2.2** совпадает с  $f'(z_0)$ .

<sup>1</sup>Мы используем этот термин для того, чтобы отличить рассматриваемое понятие дифференцируемости от того, которое рассматривается в действительном анализе (на последнее мы будем ссылаться как на  $\mathbb{R}$ -дифференцирование).



## 2.1.2. Правила дифференцирования

Как и раньше дифференцированием мы будем называть процесс вычисления **производной**. Этот процесс подчиняется таким же правилам, как и в случае функций действительного переменного.

**Теорема 2.1 (правила дифференцирования).** *Справедливы следующие утверждения.*

1. Если  $f(z) \equiv c$ , то  $f'(z) = 0$  для любого  $z \in \mathbb{C}$ .

2. Если функции  $f$  и  $g$   **$\mathbb{C}$ -дифференцируемы** в точке  $z$ , то

а) для любых  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$  их линейная комбинация  $\alpha f + \beta g$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема в точке  $z$  и

$$(\alpha f(z) + \beta g(z))' = \alpha f'(z) + \beta g'(z),$$

б) их произведение  $f \cdot g$   $\mathbb{C}$ -дифференцируемо в точке  $z$  и

$$(f(z)g(z))' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z),$$

в) при условии  $g(z) \neq 0$  их частное  $f/g$   $\mathbb{C}$ -дифференцируемо в точке  $z$  и

$$\left(\frac{f(z)}{g(z)}\right)' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{g^2(z)}.$$

3. Если функция  $f$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема в точке  $z$ , а функция  $g$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема в точке  $f(z)$ , причем область значений функции  $f$  содержится в области определения функции  $g$ , то их композиция  $F = g \circ f$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема в точке  $z$  и

$$F'(z) = g'(f(z)) \cdot f'(z).$$

4. Если однолистная функция  $f$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема в точке  $z$ , причем  $f'(z) \neq 0$ , то обратная функция  $f^{-1}$   $\mathbb{C}$ -дифференцируема в точке  $w = f(z)$  и

$$f^{-1}(w) = \frac{1}{f'(z)}.$$

Доказательства всех утверждений этой теоремы ничем не отличается от доказательств соответствующих свойств операции  $\mathbb{R}$ -дифференцирования для функций действительного переменного.



### 2.1.3. Условия Коши–Римана

Все это мы уже видели в курсе математического анализа и пока комплексный случай ничего нового нам не показал. Однако, мы уже сейчас убедимся, что **дифференцируемость** сейчас является существенно более сильным свойством, налагающим дополнительные ограничения на функцию. Для этого запишем значения функции  $f$  в **алгебраической записи**

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy. \quad (2.2)$$

Эта запись будет систематически использоваться ниже на протяжении всей книги.

**Теорема 2.2.** *Для того, чтобы функция  $f$  была  $\mathbb{C}$ -дифференцируема в точке  $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$ , необходимо и достаточно, чтобы действительная  $u = \operatorname{Re} f$  и мнимая  $v = \operatorname{Im} f$  части были  $\mathbb{R}$ -дифференцируемы и выполнялись равенства*

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0), \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \quad (2.3)$$

При этом

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \end{aligned} \quad (2.4)$$

**Доказательство.** Пусть функция  $f$  дифференцируема в точке  $z_0$ . Считаем, что в **условии дифференцируемости**  $D = A + iB$ ,  $h = t + is$ , т.е.

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = (A + iB)(t + is) + o(h) = (At - Bs) + i(Bt + As) + o(h)$$

и отделим в нем действительную и мнимую части, получая соотношения

$$\begin{cases} u(x_0 + t, y_0 + s) - u(x_0, y_0) = At - Bs + o(\sqrt{t^2 + s^2}), \\ v(x_0 + t, y_0 + s) - v(x_0, y_0) = Bt + As + o(\sqrt{t^2 + s^2}). \end{cases}$$



Меню

Часть I. Теория

Глава 2. Дифференцируемость

2.1. Комплексное дифференцирование

2.1.3. Условия Коши–Римана



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Отсюда следует дифференцируемость функций  $u$  и  $v$ , а также равенства

$$A = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)$$

и

$$B = -\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

Поэтому все соотношения в утверждении нашей теоремы справедливы.

Обратно можно вернуться по этой же дорожке. □

**Равенства (2.3)** называют обычно *уравнениями Коши – Римана*<sup>2</sup>. Необходимость их выполнения для существования производной делает теорию дифференцирования комплексных функций существенно отличной от соответствующей действительной теории функций из  $\mathbb{R}^2$  в  $\mathbb{R}^2$ .

---

<sup>2</sup>Историческая справедливость требует, однако, упоминания в связи с этим имен Эйлера и Даламбера, в первую очередь. Однако терминология уже устоялась и мы будем использовать общепринятый стандарт.



Меню

Часть I. Теория

Глава 2. Дифференцируемость

2.2. Аналитические функции и конформные отображения



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 2.2. Аналитические функции и конформные отображения

2.2.1. Геометрический смысл аргумента производной

2.2.2. Геометрический смысл модуля производной

2.2.3. Понятие аналитической функции





### 2.2.1. Геометрический смысл аргумента производной

Если  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  — гладкая жорданова **кривая** и  $\gamma \in \mathcal{P}(\Gamma)$  — ее гладкая параметризация, то, исходя из уравнения

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)}$$

(см. (1.6)), уравнение касательной к  $\Gamma$  в точке  $z_0 = \gamma(t_0)$  можно записать в виде

$$z = z_0 + t(\cos \arg \gamma'(t_0) + i \sin \arg \gamma'(t_0)), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Таким образом,  $\arg \gamma'(t_0)$  — **угловой коэффициент касательной**.

Пусть задана функция  $f \in C(G)$  ( $G \subset \mathbb{C}$  — область), которая **дифференцируема** в точке  $z_0 \in G$ , причем  $f'(z_0) \neq 0$ . Проведем через  $z_0$  гладкую жорданову кривую  $\Gamma$  и пусть  $\gamma \in \mathcal{P}(\Gamma)$ ,  $z_0 = \gamma(t_0)$ . Тогда ее образ  $f(\Gamma)$  — кривая с параметризацией  $\tilde{\gamma} = f \circ \gamma$ .

В силу правила **дифференцирования композиции** справедливо равенство

$$\arg \tilde{\gamma}'(t_0) = \arg (f'(z_0) \cdot \gamma'(t_0)) = \arg f'(z_0) + \arg \gamma'(t_0) \quad (2.5)$$

или

$$\arg \tilde{\gamma}'(t_0) - \arg \gamma'(t_0) = \arg f'(z_0).$$

Возьмем теперь две гладкие жордановы кривые  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_2$ , проходящие через точку  $z_0$  с параметризациями  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  (можно считать, что  $z_0 = \gamma_1(t_0) = \gamma_2(t_0)$ ). Под действием функции  $f$  они отображаются в кривые  $f(\Gamma_1)$  и  $f(\Gamma_2)$  с параметризациями  $\tilde{\gamma}_1 = f \circ \gamma_1$  и  $\tilde{\gamma}_2 = f \circ \gamma_2$  соответственно. Вычисляя угловые коэффициенты касательных к этим кривым в точке  $z_0$  с помощью равенства (2.5) находим, что

$$\arg \tilde{\gamma}_1'(t_0) - \arg \tilde{\gamma}_2'(t_0) = \arg \gamma_1'(t_0) - \arg \gamma_2'(t_0).$$

Это означает, что угол между касательными в точке  $z_0$  к образам  $f(\Gamma_1)$  и  $f(\Gamma_2)$  кривых  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_2$  равен углу между прообразами (как по величине, так и по направлению отсчета).

Таким образом, мы приходим к пониманию геометрического смысла аргумента производной функции  $\arg f'(z_0)$  — это угол, на который поворачиваются касательные к кривым в точке  $z_0$  после отображения с помощью функции непрерывной функции  $f$ , имеющей в точке  $z_0$  отличную от нуля производную.



## 2.2.2. Геометрический смысл модуля производной

Геометрический смысл модуля производной легко усмотреть из равенства

$$|f'(z_0)| = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|}.$$

Если модуль  $|z - z_0|$  мал, то

$$|f(z) - f(z_0)| \approx |f'(z_0)| \cdot |z - z_0|.$$

Таким образом, модуль производной  $|f'(z_0)|$  — это предельный коэффициент растяжения, показывающий насколько изменяется расстояние между образами точек  $z$  и  $z_0$  (для малых  $|z - z_0|$ ) при отображении  $f$ .



### 2.2.3. Понятие аналитической функции

**Определение 2.3.** Функция  $f$ , определенная в некоторой окрестности точки  $z_0$ , называется *аналитической* в этой точке, если она дифференцируема в некоторой окрестности точки  $z_0$ .

Функция  $f$  называется аналитической в бесконечно удаленной точке  $z_0 = \infty$ , если функция  $f(1/z)$  аналитична в точке 0.

Функция называется аналитической в некоторой области  $G \subset \mathbb{C}$ , если она аналитична в каждой точке этой области.

Для термина «аналитическая функция» используются также синонимы «*голоморфная*» функция, «*регулярная*» функция. Функция, аналитическая во всей комплексной плоскости  $\mathbb{C}$ , называется *целой*.

Условимся называть углом между гладкими кривыми в точке их пересечения угол между касательными к ним в этой точке.

**Определение 2.4.** Непрерывное отображение  $f \in C(G)$  области  $G \subset \mathbb{C}$  называется *конформным* в точке  $z_0 \in G$ , если оно сохраняет углы между кривыми, проходящими через эту точку.

Из *геометрического смысла аргумента производной* следует, что отображение с помощью аналитической функции в некоторой области функции является конформным во всех точках области, где ее производная отлична от нуля.



Меню

Часть I. Теория

Глава 2. Дифференцируемость

2.3. Дробно-линейные отображения



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 2.3. Дробно-линейные отображения

2.3.1. Простейшие свойства

2.3.2. Групповое свойство

2.3.3. Круговое свойство

2.3.4. Свойство симметрии

2.3.5. Свойство трех точек

2.3.6. Примеры дробно-линейных отображений



### 2.3.1. Простейшие свойства

**Определение 2.5.** *Дробно-линейными* называются отображения вида

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad \Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0. \quad (2.6)$$

Условие  $\Delta \neq 0$  обеспечивает нам невырожденность дробно-линейной функции. Именно, вычисляя производную этой функции, мы видим, что

$$f'(z) = \frac{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}{(cz + d)^2}. \quad (2.7)$$

Поэтому, если  $\Delta = 0$ , то наша функция является тождественной постоянной. Кроме того, указанное условие необходимо для **конформности** дробно-линейного отображения.

Случай  $c = 0$  особенно прост — тогда наша функция является целой линейной и легко проследить, что происходит при отображении с ее помощью. Перепишем ее в виде

$$f(z) = Az + B, \quad \text{где } A = \frac{a}{d}, \quad B = \frac{b}{d}.$$

Условие  $\Delta \neq 0$  влечет за собой  $A \neq 0$ , следовательно, линейная функция  $f$  осуществляет конформное отображение всей комплексной плоскости  $\mathbb{C}$ . При этом отображении касательные ко всем гладким кривым поворачиваются на один и тот же угол  $\arg A$ , а коэффициент растяжения во всех точках равен  $|A|$ . Очевидно также, что при целом линейном отображении прямые и окружности переходят в прямые и окружности.

Далее рассмотрим случай  $c \neq 0$ . Тогда из равенства

$$\frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c(cz + d)}$$

вытекает, что дробно-линейное отображение является композицией двух линейных функций и функции  $z \mapsto 1/z$ .



Кроме того, легко видеть, что дробно-линейная функция взаимно однозначно отображает проколотую комплексную плоскость  $\mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$  на  $\mathbb{C} \setminus \{\frac{c}{a}\}$ . Обратное отображение для дробно-линейной функции задается равенством

$$f^{-1}(w) = \frac{dw - b}{-cw + a}, \quad w \neq \frac{c}{a}$$

и также является невырожденным дробно-линейным отображением.

Дробно-линейное отображение является конформным во всех точках комплексной плоскости  $\mathbb{C}$ , кроме  $-d/c$ . Это вытекает из его **аналитичности** и того, что производная (см. (2.7)) отлична от нуля в этих точках.

Можно рассматривать дробно-линейные отображения расширенной комплексной плоскости. **Функция (2.6)** определена всюду в  $\widehat{\mathbb{C}}$ , кроме точек  $-d/c$  и  $\infty$  при  $c \neq 0$  и кроме точки  $\infty$  при  $c = 0$ . Для этого доопределим ее следующими равенствами:

— если  $c \neq 0$ , то положим

$$f\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty, \quad f(\infty) = \frac{a}{c},$$

— если  $c = 0$ , то положим

$$f(\infty) = \infty.$$

При таком определении дробно-линейное отображение является **конформным** гомеоморфизмом (т.е. взаимно однозначным отображением, обратное к которому также непрерывно) расширенной комплексной плоскости  $\widehat{\mathbb{C}}$  на себя. Это утверждение легко устанавливается непосредственной проверкой.



## 2.3.2. Групповое свойство

Рассмотрим теперь композицию двух невырожденных **дробно-линейных функций**

$$f_k(z) = \frac{a_k z + b_k}{c_k z + d_k}, \quad k = 1, 2.$$

Тогда после элементарных преобразований получаем снова дробно-линейное отображение

$$f_2(f_1(z)) = \frac{a_2 \frac{a_1 z + b_1}{c_1 z + d_1} + b_2}{a_2 \frac{a_1 z + b_1}{c_1 z + d_1} + d_2} = \frac{(a_1 a_2 + c_1 b_2)z + (b_1 a_2 + c_1 d_2)}{(a_1 c_2 + c_1 d_2)z + (b_1 c_2 + d_1 d_2)},$$

которое невырождено, так как отличен от нуля его определитель:

$$(a_1 a_2 + c_1 b_2)(b_1 c_2 + d_1 d_2) - (b_1 a_2 + d_1 b_2)(a_1 c_2 + c_1 d_2) = (a_1 d_1 - b_1 c_1)(a_2 d_2 - b_2 c_2) \neq 0.$$

Напомним теперь, что множество  $G$  называется **группой**, если на нем определена бинарная операция  $*$ :  $G \times G \rightarrow G$  со свойствами

1)  $(g_1 * g_2) * g_3 = g_1 (g_2 * g_3)$  (ассоциативность),

2) существует такой элемент  $e \in G$ , что  $e * g = g * e = g$  для любого  $g \in G$  (существование **нейтрального элемента**),

3) для любого элемента  $g \in G$  существует такой элемент  $g^{-1} \in G$ , что  $g * g^{-1} = g^{-1} * g = e$  (существование **обратного элемента**).

Нетрудно показать (сделайте это самостоятельно), что множество невырожденных дробно-линейных отображений является группой относительно операции композиции. Нейтральным элементом этой группы является  $f(z) = z$ , а обратным элементом для дробно-линейного отображения является отображение

$$g(z) = \frac{-dz + b}{cz - a}.$$



### 2.3.3. Круговое свойство

$\widehat{\mathbb{C}}$ -*окружностью* (или *обобщенной окружностью*, или окружностью в расширенной комплексной плоскости) будем называть любую окружность или прямую на  $\mathbb{C}$ .

Такая трактовка прямых в  $\mathbb{C}$  объясняется тем, что при стереографической проекции окружностям и прямым в  $\mathbb{C}$  соответствуют окружности на сфере Римана (убедитесь в этом самостоятельно).

**Теорема 2.3 (круговое свойство).** При *дробно-линейных отображениях* образами  $\widehat{\mathbb{C}}$ -окружностей являются  $\widehat{\mathbb{C}}$ -окружности.

**Доказательство.** Рассмотрим общее уравнение прямой или окружности

$$A(x^2 + y^2) + 2Bx + 2Cy + D = 0.$$

Если  $A = 0$ ,  $B^2 + C^2 \neq 0$ , то это — уравнение прямой. Если же  $A \neq 0$ ,  $B^2 + C^2 - AD > 0$ , то это — уравнение окружности. С помощью замены

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2}; \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i},$$

перейдем к уравнению

$$Az\bar{z} + \bar{E}z + E\bar{z} + D = 0, \quad E = A + iB.$$

Заменяя здесь  $z = 1/w$ , получим уравнение такого же вида

$$Dw\bar{w} + Ew + \bar{E}\bar{w} + A = 0.$$

Это означает, что функция  $w = 1/z$  обладает круговым свойством.

Кроме того, целая линейная функция также обладает, очевидно, круговым свойством. В самом деле, любое такое отображение  $f(z) = Az + B$  является композицией отображений

$$f_1(z) = z \rightarrow |A|z, \quad f_2(z) = e^{i \arg A} z, \quad f_3(z) = z \rightarrow z + B$$

(это последовательно примененные гомотетия, поворот и сдвиг), каждое из которых переводит окружности на окружности и прямые на прямые.

Следовательно, круговое свойство имеет место и для любой дробно-линейной функции, как композиции целых линейных функций и функции  $w = 1/z$ .  $\square$





### 2.3.4. Свойство симметрии

**Определение 2.6.** Две точки  $z, z^* \in \mathbb{C}$  называются *симметричными относительно прямой*, если они лежат на одном и том же перпендикуляре к этой прямой на равном расстоянии от нее.

Две точки  $z, z^* \in \mathbb{C}$  называются *симметричными относительно окружности*, если они лежат на одном луче с началом в центре окружности и произведение расстояний от этих точек до центра окружности равно квадрату ее радиуса.

Центр окружности будем считать симметричным бесконечно удаленной точке  $\infty$ .




Рис. 2.1

В дальнейшем мы часто будем обозначать  $z^*$  точку, симметричную точке  $z$  относительно некоторой окружности или прямой, ясной из контекста.

**Пример 2.1.** Пара  $z$  и  $\bar{z}$  симметрична относительно оси  $\text{Im } z = 0$ . Пара  $z$  и  $R^2/\bar{z}$ , симметрична относительно окружности  $C_R(0)$ .

Отсюда, в частности, следует, что отображение

$$z \mapsto z^* = e^{2i\theta}(\bar{z} - \bar{z}_0) + z_0 \quad (2.8)$$

дает точку, симметричную точке  $z$  относительно прямой  $z = z_0 + te^{i\theta}$ ,  $t \in \mathbb{R}$ . Аналогично

$$z \mapsto z^* = z_0 + \frac{R^2}{\bar{z} - \bar{z}_0} \quad (2.9)$$



дает точку, симметричную точке  $z$  относительно окружности  $C_R(z_0)$ . Будем называть эти отображения *преобразованиями симметрии относительно прямой* и *окружности* соответственно.

Преобразование симметрии относительно прямой часто называют *зеркальным отражением*, а преобразование симметрии относительно окружности — *инверсией*.

Очевидно, что композиция двух преобразований симметрии относительно прямых или окружностей ((2.8) или (2.9)) является невырожденным *дробно-линейным преобразованием*. Для доказательства обратного утверждения нам понадобится некоторая подготовка.

**Лемма 2.1.** Пусть  $\Gamma$  —  $\widehat{\mathbb{C}}$ -окружность. Тогда для симметрии двух точек  $z_1, z_2 \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma$  относительно  $\Gamma$  необходимо и достаточно, чтобы любая  $\widehat{\mathbb{C}}$ -окружность, содержащая эти точки, была ортогональна  $\Gamma$ .

**Доказательство.** Необходимость. Пусть точки  $z$  и  $z^*$  симметричны относительно  $\Gamma$  и  $\widehat{\mathbb{C}}$ -окружность  $\widetilde{\Gamma}$  содержит эти точки.

Если  $\Gamma$  или  $\widetilde{\Gamma}$  является прямой, то ортогональность  $\Gamma$  и  $\widetilde{\Gamma}$  очевидна, поэтому считаем, что и  $\Gamma$ , и  $\widetilde{\Gamma}$  являются окружностями.

Пусть  $\Gamma = C_r(z_0)$  — окружность с центром в точке  $z_0$  радиуса  $R$ , а  $z$  лежит внутри  $\Gamma$ . С одной стороны, условие симметричности означает, что

$$|z - z_0| \cdot |z^* - z_0| = R^2.$$

С другой стороны, если провести через  $z_0$  касательную к окружности  $\widetilde{\Gamma}$  и секущую (луч из точки  $z_0$ , содержащий  $z$  и  $z^*$ ), то квадрат длины этой касательной равен произведению  $|z - z_0| \cdot |z^* - z_0|$  длин отрезков секущей. Отсюда длина касательной равна  $R$  и является радиусом окружности  $\Gamma$  и ортогональна радиусу окружности  $\widetilde{\Gamma}$ , проведенному в точку касания. Следовательно,  $\Gamma$  и  $\widetilde{\Gamma}$  ортогональны.

Достаточность очевидна в случае, когда  $\Gamma$  — прямая. Пусть  $\Gamma$  — окружность с центром в точке  $z_0$  радиуса  $R$ .

Если  $\widetilde{\Gamma}$  — прямая, содержащая точки  $z$  и  $z^*$ , то по условию  $\widetilde{\Gamma}$  ортогональна  $\Gamma$  и все три точки  $z_0$ ,  $z$  и  $z^*$  принадлежат  $\widetilde{\Gamma}$ .

Если  $\widetilde{\Gamma}$  — окружность, содержащая точки  $z$  и  $z^*$ , то произведение  $|z - z_0| \cdot |z^* - z_0|$  равно квадрату касательной к  $\widetilde{\Gamma}$ , выходящей из точки  $z_0$  и равной радиусу  $R$ . Поэтому точки  $z$  и  $z^*$  симметричны относительно  $\Gamma$  и  $z^*$ .  $\square$




Рис. 2.2

**Теорема 2.4.** При *дробно-линейном отображении* любая пара точек, симметричных относительно  $\widehat{\mathbb{C}}$ -окружности, преобразуется в пару точек, симметричных относительно ее образа.

**Доказательство.** Пусть  $f$  — наше дробно-линейное отображение и точки  $z$  и  $z^*$  симметричны относительно окружности или прямой  $\Gamma$  и пусть  $\tilde{\Gamma}$  —  $\widehat{\mathbb{C}}$ -окружность, содержащая  $z$  и  $z^*$ . По **лемме 2.1**  $\tilde{\Gamma}$  ортогональна  $\Gamma$  и по **теореме 2.3** ее образ  $f(\tilde{\Gamma})$  является  $\widehat{\mathbb{C}}$ -окружностью. Так как  $f$  осуществляет **конформное отображение**, то  $f(\tilde{\Gamma})$  ортогональна  $f(\Gamma)$ . При этом любая окружность или прямая, содержащая  $f(z)$  и  $f(z^*)$ , может быть представлена в таком виде. Снова применяя **лемму 2.1**, получаем симметричность точек  $f(z)$  и  $f(z^*)$  относительно  $f(\Gamma)$ .  $\square$



### 2.3.5. Свойство трех точек

**Дробно-линейная функция** вполне определяется тремя параметрами — можно разделить числитель и знаменатель дроби в (2.6) на одно и то же число, отличное от нуля. Поэтому естественно ожидать, что дробно-линейное отображение вполне определяется заданием его значений в трех точках. Это действительно так.

**Теорема 2.5 (о трех точках).** *Для любых трех различных точек  $z_1, z_2, z_3 \in \widehat{\mathbb{C}}$  и любых трех различных чисел  $w_1, w_2, w_3 \in \widehat{\mathbb{C}}$  существует единственное дробно-линейное отображение  $f$ , удовлетворяющее условию*

$$f(z_k) = w_k, \quad k = 1, 2, 3. \quad (2.10)$$

**Доказательство.** Будем считать, что все  $z_k$  и  $w_k$  принадлежат  $\mathbb{C}$  (являются собственными числами).

Дробно-линейная функция

$$f_1(z) = \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$$

переводит точки  $z_1, z_2$  и  $z_3$  в  $0, \infty$  и  $1$  соответственно. Аналогично функция

$$f_2(z) = \frac{w - w_1}{w - w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1}$$

переводит точки  $w_1, w_2$  и  $w_3$  в  $0, \infty$  и  $1$  соответственно. Поэтому  $f_2^{-1} \circ f_1$  удовлетворяет условию (2.10).

В случае, когда одно из  $z_k$  или (и) одно из  $w_k$  равны  $\infty$ , доказательство предлагается провести самостоятельно.

**Единственность.** Если дробно-линейное отображение  $f$  удовлетворяет условию (2.10), то композиция (также дробно-линейное отображение)  $g = f_2 \circ f \circ f_1^{-1}$  оставляет точки  $0, \infty$  и  $1$  неподвижными. Поэтому из условия  $g(\infty) = \infty$  вытекает, что  $g(z) = Az + B$ . Так как  $g(0) = 0$ , то  $A = 0$ , а из  $g(1) = 1$  следует  $B = 1$ . Следовательно,  $g(z) = z$  и  $f = f_2^{-1} \circ f_1$ , т.е.  $f$  определяется однозначно.  $\square$

**Следствие 2.1.** *Для двух любых  $\mathbb{C}$ -окружностей существует дробно-линейная функция, отображающая одну окружность на другую.*



Меню

Часть I. Теория

Глава 2. Дифференцируемость

2.3. Дробно-линейные отображения

2.3.5. Свойство трех точек



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Доказательство. Это вытекает из **теоремы о трех точках** и **кругового свойства** —  $\mathbb{C}$ -окружность однозначно определяется заданием трех ее точек.



### 2.3.6. Примеры дробно-линейных отображений

Рассмотрим **дробно-линейные отображения** некоторых наиболее просто устроенных **областей**: расширенной комплексной плоскости  $\hat{\mathbb{C}}$ , комплексной плоскости  $\mathbb{C}$ , единичного круга

$$U = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\} \quad (2.11)$$

и верхней полуплоскости

$$H = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0\}.$$

*Дробно-линейным автоморфизмом* области  $D \subset \hat{\mathbb{C}}$  будем называть любое дробно-линейное отображение области  $D$  на себя.

Ясно, что множество всех дробно-линейных автоморфизмов области является группой, которая является подгруппой группы всех дробно-линейных отображений.

Группы дробно-линейных автоморфизмов первых двух основных областей описываются очевидным образом:

- для расширенной плоскости  $\hat{\mathbb{C}}$  совпадает с группой всех дробно-линейных отображений,
- для плоскости  $\mathbb{C}$  совпадает с группой всех линейных отображений, т.е. функций вида  $az + b$ .

Рассмотрим далее отображения полуплоскости  $H$  и круга  $U$ . В следующем примере описываются дробно-линейные автоморфизмы единичного круга с заданным прообразом нуля.

**Пример 2.2.** Формула

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z - z_0}{1 - \bar{z}_0 z}, \quad \theta \in \mathbb{R}, \quad (2.12)$$

дает общий вид дробно-линейного отображения, которое отображает единичный круг  $U$  на себя так, что заданная точка  $z_0$  переходит в центр этого круга.

**Решение.** Пусть функция

$$f(z) = \lambda \frac{z - a}{z - b} \quad (2.13)$$

отображает  $U$  на  $U$ , причем  $f(z_0) = 0$ . Тогда ясно, что  $a = z_0$ .



Отметим, что

$$f(\partial U) = \partial U. \quad (2.14)$$

В самом деле, пусть  $|z| = 1$ , тогда неравенство  $|f(z)| < 1$  невозможно ( $f$  отображает  $U$  на  $U$ ). Поэтому, если предположить, что  $|f(z)| > 1$ , то в некоторой точке отрезка  $[z_0, z] \subset U$  непрерывная функция  $|f|$  обязана принимать значение 1, что также невозможно. Итак,  $f(\partial U) \subset \partial U$ , поэтому в силу **кругового свойства** выполнено (2.14).

Рассмотрим теперь точку  $1/\bar{z}_0$ , симметричную  $z_0$  относительно  $\partial U = C_1(0)$ . В силу (2.14) и **свойства симметрии** ее образ — точка симметричная началу координат, т.е.  $f(1/\bar{z}_0) = \infty$ . Отсюда  $b = 1/\bar{z}_0$  и

$$f(z) = \lambda_1 \frac{z - z_0}{1 - z\bar{z}_0}.$$

с некоторым другим  $\lambda_1$ . В силу (2.14)  $|f(1)| = 1$ , поэтому  $|\lambda_1| = 1$ .

Докажем теперь, что любое отображение **вида** (2.12) отображает  $U$  на себя так, что  $z_0$  переходит в точку 0. Отметим, что если  $|z| = 1$ , то  $z\bar{z} = 1$  и

$$|f(z)| = \left| \frac{z - z_0}{z\bar{z} - z\bar{z}_0} \right| = \frac{|z - z_0|}{|z| \cdot |z - \bar{z}_0|} = 1.$$

Поэтому  $f(\partial U) \subset \partial U$  и в силу **кругового свойства** выполнено (2.14). Отсюда следует, что при  $|z| < 1$  будет  $|f(z)| < 1$  (если это не так, то  $|f(z)| > 1$  в некоторой точке  $z \in U$  и, так как  $f(z_0) = 0$ , то непрерывная функция  $|f(z)|$  должна принимать в  $U$  и значение 1, а это противоречит **равенству** (2.14). Точно так же доказывается, что  $|f(z)| > 1$  при  $|z| > 1$ . Следовательно,  $f(U) = U$ .  $\square$

Неединственность в **примере 2.2** объясняется тем, что переход в (2.12) от одного  $\theta$  к другому равносильно повороту круга, поэтому условия на отображение не нарушаются.

**Пример 2.3.** Формула

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad \text{где } a, b, c, d \in \mathbb{R}, \quad ad - bc > 0, \quad (2.15)$$

дает общий вид дробно-линейного отображения, которое отображает верхнюю полуплоскость  $H$  на себя.



Решение. То, что отображение с указанными свойствами должно иметь вид (2.15), можно вывести из теоремы 2.5. То, что отображение вида (2.15) обладает этими свойствами, доказывается подобно рассуждениям из примера 2.2. Читателю предлагается проделать это самостоятельно.  $\square$

Пример 2.4. Формула

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}, \quad \theta \in \mathbb{R}, \quad (2.16)$$

дает общий вид дробно-линейного отображения, которое отображает верхнюю полуплоскость  $H$  на единичный круг  $U$  так, что заданная точка  $z_0$  переходит в центр этого круга.

Решение. Пусть функция (2.13) отображает  $H$  на единичный круг  $U$  так, что  $f(z_0) = 0$ . Тогда  $a = z_0$ .

Заметим, что сейчас

$$f(\partial H) = \partial U. \quad (2.17)$$

Пусть  $x \in \mathbb{R} = \partial H$ , тогда неравенство  $|f(x)| < 1$  невозможно, так как  $f(H) = U$ . Если предположить, что  $|f(x)| > 1$ , то на отрезке, соединяющем точки  $x$  и  $z_0$  непрерывная функция  $|f|$  обязана принимать значение 1, что также невозможно. Итак,  $f(\partial H) \subset \partial U$  и в силу кругового свойства выполнено (2.17).

В силу свойства симметрии  $f(\bar{z}_0) = \infty$ , отсюда  $b = \bar{z}_0$ . Чтобы найти  $\lambda$ , возьмем  $x \in \mathbb{R}$ . Тогда числа  $x - z_0$  и  $x - \bar{z}_0$  являются взаимно сопряженными и имеют одинаковые модули, поэтому

$$|f(x)| = \left| \lambda \frac{x - z_0}{x - \bar{z}_0} \right| = |\lambda|.$$

Это означает, что образ действительной оси — окружность радиуса  $|\lambda|$ , поэтому  $|\lambda| = 1$  и  $\lambda = e^{i\theta}$  при некотором  $\theta \in \mathbb{R}$ .  $\square$





Меню

Часть I. Теория

Глава 2. Дифференцируемость

2.4. Элементарные аналитические функции



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 2.4. Элементарные аналитические функции

2.4.1. Экспоненциальная функция

2.4.2. Тригонометрические и гиперболические функции

2.4.3. Логарифмическая функция

2.4.4. Степенная функция

2.4.5. Обратные функции к тригонометрическим и гиперболическим



## 2.4.1. Экспоненциальная функция

**Определение 2.7.** Для  $z \in \mathbb{C}$  положим<sup>3</sup>

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y),$$

где  $z = x + iy$ .

В частности, при  $x = 0$  мы получаем *формулу Эйлера*

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y, \quad y \in \mathbb{R}, \quad (2.18)$$

которая приводит к *экспоненциальной форме* записи комплексных чисел

$$z = |z|e^{i \operatorname{Arg} z}. \quad (2.19)$$

Запишем действительную и мнимую части для  $e^z$

$$u(x, y) = e^x \cos y, \quad v(x, y) = e^x \sin y.$$

Они имеют частные производные любого порядка. В частности, непосредственное вычисление дает нам равенства

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= e^x \cos y, & \frac{\partial u}{\partial y} &= -e^x \sin y, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= e^x \sin y, & \frac{\partial v}{\partial y} &= e^x \cos y, \end{aligned}$$

которые показывают, что **условия Коши – Римана** выполнены, поэтому по **теореме 2.2** функция  $f(z) = e^z$  является **аналитической** во всей комплексной плоскости, то есть целой (см. **раздел 2.2.3**). Кроме того, из **соотношений (2.4)** следует, что

$$(e^z)' = \frac{\partial}{\partial x}(e^x e^{iy}) = e^{iy} e^x = e^z.$$

<sup>3</sup>Иногда мы пишем  $\exp z$  вместо  $e^z$ .



Так как очевидно, что  $|e^{iy}| = 1$  для любого  $y \in \mathbb{R}$ , то  $|e^z| = e^x \neq 0$ . Следовательно, экспоненциальная функция осуществляет **конформное отображение** в любой точке  $z \in \mathbb{C}$ .

Важнейшее свойство экспоненциальной функции

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}, \quad (2.20)$$

известное нам для действительных значений  $z_1, z_2 \in \mathbb{R}$ , остается справедливым и для любых комплексных  $z_1 = x_1 + iy_1$  и  $z_2 = x_2 + iy_2$ . В самом деле,

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{x_1} (\cos y_1 + i \sin y_1) e^{x_2} (\cos y_2 + i \sin y_2) = e^{x_1+x_2} [\cos(y_1 + y_2) + i \sin(y_1 + y_2)] = e^{z_1+z_2}.$$

Если  $k \in \mathbb{Z}$ , то

$$e^{z+2\pi ik} = e^x [\cos(y + 2\pi ik) + i \sin(y + 2\pi ik)] = e^z,$$

поэтому  $w = 2\pi ik$  является периодом экспоненциальной функции. Обратно, если  $w$  — период, т.е.  $e^{z+w} = e^z$  для любого  $z$ , то при  $z = 0$  получаем  $e^w = 1$ , отсюда  $w = 2\pi ik$ . Таким образом, мы описали множество всех периодов функции  $e^z$ , это  $\{2\pi ik : k \in \mathbb{Z}\}$ . Простейший ненулевой период  $2\pi i$  называется **основным периодом** экспоненциальной функции.



## 2.4.2. Тригонометрические и гиперболические функции

Из формулы Эйлера следует, что

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}.$$

Это дает нам возможность распространить определения синуса и косинуса на комплексные значения аргумента.

**Определение 2.8.** Для  $z \in \mathbb{C}$  положим

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}. \quad (2.21)$$

Эти функции называются *синусом* и *косинусом* соответственно.

Непосредственно из определения вытекает, что первая из них является четной, а вторая — нечетной. Обе являются периодическими с периодом  $2\pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . Число  $2\pi$  называется *основным периодом* для этих функций.

Из теоремы 2.1 вытекает, что эти функции дифференцируемы и их производные вычисляются по привычным формулам

$$(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z.$$

Следующие два тождества

$$2 \left\{ e^{i(z_1+z_2)} \pm e^{-i(z_1+z_2)} \right\} = (e^{iz_1} + e^{-iz_1})(e^{iz_2} \pm e^{-iz_2}) + (e^{iz_1} - e^{-iz_1})(e^{iz_2} \mp e^{-iz_2})$$

легко проверяются с помощью раскрытия скобок в правой части. Из них нетрудно вывести формулы сложения для тригонометрических функций

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2, \quad (2.22)$$

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2, \quad (2.23)$$



которые являются основными в теории тригонометрических функций, так как из (2.22)–(2.23) легко выводятся другие хорошо известные тождества для тригонометрических функций.

С помощью синуса и косинуса вводится еще одна пара тригонометрических функций — тангенс и котангенс.

**Определение 2.9.** Для  $z \in \mathbb{C}$  положим

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} z &= \frac{\sin z}{\cos z}, & z &\neq \frac{\pi}{2} + \pi k \quad (k \in \mathbb{Z}), \\ \operatorname{ctg} z &= \frac{\cos z}{\sin z}, & z &\neq \pi k \quad (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Эти функции называются *тангенсом* и *котангенсом* соответственно.

Для данных функций также легко вывести стандартные тригонометрические формулы, связывающие их.

С тригонометрическими функциями тесно связаны так называемые гиперболические функции.

**Определение 2.10.** Для  $z \in \mathbb{C}$  положим

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}.$$

Эти функции называются соответственно *гиперболическими синусом* и *гиперболическими косинусом*.

Из определений 2.8 и 2.10 вытекают следующие формулы, выражающие связь между тригонометрическими и гиперболическими функциями

$$\operatorname{ch} iz = \cos z, \quad \operatorname{sh} iz = -i \sin z.$$

В свою очередь отсюда и из *тригонометрических формул сложения* следуют формулы сложения для гиперболических функций

$$\begin{aligned} \operatorname{ch}(z_1 + z_2) &= \operatorname{ch} z_1 \operatorname{ch} z_2 + \operatorname{sh} z_1 \operatorname{sh} z_2, \\ \operatorname{sh}(z_1 + z_2) &= \operatorname{sh} z_1 \operatorname{ch} z_2 + \operatorname{ch} z_1 \operatorname{sh} z_2. \end{aligned}$$



Меню

Часть I. Теория

Глава 2. Дифференцируемость

2.4. Элементарные аналитические функции

2.4.2. Тригонометрические и гиперболические функции



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Отметим еще несколько формул подобного рода

$$\operatorname{Re} \cos z = \cos x \operatorname{ch} y, \quad \operatorname{Im} \cos z = -\sin x \operatorname{sh} y,$$

$$\operatorname{Re} \sin z = \sin x \operatorname{ch} y, \quad \operatorname{Im} \sin z = \cos x \operatorname{sh} y.$$

Отсюда, в частности,

$$|\cos z|^2 = \operatorname{sh}^2 y + \cos^2 x,$$

$$|\sin z|^2 = \operatorname{sh}^2 y + \sin^2 x.$$

Из **теоремы 2.1** следует, что гиперболические функции дифференцируемы, а формула для производной экспоненциальной функции приводит к равенствам

$$(\operatorname{sh} z)' = \operatorname{ch} z, \quad (\operatorname{ch} z)' = \operatorname{sh} z.$$



### 2.4.3. Логарифмическая функция

Здесь мы впервые столкнемся с многозначной функцией (см. [раздел 1.3.1](#)). Для любого  $w \neq 0$  множеством решений уравнения  $e^z = w$  является

$$\{\ln |w| + i(2\pi k + \arg w) : k \in \mathbb{Z}\} = \ln |w| + i \operatorname{Arg} w. \quad (2.24)$$

**Определение 2.11.** *Логарифмической* (с основанием  $e$ ) называется многозначная функция

$$\operatorname{Ln} z = \{\ln |z| + i(2\pi k + \arg z) : k \in \mathbb{Z}\} = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z.$$

*Главным значением* логарифма называется

$$\ln z = \ln |z| + i \arg z.$$

Для любого значения  $\operatorname{Ln} z$  справедливы равенства  $e^{\operatorname{Ln} z} = z$  (при  $z \neq 0$ ) и  $\operatorname{Ln} e^z = z$ . Это показывает, что логарифмическая функция является в некотором смысле обратной к *экспоненциальной*. Хотя в обычном понимании термина «обратная функция» это не так, потому что экспоненциальная функция не является взаимно однозначной.

В силу *основного свойства экспоненциальной функции* справедливы равенства

$$\ln(z_1 \cdot z_2) = \ln z_1 + \ln z_2$$

и

$$\operatorname{Ln}(z_1 \cdot z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2,$$

если последнее равенство понимать как совпадение множества слева и множества сумм элементов из слагаемых справа.

Отметим, что с равенствами для многозначных функций надо быть осторожным. Это показывает, например, следующий *парадокс Бернулли*

$$(-z)^2 = z^2 \Rightarrow \operatorname{Ln}(-z)^2 = \operatorname{Ln} z^2 \Rightarrow 2 \operatorname{Ln}(-z) = 2 \operatorname{Ln} z,$$



но множества  $\text{Ln}(-z)$  и  $\text{Ln} z$  не имеют общих элементов. Найдите ошибку в этом «рассуждении».

Выделение однозначной ветви логарифмической функции можно произвести, рассматривая сужение экспоненциальной функции, на какое-либо множество ее однолиственности, к примеру на полосу

$$S(a, k) = \{z \in \mathbb{C} : a + (2k - 1)\pi < \text{Im} z \leq a + (2k + 1)\pi\}.$$




Рис. 2.3

Однако можно поступить другим способом. Зафиксируем числа  $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  и  $k \in \mathbb{Z}$ , задавая тем самым значение логарифмической функции

$$\ln_k z_0 = \ln |z_0| + i(\arg z_0 + 2\pi k).$$




Рис. 2.4

При обходе вокруг начала координат  $0$  с возвратом в  $z_0$  мы придем к другому значению логарифмической функции. Поэтому  $0$  называется точкой ветвления логарифмической функции.





Меню

Часть I. Теория

Глава 2. Дифференцируемость

2.4. Элементарные аналитические функции

2.4.3. Логарифмическая функция



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Чтобы избежать этого, проведем разрез комплексной плоскости, соединяя 0 с бесконечно удаленной точкой  $\infty$ , например, лучом

$$\{te^{i\varphi_0} : t \in [0, +\infty)\},$$

где  $\varphi_0 \in [0, 2\pi)$  фиксировано. Тогда, переходя по любому пути из любой точки  $0 \neq z \in \mathbb{C}$ , мы не сможем вернуться в нее, пересекая этот луч. Поэтому мы возвращаемся в точку  $z$ , не изменяя значения функции в этой точке.

Таким образом, фиксация значения логарифмической функции в какой-либо точке  $0 \neq z_0 \in \mathbb{C}$  и проведение разреза, соединяющего точку ветвления с бесконечно удаленной точкой, позволяет выделить однозначную ветвь логарифмической функции.

**Производная** логарифмической функции, вычисляется независимо от выбора ветви на основании **теоремы 2.1** по формуле

$$(\operatorname{Ln} z)' = \frac{1}{z}.$$



Меню

Часть I. Теория

Глава 2. Дифференцируемость

2.4. Элементарные аналитические функции

2.4.4. Степенная функция



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 2.4.4. Степенная функция

**Определение 2.12.** *Степенной* функцией с показателем  $\mu \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  называется многозначная функция

$$z^\mu = e^{\mu \operatorname{Ln} z} = |z|^\mu e^{i\mu \operatorname{arg} z} e^{2\pi i k \mu}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Неоднозначность степенной функции обусловлена множителем  $e^{2\pi i k \mu}$ . Характер этой неоднозначности зависит от структуры показателя степени  $\mu$  и мы рассмотрим подробнее некоторые частные случаи выбора  $\mu$  в определении.

Если  $\mu = n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ , то (см. (2.19))

$$e^{n \operatorname{Ln} z} = e^{n(\ln |z| + i \operatorname{Arg} z)} = e^{n \ln |z|} e^{ni \operatorname{Arg} z} = (|z| e^{i \operatorname{arg} z})^n = z^n.$$

В этом случае степенная функция имеет единственное значение, совпадающее с привычным.

Если  $\mu = p/q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$  — рациональное число (считаем, что дробь  $p/q$  несократима), то  $e^{2\pi i k \mu}$  принимает  $q$  различных значений, получаемых при  $k = 0, 1, \dots, q - 1$ . Поэтому сейчас степенная функция в каждой точке имеет  $q$  различных значений.

Если  $\mu \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  — иррациональное число, то все значения  $e^{2\pi i k \mu}$  различны при различных  $k \in \mathbb{Z}$ . Следовательно, в случае иррационального  $\mu$  степенная функция  $z^\mu$  имеет счетное множество значений.

Выделение однозначной ветви степенной функции осуществляется как и выше для **логарифмической** (см. **раздел 2.4.3**): фиксируем значение в какой-либо точке  $z_0 \neq 0$  и производим разрез в комплексной плоскости, соединяя с его помощью  $z = 0$  и  $z = \infty$ .



## 2.4.5. Обратные функции к тригонометрическим и гиперболическим

Рассмотрим теперь определения «обратных» функций к **тригонометрическим** и **гиперболическим**. Как-вычки обусловлены тем, что эти функции выражаются через **экспоненциальную** (см. определения 2.8–2.10) и, естественно, не являются взаимно однозначными. Поэтому, как и в случае **логарифмической функции**, мы приходим к многозначным функциям.

Пусть задано число  $w \in \mathbb{C}$ . Решим уравнение  $\sin z = w$ . В силу **равенства (2.21)** оно сводится к уравнению

$$e^{2iz} - 2iwe^{iz} - 1 = 0$$

откуда  $e^{iz} = iw + \sqrt{1 - w^2}$ . Таким образом, множеством решений уравнения  $\sin z = w$  является (см. (2.24))  $-i \operatorname{Ln}(iw + \sqrt{1 - w^2})$ . Это приводит нас к определению многозначной функции **арксинуса**

$$\operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1 - z^2}).$$

Действуя аналогично, мы получим определения обратных к другим тригонометрическим функциям — **арккосинуса**

$$\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1}),$$

**арктангенса**

$$\operatorname{Arctg} z = \frac{1}{2i} \operatorname{Ln} \frac{1 + iz}{1 - iz},$$

**арккотангенса**

$$\operatorname{Arcctg} z = \frac{1}{2i} \operatorname{Ln} \frac{iz - 1}{iz + 1}.$$

Точно так же нетрудно придти к следующим определениям обратных функций к **гиперболическим** — **ареасинуса гиперболического**

$$\operatorname{Arsh} z = \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1})$$

и **ареакосинуса гиперболического**

$$\operatorname{Arch} z = \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 + 1}).$$

Читателю рекомендуется проделать это самостоятельно. Подчеркнем, что эти функции являются многозначными.



Меню

Часть I. Теория

Глава 3. Интегральные теорема и формула Коши



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 3

# Интегральные теорема и формула Коши

- 3.1. Криволинейные интегралы
- 3.2. Интегральная теорема Коши
- 3.3. Интегральная формула Коши



Меню

Часть I. Теория

Глава 3. Интегральные теорема и формула Коши

3.1. Криволинейные интегралы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 3.1. Криволинейные интегралы

3.1.1. Комплексные криволинейные интегралы

3.1.2. Свойства криволинейных интегралов



### 3.1.1. Комплексные криволинейные интегралы

Пусть задана **спрямляемая** ориентированная **жорданова кривая** (или **контур**)  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  и на  $\Gamma$  задана **непрерывная** функция  $f : \Gamma \rightarrow \mathbb{C}$ .

Возьмем любую параметризацию  $\gamma \in \mathcal{P}(\Gamma)$ ,  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ , сохраняющую ориентацию  $\Gamma$  и зададим произвольно разбиение

$$\Pi : \alpha = t_0 < \dots < t_n = \beta$$

ее области определения. На каждом частичном отрезке отметим точку  $\tau_k \in [t_{k-1}, t_k]$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$ , и составим интегральные суммы

$$s = s(\Pi, \tau) = \sum_{k=1}^n f(\tau_k)(\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})). \quad (3.1)$$

Рангом разбиения назовем число

$$\lambda_{\Pi} = \max\{t_k - t_{k-1} : k = 1, 2, \dots, n\}$$

(это — наибольшая из длин частичных отрезков  $[t_{k-1}, t_k]$ ).

**Определение 3.1.** Число  $I \in \mathbb{C}$  называется пределом интегральных сумм, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall (\Pi, \xi) \quad \lambda_{\Pi} < \delta \implies |s(\Pi, \xi) - I| < \varepsilon.$$

Если такой предел существует, то он называется **криволинейным интегралом (второго рода) от функции  $f$  вдоль кривой (контура)  $\Gamma$**  и обозначается

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz. \quad (3.2)$$

Отметим, что обычно значок интеграла с кружком используется только для интегралов по контуру. Мы же используем его и для жордановых кривых, чтобы отличать от обычного интеграла Римана.




Рис. 3.1

Если  $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ ,  $t \in [\alpha, \beta]$  и  $f = u + iv$ , то мы можем преобразовать выражение для **интегральных сумм (3.1)** следующим образом

$$s = \sum_{k=1}^n (u(\tau_k)(x(t_k) - x(t_{k-1})) - v(\tau_k)(y(t_k) - y(t_{k-1}))) + \\ + i \sum_{k=1}^n (v(\tau_k)(x(t_k) - x(t_{k-1})) + u(\tau_k)(y(t_k) - y(t_{k-1}))).$$

Действительная и мнимая части выражения справа являются интегральными суммами для обычных криволинейных интегралов второго рода от действительных функций, которые изучались в курсе математического анализа,

$$\oint_{\Gamma} (u dx - v dy) \quad \text{и} \quad \oint_{\Gamma} (v dx + u dy).$$



Меню

Часть I. Теория

Глава 3. Интегральные теорема и формула Коши

3.1. Криволинейные интегралы

3.1.1. Комплексные криволинейные интегралы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Следовательно, **комплексный криволинейный интеграл (3.2)** выражается в виде линейной комбинации этих интегралов

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \oint_{\Gamma} (u dx - v dy) + i \oint_{\Gamma} (v dx + u dy). \quad (3.3)$$





### 3.1.2. Свойства криволинейных интегралов

Из равенства (3.3) вытекает, что свойства комплексного криволинейного интеграла можно получить как следствия из соответствующих свойств криволинейных интегралов от действительных функций, которые рассматриваются в курсе математического анализа.

Прежде всего отметим, что в случае, когда ориентированная жорданова кривая или контур  $\Gamma$  является гладкой или кусочно-гладкой (см. раздел 1.4.1), то вычисление интеграла (3.2) сводится к вычислению интеграла Римана с помощью формул

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} (u(\gamma(t))x'(t) - v(\gamma(t))y'(t)) dt + i \int_{\alpha}^{\beta} (v(\gamma(t))x'(t) + u(\gamma(t))y'(t)) dt. \quad (3.4)$$

Здесь  $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ ,  $t \in [\alpha, \beta]$  — параметризация  $\Gamma$ .<sup>1</sup>

Равенство (3.4) можно переписать также в комплексной форме

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(t))\gamma'(t) dt. \quad (3.5)$$

Для этого достаточно отделить действительную и мнимую части в интеграле (3.5) слева и мы получим правую часть (3.4).

Используем формулу (3.4) для вычисления двух интегралов.

<sup>1</sup>Это вытекает из формул, сводящих вычисление криволинейного интеграла от действительной функции к интегралу Римана в случае гладкого (кусочно-гладкого) контура.



**Лемма 3.1.** Пусть  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  — гладкая (или кусочно-гладкая) кривая с началом в точке  $z_0$  и концом в  $z_1$ . Тогда

$$\oint_{\Gamma} dz = z_1 - z_0, \quad \oint_{\Gamma} z dz = \frac{z_1^2 - z_0^2}{2}.$$

В частности, если  $\Gamma$  — гладкий (или кусочно-гладкий) контур, то

$$\oint_{\Gamma} dz = \oint_{\Gamma} z dz = 0.$$

**Доказательство.** Пусть  $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ ,  $t \in [\alpha, \beta]$  — параметризация кривой  $\Gamma$ . Тогда по формуле (3.4)

$$\oint_{\Gamma} dz = \int_{\alpha}^{\beta} x'(t) dt + i \int_{\alpha}^{\beta} y'(t) dt = (x(\beta) - x(\alpha)) + i(y(\beta) - y(\alpha)) = z_1 - z_0.$$

Кроме того, снова применяя (3.4), получаем

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} z dz &= \int_{\alpha}^{\beta} (x(t)x'(t) - y(t)y'(t)) dt + i \int_{\alpha}^{\beta} (y(t)x'(t) + x(t)y'(t)) dt = \\ &= \frac{1}{2} (x^2(t) + 2ix(t)y(t) - y^2(t)) \Big|_{\alpha}^{\beta} = \frac{z_1^2 - z_0^2}{2}. \end{aligned}$$

Здесь было использовано равенство

$$\int_{\alpha}^{\beta} (y(t)x'(t) + x(t)y'(t)) dt = x(t)y(t) \Big|_{\alpha}^{\beta},$$

вытекающее из формулы интегрирования по частям. □



В качестве примера применения равенства (3.5) вычислим один специальный криволинейный интеграл, значение которого нам понадобится ниже.

**Лемма 3.2.** Пусть  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $z_0 \in \mathbb{C}$ ,  $\Gamma = \{z : |z - z_0| = r\}$  — окружность с центром в точке  $z_0$  радиуса  $r > 0$ . Тогда

$$\oint_{\Gamma} (z - z_0)^n dz = \begin{cases} 0 & \text{при } n \in \mathbb{Z}, n \neq -1, \\ 2\pi i & \text{при } n = -1. \end{cases}$$

**Доказательство.** Пусть сначала  $n \neq -1$ . Тогда, параметризуя окружность с помощью отображения  $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$ ,  $t \in [-\pi, \pi]$ , получаем

$$\oint_{\Gamma} (z - z_0)^n dz = \int_{-\pi}^{\pi} (re^{it})^n ire^{it} dt = ir^{n+1} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n+1)t} dt = \frac{r^{n+1}}{n+1} e^{i(n+1)t} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0$$

в силу  $2\pi$ -периодичности экспоненциальной функции.

В случае  $n = -1$  получаем

$$\oint_{\Gamma} \frac{dz}{z - z_0} = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{ire^{it} dt}{re^{it}} = i \int_{-\pi}^{\pi} dt = 2\pi i. \quad \square$$

Далее перечислим основные свойства комплексных криволинейных интегралов.

**Теорема 3.1 (свойства криволинейного интеграла).**

1. При изменении ориентации кривой или контура знак криволинейного интеграла изменяется на противоположный, т.е.

$$\oint_{-\Gamma} f(z) dz = - \oint_{\Gamma} f(z) dz.$$

2. Криволинейный интеграл обладает свойствами



а) *линейности*

$$\oint_{\Gamma} (\alpha f(z) + \beta g(z)) dz = \alpha \oint_{\Gamma} f(z) dz + \beta \oint_{\Gamma} g(z) dz,$$

б) *аддитивности* — если жорданова кривая или контур  $\Gamma$  является объединением жордановых кривых  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_2$ , причем конец  $\Gamma_1$  совпадает с началом  $\Gamma_2$ , то

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \oint_{\Gamma_1} f(z) dz + \oint_{\Gamma_2} f(z) dz.$$

3. Для криволинейного интеграла справедливы следующие оценки

$$\left| \oint_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq \oint_{\Gamma} |f| dl \leq \sup_{z \in \Gamma} |f(z)| \cdot l_{\Gamma}.$$

В средней части последних неравенств находится криволинейный интеграл первого рода.



Меню

Часть I. Теория

Глава 3. Интегральные теорема и формула Коши

3.2. Интегральная теорема Коши



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 3.2. Интегральная теорема Коши

3.2.1. Интегральная теорема

3.2.2. Обобщение интегральной теоремы Коши

3.2.3. Случай многосвязной области

3.2.4. Первообразная аналитической функции



### 3.2.1. Интегральная теорема

Следующая теорема является одним из центральных фактов теории функций комплексного переменного, лежащим в основе ее важнейших результатов.

**Теорема 3.2 (Коши, интегральная).** Пусть  $D \subset \mathbb{C}$  — односвязная область и функция  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  аналитична в  $D$ . Тогда для любого спрямляемого контура  $\Gamma \subset D$

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0.$$

Начнем обоснование этой теоремы с частного случая многоугольника (в этом случае утверждение нашей теоремы обычно называют леммой Гурса.

**Лемма 3.3 (Гурса).** Пусть  $D \subset \mathbb{C}$  — односвязная область, функция  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  аналитична в  $D$ . Тогда для любого многоугольника  $\Delta \subset D$  с границей  $\Gamma$  справедливо равенство

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0.$$

**Доказательство.** Достаточно рассмотреть случай треугольника, так как любой многоугольник разбивается в объединение конечного числа треугольников (см. левый рис. 3.2).

Обозначим

$$M = \left| \oint_{\Gamma} f(z) dz \right|$$

и разобьем  $\Delta$  на четыре треугольника, деля стороны пополам. Из них выберем тот треугольник  $\Delta_1$  с границей  $\Gamma_1$ , для которого

$$\left| \oint_{\Gamma_1} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4}.$$




Рис. 3.2

К  $\Delta_1$  применим такое же рассуждение, деля его на четыре треугольника.

Продолжая по индукции (см. правый рис. 3.2), мы получим последовательность замкнутых вложенных треугольников  $\{\Delta_n\}$  со свойством

$$\left| \oint_{\Gamma_n} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4^n}.$$

( $\Gamma_n$  — граница треугольника  $\Delta_n$ ).

По лемме Кантора существует точка  $z_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \Delta_n$ . Кроме того, так как  $z_0$  является внутренней точкой  $D$  (напомним, что  $D$  — область), то существует круг  $B(z_0, \delta) \subset D$ , содержащийся в  $D$ . При этом для достаточно больших  $n$  треугольник  $\Delta_n$  будет целиком содержаться в этом круге.

Далее используем дифференцируемость функции  $f$ . Для любого  $\varepsilon > 0$  существует такое  $\delta > 0$ , что для всех  $z$ , удовлетворяющих условию  $|z - z_0| < \delta$ , выполнено неравенство

$$|\rho(z)| < \varepsilon|z - z_0|, \quad \rho(z) = f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0).$$



Отсюда, используя еще утверждение [леммы 3.1](#) и неравенство из части 3 [теоремы 3.1](#), получаем

$$\begin{aligned} \frac{M}{4^n} &\leq \left| \oint_{\Gamma_n} f(z) dz \right| = \left| \oint_{\Gamma_n} [f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \rho(z)] dz \right| = \\ &= \left| \oint_{\Gamma_n} \rho(z) dz \right| < \varepsilon l_{\Gamma_n} \cdot \sup_{z \in \Delta_n} |z - z_0| = \varepsilon \frac{l_{\Gamma} \text{diam } \Gamma}{4^n}. \end{aligned}$$

Следовательно,  $M \leq \varepsilon l_{\Gamma} \text{diam } \Gamma$  для любого  $\varepsilon > 0$ , поэтому и  $M = 0$ . □

Из леммы Гурса можно вывести и утверждение [теоремы 3.2](#), совершая подходящий предельный переход. Мы не будем делать этого, так как в следующем разделе, также опираясь на лемму Гурса, докажем более общую форму этой теоремы.





### 3.2.2. Обобщение интегральной теоремы Коши

Введем понятие *модуля непрерывности* функции  $f$  на множестве  $A$  как

$$\omega(\delta, f, A) = \sup\{|f(x) - f(y)| : |x - y| < \delta, x, y \in A\}. \quad (3.6)$$

Это — удобная количественная характеристика функции, так как ее поведение при  $\delta \rightarrow +0$  отвечает за свойство равномерной непрерывности. Действительно, если  $A$  — компакт, то условие  $\lim_{\delta \rightarrow +0} \omega(\delta) = 0$  равносильно тому, что функция  $f$  равномерно непрерывна на  $A$ .

С помощью модуля непрерывности можно дать полезную оценку **криволинейного интеграла**.

**Лемма 3.4.** Если  $\Gamma$  — *спрямляемый контур* и функция  $f : \Gamma \rightarrow \mathbb{C}$  *непрерывна* на  $\Gamma$ , то

$$\left| \oint_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq \omega(\delta, f, \Gamma) l_{\Gamma}, \quad \delta = \text{diam } \Gamma.$$

**Доказательство.** В самом деле, пусть  $z_0 \in \Gamma$  — фиксированная точка. Тогда, используя **лемму 3.1**, получаем

$$\left| \oint_{\Gamma} f(z) dz \right| = \left| \oint_{\Gamma} [f(z) - f(z_0)] dz \right| \leq \sup_{z \in \Gamma} |f(z) - f(z_0)| l_{\Gamma} \leq \omega(\delta, f, \Gamma) l_{\Gamma}. \quad \square$$

Следующая теорема является обобщением **интегральной теоремы Коши**. Существенным отличием в новой формулировке будет то, что в ней не требуется **аналитичности** функции в точках контура.

**Теорема 3.3 (обобщенная теорема Коши).** Пусть  $D \subset \mathbb{C}$  — *односвязная область*, границей которой является *спрямляемый контур*, функция  $f : \bar{D} \rightarrow \mathbb{C}$  *аналитична* в области  $D$  и *непрерывна* в ее замыкании  $\bar{D}$ . Тогда

$$\oint_{\partial D} f(z) dz = 0.$$




Рис. 3.3

**Доказательство.** Возьмем  $0 < \delta < \frac{1}{3} \text{diam } \partial D$  и разобьем всю комплексную плоскость на открытые квадраты  $\{Q_n\}$  с помощью прямых  $\text{Im } z = k\delta, \text{Re } z = k\delta$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).

Введем два множества индексов

$$A = \{n : \overline{Q}_n \subset D\}, \quad B = \{n : \overline{Q}_n \cap \partial D \neq \emptyset\}$$

и обозначим  $\Delta_n = Q_n \cap D$  при  $n \in B$ . Тогда каждое из множеств  $\Delta_n, n \in B$ , открыто и является объединением конечного или счетного множества односвязных областей со спрямляемыми границами.

Запишем равенство (см. рис. 3.3, на котором квадраты  $Q_n$ , пересекающиеся с  $\partial D$  (при  $n \in B$ ), заштрихованы)

$$\oint_{\partial D} f(z) dz = \oint_{\partial(\bigcup_{n \in A} \overline{Q}_n)} f(z) dz + \sum_{n \in B} \oint_{\partial \Delta_n} f(z) dz \quad (3.7)$$

и заметим, что первое слагаемое справа в (3.7) равно нулю в силу **леммы 3.3**, так как  $\bigcup_{n \in A} \overline{Q}_n$  является многоугольником.

Наше утверждение будет доказано, если мы установим, что сумма справа в (3.7) стремится к нулю при  $\delta \rightarrow 0$ . Для оценки слагаемых этой суммы воспользуемся неравенством из **леммы 3.4**

$$\left| \oint_{\Delta_n} f(z) dz \right| \leq \omega(\delta\sqrt{2}, f, \partial \Delta_n) l(\partial \Delta_n) \leq \omega(\delta\sqrt{2}, f, \overline{D}) [l(\partial D \cap Q_n) + 4\delta].$$



Меню

Часть I. Теория

Глава 3. Интегральные теорема и формула Коши

3.2. Интегральная теорема Коши

3.2.2. Обобщение интегральной теоремы Коши



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Складывая эти неравенства, получаем

$$\left| \sum_{n \in B} \oint_{\partial \Delta_n} f(z) dz \right| \leq \omega(\delta\sqrt{2}, f, \bar{D}) \left\{ I(\partial D) + 4 \sum_{n \in B} \delta \right\}.$$

Пусть  $Q_n^*$  — квадрат, концентрический с  $Q_n$ , но с длиной стороны втрое больше. Так как  $\delta < \frac{1}{3} \text{diam } \partial D$ , а  $\partial D$  и  $Q_n$  имеют общую точку, то  $\partial Q_n^* \cap \partial D \neq \emptyset$ , следовательно,

$$\delta \leq I(\partial D \cap Q_n^*).$$

Складываем эти неравенства:

$$\sum_{n \in B} \delta \leq \sum_{n \in B} I(\partial D \cap Q_n^*) \leq 9 \sum_{n \in B} I(\partial D \cap Q_n) \leq 9I(\partial D),$$

а это означает, что при  $\delta \rightarrow 0$

$$\left| \oint_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq 37I(\partial D)\omega(\delta\sqrt{2}, f, \bar{D}) \rightarrow 0.$$

□



### 3.2.3. Случай многосвязной области

Интегральная теорема Коши допускает распространение на случай **конечносвязных областей**.

Пусть  $D_0, D_1, \dots, D_m \subset \mathbb{C}$  — односвязные **области**, границы которых  $\partial D_k$ ,  $k = 0, 1, \dots, m$ , являются **спрямляемыми контурами**, причем выполнены условия

$$\overline{D_k} \subset D_0; \overline{D_k} \cap \overline{D_j} \neq \emptyset, \quad (k \neq j)$$

Область

$$D = D_0 \setminus \bigcup_{k=1}^m \overline{D_k}$$

будем называть **стандартной  $(m+1)$ -связной областью**. Ее границей является объединение границ  $\bigcup_{k=0}^m \partial D_k$ . Положительно **ориентированной границей**  $(\partial D)^+$  будем называть

$$(\partial D_0)^+ \cup \left( \bigcup_{k=1}^m (\partial D_k)^- \right).$$

При таком соглашении при обходе границы в выбранном направлении область  $D$  останется слева.

Принятая только что терминология позволяет, в частности, упростить выражение «односвязная область, границей которой является спрямляемый контур», заменив его на «стандартная односвязная область».

**Теорема 3.4 (интегральная теорема Коши для многосвязной области).** Пусть  $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$  — стандартная многосвязная область, функция  $f$  **аналитична** в области  $D$  и **непрерывна** в ее замыкании  $\overline{D}$ . Тогда

$$\oint_{\partial D^+} f(z) dz = 0.$$

**Доказательство.** Пусть  $D$  — ограниченная  $(m+1)$ -связная область, граница, которой состоит из  $(m+1)$ -го спрямляемого контура  $\Gamma_k$ ,  $k = 0, 1, \dots, m$ , причем  $\Gamma_k$ ,  $k = 1, 2, \dots, m$ , лежат внутри  $\Gamma_0$ .




Рис. 3.4

Проведем в  $D$  разрезы по непересекающимся гладким **жордановым кривым**, соединяющим последовательно  $\Gamma_0$  с  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_1$  с  $\Gamma_2, \dots, \Gamma_{m-1}$  с  $\Gamma_m$  (см. рис. 3.4). Тогда мы получим односвязную область, к которой можно применить **теорему 3.3**. Каждый из разрезов при интегрировании по границе новой области проходится дважды в противоположных направлениях, поэтому интегралы по этим разрезам взаимно уничтожаются. Следовательно, интеграл по границе новой области совпадает с интегралом по границе области  $D$ . Отметим, что здесь неявно использовалось свойство **ориентируемости плоскости**.  $\square$



### 3.2.4. Первообразная аналитической функции

Пусть в области  $D \subset \mathbb{C}$  заданы две функции  $F : D \rightarrow \mathbb{C}$  и  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ .

**Определение 3.2.** Функция  $F$  называется *первообразной* для функции  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ , если для всех  $z \in D$  справедливо равенство

$$F'(z) = f(z).$$

Отметим, что любые две первообразные функции  $F$  отличаются на постоянное слагаемое. В самом деле, пусть  $F_1$  и  $F_2$  — две первообразные функции  $f$  в области  $D$  и

$$\Phi(z) = F_1(z) - F_2(z).$$

Тогда функция  $\Phi$  *аналитична* в  $D$  и ее *производная* тождественно равна нулю в области  $D$ . В силу *условий Коши–Римана*

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial \Phi}{\partial y}(x, y) = 0, \quad (x, y) \in D.$$

А тогда, как известно из курса математического анализа,  $\operatorname{Re} \Phi$  и  $\operatorname{Im} \Phi$  являются тождественными постоянными.

Итак, мы будем знать все первообразные, если сумеем найти хотя бы одну. Нашей следующей целью является указание способа нахождения первообразной аналитической функции.

Будем говорить, что *криволинейный интеграл (3.2)* не зависит от пути в области  $D$ , если для любых точек  $z_0, z_1 \in D$  и любой кусочно-гладкой жордановой кривой  $\Gamma \subset D$  с началом в  $z_0$  и концом в  $z_1$  *интеграл (3.2)* имеет одно и то же значение.

**Лемма 3.5.** Если  $D \subset \mathbb{C}$  — односвязная область и функция  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  аналитична в  $D$ , то интеграл (3.2) не зависит от пути в  $D$ .

**Доказательство.** Это нетрудно вывести из *интегральной теоремы Коши*. В самом деле, пусть  $z_0, z_1 \in D$  и  $\Gamma_1, \Gamma_2$  — две *жордановы кривые* с началом в точке  $z_0$  и концом в  $z_1$ . Нетрудно построить ломаную




Рис. 3.5

(см. рис. 3.5)  $\Gamma$  с началом в точке  $z_0$  и концом в  $z_1$ , дополняющую каждую из кривых  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_2$  до контура (т.е.  $\Gamma \cup \Gamma_1$  и  $\Gamma \cup \Gamma_2$  — контуры). В силу **интегральной теоремы Коши**

$$\oint_{\Gamma_1} f(z) dz - \oint_{\Gamma} f(z) dz = 0, \quad \oint_{\Gamma_2} f(z) dz - \oint_{\Gamma} f dz = 0.$$

Следовательно,

$$\oint_{\Gamma_1} f(z) dz = \oint_{\Gamma_2} f(z) dz. \quad \square$$

Итак, что при условиях **леммы 3.5** корректно определение следующей функции

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta := \int_{\Gamma} f(\zeta) d\zeta, \quad (3.8)$$

где  $\Gamma \subset D$  — любая **спрямляемая** жорданова кривая, соединяющая точки  $z_0$  и  $z$ . Эту функцию естественно назвать интегралом с переменным верхним пределом и началом в точке  $z_0$ .

**Теорема 3.5.** Пусть  $D \subset \mathbb{C}$  — односвязная область и функция  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  аналитична в  $D$ ,  $z_0 \in D$ . Тогда интеграл с переменным верхним пределом и началом в точке  $z_0$  является первообразной функции  $f$ .



Меню

Часть I. Теория

Глава 3. Интегральные теорема и формула Коши

3.2. Интегральная теорема Коши

3.2.4. Первообразная аналитической функции



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Доказательство. Пусть  $z \in D$  и  $r_0 > 0$  мало настолько, чтобы круг  $B(z, 2r_0)$  содержался в области  $D$ . Для  $z_1 \in \overline{B}(z, r_0) \equiv \overline{B}_0$  рассмотрим выражение

$$\left| \frac{F(z_1) - F(z)}{z_1 - z} - f(z) \right| = \left| \frac{1}{z_1 - z} \oint_{[z, z_1]} (f(\zeta) - f(z)) d\zeta \right| \leq \omega(|z_1 - z|, f, \overline{B}_0) \rightarrow 0, \quad (z_1 \rightarrow z).$$

Здесь были использованы оценка криволинейного интеграла из части 3 **теоремы 3.1** и определение **модуля непрерывности**.  $\square$

**Теорема 3.6 (формула Ньютона – Лейбница).** Пусть  $D \subset \mathbb{C}$  — односвязная область и функция  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  аналитична в  $D$ . Тогда для любых точек  $z_0$  и  $z_1$  и любой жордановой кривой  $\Gamma \subset D$ , соединяющей эти точки, справедливо равенство

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \Phi(z_1) - \Phi(z_0),$$

где  $\Phi$  — любая первообразная функции  $f$  в области  $D$ .

Доказательство. Запишем интеграл из (3.8)

$$F(z) = \oint_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta,$$

который является первообразной для функции  $f$  в области  $D$  по **теореме 3.5**. По доказанному выше существует такое число  $C \in \mathbb{C}$ , что для всех  $z \in D$

$$\Phi(z) = F(z) + C.$$

Это число  $C$  находим, подставляя в последнее равенство  $z = z_0$ , получая  $C = \Phi(z_0)$ . Беря теперь здесь  $z = z_1$ , приходим к нужному равенству.  $\square$





Меню

Часть I. Теория

Глава 3. Интегральные теорема и формула Коши

3.3. Интегральная формула Коши



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 3.3. Интегральная формула Коши

3.3.1. Интегральная формула Коши

3.3.2. Формула среднего значения и принцип максимума

3.3.3. Формула Шварца

3.3.4. Интеграл типа Коши

3.3.5. Теорема Мореры

3.3.6. Сопряженные гармонические функции



### 3.3.1. Интегральная формула Коши

Здесь мы докажем важнейшее из следствий **интегральной теоремы Коши**. Это — замечательная формула Коши, которая количественно закрепляет удивительное свойство **аналитических функций**: ее значения в **области** можно восстановить по ее значениям на границе этой области.

**Теорема 3.7 (формула Коши)**. Пусть  $D \subset \mathbb{C}$  — стандартная многосвязная область и функция  $f: \bar{D} \rightarrow \mathbb{C}$  аналитична в области  $D$  и **непрерывна** в ее замыкании  $\bar{D}$ . Тогда для любого  $z \in D$  справедливо равенство

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (3.9)$$




Рис. 3.6

**Доказательство.** Пусть  $\varepsilon_0 > 0$  выбрано так, что  $\bar{B}_0 = \bar{B}(z, \varepsilon_0) \subset D$ . Тогда для  $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$  по **интегральной теореме Коши**, применяемой к функции  $\zeta \mapsto f(\zeta)(\zeta - z)^{-1}$  в стандартной многосвязной области  $D \setminus \bar{B}(z, \varepsilon)$  (см. рис 3.6 и п.3.2.3 об ориентации границы многосвязной области),

$$\oint_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \oint_{C_\varepsilon^-(z)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 0$$

или

$$\oint_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \oint_{C_\varepsilon^+(z)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (3.10)$$



Меню

Часть I. Теория

Глава 3. Интегральные теорема и формула Коши

3.3. Интегральная формула Коши

3.3.1. Интегральная формула Коши



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

С другой стороны, используя случай  $n = -1$  [леммы 3.2](#), мы видим, что

$$\begin{aligned} \left| 2\pi i f(z) - \oint_{C_\varepsilon^+(z)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| &= \left| \oint_{C_\varepsilon^+(z)} \frac{f(z)}{\zeta - z} d\zeta - \oint_{C_\varepsilon^+(z)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| \leq \\ &\leq \sup_{\zeta \in C_\varepsilon^+(z)} |f(z) - f(\zeta)| \frac{2\pi\varepsilon}{\varepsilon} \leq 2\pi\omega(\varepsilon, f, \overline{B}_0) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

(определение модуля непрерывности  $\omega$  см. в [\(3.6\)](#)) при  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Поэтому при  $\varepsilon \rightarrow 0$

$$\oint_{C_\varepsilon^+(z)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \rightarrow 2\pi i f(z).$$

Учитывая [\(3.10\)](#), получаем требуемое равенство. □

Интеграл в [формуле \(3.9\)](#) называется *интегралом Коши*, функция  $f$  — *плотностью интеграла Коши*, а функция  $(\zeta - z)^{-1}$  — *ядром Коши*.

Если  $z \notin \overline{D}$ , то функция  $\zeta \mapsto f(\zeta)(\zeta - z)^{-1}$  является аналитической в  $D$  и непрерывной в  $\overline{D}$ , поэтому в силу [интегральной теоремы Коши](#) интеграл от нее вдоль  $\partial D$  будет равен нулю. Таким образом, [формулу Коши](#) можно переписать так

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \begin{cases} f(z), & z \in D \\ 0 & z \notin \overline{D}. \end{cases} \quad (3.11)$$

Далее выведем из формулы Коши несколько других равенств такого же типа, дающих формулы для вычисления значений функции по ее значениям на окружностях.



### 3.3.2. Формула среднего значения и принцип максимума

**Теорема 3.8 (формула среднего значения).** Пусть функция  $f$  *аналитична* в круге  $B(z, r_0)$ , тогда при  $0 < r < r_0$  справедливы равенства

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + re^{i\theta}) d\theta = f(z),$$

в частности,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} f(z + re^{i\theta}) d\theta = \operatorname{Re} f(z), \quad \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{Im} f(z + re^{i\theta}) d\theta = \operatorname{Im} f(z).$$

**Доказательство.** Применим **формулу Коши** для круга  $B(z, r)$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \left[ \begin{array}{l} \zeta = z + re^{i\theta} \\ d\zeta = ire^{i\theta} d\theta \end{array} \right] = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{|\zeta-z|=r} \frac{f(z + re^{i\theta}) ire^{i\theta}}{re^{i\theta}} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + re^{i\theta}) d\theta. \end{aligned}$$

Вторая часть теоремы получается из первой отделением действительной и мнимой частей.  $\square$

**Теорема 3.9 (принцип максимума модуля).** Если функция аналитична в некоторой *области*, то ее модуль не может иметь точек строго локального максимума в области аналитичности.

**Доказательство.** Предположим противное, т.е. для некоторого  $z_0$  в области аналитичности неравенство  $|f(z_0)| > |f(z_0 + re^{i\theta})|$  выполнено для всех  $z$  из достаточно малой окрестности точки  $z_0$ . Отсюда следует, что

$$|f(z_0)| > \sup_{\theta \in [0, 2\pi]} |f(z_0 + re^{i\theta})|$$



(непрерывная функция  $\theta \mapsto |f(z_0 + re^{i\theta})|$ ,  $\theta \in [0, 2\pi]$ , принимает свое максимальное значение на компакте  $[0, 2\pi]$ ).

С другой стороны, из формулы среднего значения следует, что

$$|f(z_0)| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta \right| \leq \sup_{\theta \in [0, 2\pi]} |f(z_0 + re^{i\theta})|.$$

Противоречие доказывает наше утверждение. □




Рис. 3.7

Приведем еще одну форму принципа максимума.

**Теорема 3.10 (принцип максимума модуля).** Если функция  $f$  аналитична в некоторой области  $D \subset \mathbb{C}$  и ее модуль  $|f|$  имеет локальный максимум в некоторой точке из  $D$ , то  $f$  есть тождественная постоянная.

**Доказательство.** Пусть  $f$  не является тождественной постоянной, но  $z_0 \in D$  точка локального максимума для  $|f|$ . Тогда существует такое  $r > 0$ , что при  $z \in B(z_0, r)$  выполнено неравенство  $|f(z)| \leq |f(z_0)|$ .



В силу **принципа сохранения области** образ  $f(B(z_0, r))$  содержит некоторый круг  $B(f(z_0), \rho)$ ,  $\rho > 0$ . Возьмем любую точку  $w_1 \in B(f(z_0), \rho)$  с  $|w_1| > |f(z_0)|$ . Тогда существует такая точка  $z_1 \in B(z_0, r)$ , что  $f(z_1) = w_1$ . При этом  $|f(z_1)| > |f(z_0)|$  — противоречие.  $\square$

В качестве приложения принципа максимума приведем следующее утверждение, которое часто используется в теории функций комплексного переменного.

**Теорема 3.11 (Лиувилля).** *Если функция аналитична во всей комплексной плоскости и ограничена, то она является тождественной постоянной.*

**Доказательство.** Пусть  $z \in \mathbb{C}$  и  $r > |z|$ , тогда по **теореме 3.14**

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r(0)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta.$$

Тогда

$$\begin{aligned} |f'(z)| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r(0)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta \right| = \left[ \begin{array}{l} \zeta = re^{i\theta} \\ d\zeta = ire^{i\theta} d\theta \end{array} \right] = \\ &= \frac{1}{2\pi} \left| \oint_{C_r(0)} \frac{f(re^{i\theta})ire^{i\theta}}{(re^{i\theta} - z)^2} d\zeta \right| \leq \frac{Mr}{(r - |z|)^2} \rightarrow 0, \quad r \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

если  $|f(z)| \leq M$  для всех  $z \in \mathbb{C}$ . Итак, **производная** функции  $f$  тождественно равна нулю и  $f$  есть тождественная постоянная.  $\square$

**Лемма 3.6 (Шварца).** *Пусть функция  $f$  аналитична в круге  $B(0, R)$ ,  $f(0) = 0$  и  $f(z) \leq M$  при  $z \in C_R(0)$ .*  
Тогда

$$|f(z)| \leq \frac{M}{R} |z| \quad \text{при} \quad z \in B(0, R).$$



Меню

Часть I. Теория

Глава 3. Интегральные теорема и формула Коши

3.3. Интегральная формула Коши

3.3.2. Формула среднего значения и принцип максимума



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

При этом, если в некоторой точке  $0 \neq z_0 \in B(0, R)$  достигается равенство, то  $f(z) = e^{i\theta} Mz/R$  для некоторого  $\theta \in \mathbb{R}$ .

**Доказательство.** Функция  $g(z) = f(z)/z$  аналитична в круге  $B(0, R)$  и удовлетворяет неравенству  $g(z) \leq M/R$  на его границе. В силу **принципа максимума**  $|g(z)| < M/R$  при  $z \in B(0, R)$ .

Если  $|f(z)| = M|z|/R$  в некоторой точке  $0 \neq z_0 \in B(0, R)$ , то функция  $|g|$  во внутренней точке круга  $B(0, R)$  имеет локальный максимум. По **теореме 3.10**  $g$  является тождественной постоянной, по модулю равной 1. □



### 3.3.3. Формула Шварца

Следующая теорема говорит нам о том, что значения **аналитической** функции в круге можно вычислить, используя лишь значения ее действительной части на границе круга.

**Теорема 3.12 (формула Шварца).** Пусть функция  $f$  аналитична в открытом круге  $B(z_0, r)$  и непрерывна в его замыкании  $\bar{B}(z_0, r)$ . Тогда при  $z \in B(z_0, r)$  справедливо равенство

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} f(z_0 + re^{it}) \frac{re^{it} + (z - z_0)}{re^{it} - (z - z_0)} dt + i \operatorname{Im} f(z_0).$$

**Доказательство.** Для простоты будем считать  $z_0 = 0$ . Пусть  $z \in B(0, r)$  и  $z^* = r^2/\bar{z}$ , тогда  $z^* \in \mathbb{C} \setminus \bar{B}(0, r)$ .

По **формуле Коши** и **интегральной теореме Коши** справедливы равенства

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad 0 = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z^*} d\zeta,$$

где  $C_r = \{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta - z| = r\}$  — окружность с центром в точке  $z$  радиуса  $r$ . Вычтем из первого второе и воспользуемся тем, что при  $z = re^{it}$

$$\zeta - z = re^{it} - re^{i\theta}, \quad \zeta - z^* = re^{it} - \frac{r^2}{\rho} e^{i\theta}, \quad d\zeta = ire^{it} dt.$$

Тогда мы получим равенство

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{it}) \frac{r^2 - \rho^2}{r^2 - 2r\rho \cos(t - \theta) + \rho^2} dt. \quad (3.12)$$

Далее, легко видеть, что

$$\operatorname{Re} \frac{re^{it} + z}{re^{it} - z} = \frac{r^2 - \rho^2}{r^2 - 2r\rho \cos(t - \theta) + \rho^2},$$





Меню

Часть I. Теория

Глава 3. Интегральные теорема и формула Коши

3.3. Интегральная формула Коши

3.3.3. Формула Шварца



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

следовательно,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{it}) \operatorname{Re} \frac{re^{it} + z}{re^{it} - z} dt.$$

Рассмотрим функцию

$$g(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} f(re^{it}) \frac{re^{it} + z}{re^{it} - z} dt.$$

Она аналитична в круге  $B(0, r)$  — это проверяется непосредственной проверкой ее дифференцируемости. Кроме того, из доказанного **равенства (3.12)** следует, что  $\operatorname{Re} f \equiv \operatorname{Re} g$ , поэтому функции  $f$  и  $g$  различаются на некоторую постоянную  $C$  (см. замечание в конце **раздела 2.1.3**). В частности,  $C = f(0) - g(0)$ , но  $\operatorname{Re} f(0) - \operatorname{Re} g(0) = 0$  и  $\operatorname{Im} g(0) = 0$ , следовательно,  $C = i \operatorname{Im} f(0)$ .  $\square$



### 3.3.4. Интеграл типа Коши

Пусть  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  — **спрямляемая жорданова кривая** или **контур** и на  $\Gamma$  задана **непрерывная** функция  $f : \Gamma \rightarrow \mathbb{C}$ . Тогда для любого  $z \notin \Gamma$  существует интеграл

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (3.13)$$

**Определение 3.3.** Интеграл (3.13) называется **интегралом типа Коши**<sup>2</sup>. Функция  $f$  в (3.13) называется **плотностью интеграла типа Коши**.

Рассмотрим случай, когда  $D \subset \mathbb{C}$  стандартная многосвязная область,  $\Gamma = \partial D$  — ее граница. Тогда, если задана функция  $f$ , **аналитическая** в области  $D$  и непрерывная в ее замыкании, то интеграл типа Коши совпадает с **интегралом Коши** в  $D$  и тождественно равен нулю в  $\mathbb{C} \setminus \overline{D}$  (см. (3.11)).

**Теорема 3.13.** Пусть  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  — **спрямляемая жорданова кривая** или **контур** и на  $\Gamma$  задана непрерывная функция  $f : \Gamma \rightarrow \mathbb{C}$ . Тогда **интеграл типа Коши**  $F$  является аналитической функцией в каждой точке из  $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ , функция  $F : \mathbb{C} \setminus \Gamma \rightarrow \mathbb{C}$  имеет **производные** любого порядка и

$$F^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma, \quad k \in \mathbb{N}.$$

**Доказательство.** Рассмотрим функцию

$$F_k(z) = \frac{(k-1)!}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^k} d\zeta, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma$$

и покажем, что

$$F'_k(z) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma. \quad (3.14)$$

<sup>2</sup>В отличие от **интеграла Коши**.



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Для этого покажем, что выражение

$$I(h) = \frac{F_k(z+h) - F_k(z)}{h} - \frac{k!}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{k+1}} d\zeta$$

сходится к нулю при  $h \rightarrow 0$ . Будем считать, что  $|h| < d$ , где  $d = \frac{1}{2} \text{dist}(z, \Gamma)$ .

Используя формулу бинома Ньютона, запишем

$$I(h) = \frac{(k-1)!}{2\pi i h} \oint_{\Gamma} f(\zeta) P(\zeta, h) d\zeta,$$

где

$$P(\zeta, h) = \frac{1}{(\zeta-z-h)^k} - \frac{1}{(\zeta-z)^k} - \frac{kh}{(\zeta-z)^{k+1}} = \frac{h^2 Q(\zeta, h)}{(\zeta-z-h)^k (\zeta-z)^{k+1}}$$

и

$$Q(\zeta, h) = - \sum_{j=2}^k (-1)^j C_k^j (\zeta-z)^{k-j+1} h^{j-2} - k \sum_{j=1}^k (-1)^j C_k^j (\zeta-z)^{k-j} h^{j-1}.$$

Легко убедиться в том, что это выражение ограничено некоторой постоянной  $A > 0$ , зависящей только от кривой  $\Gamma$ ,  $z$  и от  $d$ ,

$$|Q(\zeta, h)| \leq A.$$

Поэтому,

$$|P(\zeta, h)| \leq \frac{A|h|^2}{d^{2k+1}}$$

и

$$|I(h)| \leq \frac{k! A |h|}{2\pi d^{2k+1}} \sup_{\zeta \in \Gamma} |f(\zeta)| \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0.$$

Применяя доказанное при  $k = 0$ , получаем **дифференцируемость** функции  $F$  и базу для доказательства нашей теоремы по индукции. Предполагая, что наше утверждение уже доказано для  $k - 1$ , т.е.  $F^{(k-1)}(z) = F_k(z)$  из (3.14) видим, что оно верно и для  $k$ .  $\square$



Меню

Часть I. Теория

Глава 3. Интегральные теорема и формула Коши

3.3. Интегральная формула Коши

3.3.4. Интеграл типа Коши



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Из **теоремы 3.13** и замечания перед ее формулировкой сразу вытекает следующая важная теорема.

**Теорема 3.14.** Пусть  $D \subset \mathbb{C}$  — стандартная многосвязная область и функция  $f : \bar{D} \rightarrow \mathbb{C}$  аналитична в области  $D$  и непрерывна в ее замыкании  $\bar{D}$ . Тогда  $f$  имеет производные любого порядка в  $D$  и справедливы равенства

$$f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma, \quad k \in \mathbb{N}. \quad (3.15)$$

В частности, все производные аналитической функции являются аналитическими.



### 3.3.5. Теорема Мореры

Здесь мы докажем утверждение, которое является в некотором смысле обратным к **интегральной теореме Коши**.

**Лемма 3.7.** Пусть функция  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  **непрерывна** в области  $D \subset \mathbb{C}$  и интеграл от нее по границе любого треугольника  $\Delta$ ,  $\bar{\Delta} \subset D$ , равен нулю. Тогда в любом круге  $B(z_0, r) \subset D$  функция  $f$  имеет **первообразную**.

**Доказательство.** Введем в рассмотрение функцию

$$F(z) = \oint_{[z_0, z]} f(\zeta) d\zeta, \quad z \in B = B(z_0, r)$$

(интеграл берется по отрезку, соединяющему точки  $z_0$  и  $z$ ) и пусть  $h \neq 0$  мало настолько, что  $z+h \in B(z_0, r)$ . По условию

$$\oint_{[z_0, z]} f(\zeta) d\zeta + \oint_{[z, z+h]} f(\zeta) d\zeta + \oint_{[z+h, z]} f(\zeta) d\zeta = 0.$$

Это равенство можно переписать в виде

$$\oint_{[z+h, z]} f(\zeta) d\zeta - \oint_{[z_0, z]} f(\zeta) d\zeta = \oint_{[z, z+h]} f(\zeta) d\zeta$$

или

$$F(z+h) - F(z) = \oint_{[z, z+h]} f(\zeta) d\zeta.$$

Отсюда после несложных преобразований получаем

$$\left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| = \left| \frac{1}{h} \oint_{[z, z+h]} [f(\zeta) - f(z)] d\zeta \right| \leq \sup_{\zeta \in [z, z+h]} |f(\zeta) - f(z)| \rightarrow 0$$



Меню

Часть I. Теория

Глава 3. Интегральные теорема и формула Коши

3.3. Интегральная формула Коши

3.3.5. Теорема Мореры



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

при  $h \rightarrow 0$  в силу непрерывности функции  $f$  в точке  $z$ . Здесь была использована часть 3 **теоремы 3.1**. Итак,  $F'(z) = f(z)$  для любого  $z \in B(z_0, r)$  и лемма доказана.  $\square$

**Теорема 3.15 (Мореры).** Если  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  непрерывна в области  $D \subset \mathbb{C}$  и интеграл от нее по границе любого треугольника  $\Delta$ ,  $\bar{\Delta} \subset D$ , равен нулю, то  $f$  аналитична в  $D$ .

**Доказательство.** В силу **леммы 3.7** в любом круге  $B(z_0, r) \subset D$  функция  $f$  имеет первообразную. Поэтому она **аналитична** в  $B(z_0, r)$  как **производная** аналитической функции (см. **теорему 3.14**).  $\square$



### 3.3.6. Сопряженные гармонические функции

Введем обозначение

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

Это дифференциальное выражение называют *оператором Лапласа*. Функция  $u$ , заданная в некоторой **области**  $D \subset \mathbb{R}^2$  называется *гармонической* в области  $D$ , если она имеет непрерывные частные производные до второго порядка включительно и  $\Delta u = 0$  во всех точках этой области.

Пусть функция  $f$  **аналитична** в области  $D \subset \mathbb{C}$ , тогда по **теореме 3.14** она и ее действительная и мнимая части  $u = \operatorname{Re} f$ ,  $v = \operatorname{Im} f$  бесконечно дифференцируемы в  $D$ . Дифференцируя **условия Коши – Римана**

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

мы получим  $\Delta u = 0$ ,  $\Delta v = 0$ . Следовательно, действительная и мнимая части аналитической функции являются гармоническими.

Две гармонические функции  $u$  и  $v$ , связанные **уравнениями Коши – Римана**, называются *сопряженными гармоническими функциями*

**Теорема 3.16.** Пусть функция  $u$  гармонична в односвязной области  $D \subset \mathbb{C}$ . Тогда существует такая аналитическая в области  $D$  функция  $f$ , что  $\operatorname{Re} f = u$ .

**Доказательство.** Пусть  $(x_0, y_0) \in D$  — фиксированная точка и  $(x, y) \in D$  — произвольная точка в области  $D$ . Рассмотрим функцию

$$v(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy.$$

Здесь не имеет значения по какой кривой, соединяющей точки  $(x_0, y_0)$  и  $(x, y)$ , идет интегрирование. В силу условия  $\Delta u = 0$  выражение под знаком интеграла является полным дифференциалом и интеграл не



Меню

Часть I. Теория

Глава 3. Интегральные теорема и формула Коши

3.3. Интегральная формула Коши

3.3.6. Сопряженные гармонические функции



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

зависит от пути интегрирования. Частные производные функции  $v$  легко вычисляются (это делается в курсе анализа) и для них справедливы **условия Коши–Римана**. Поэтому в силу **теоремы 2.2** функция  $f = u + iv$  аналитична.  $\square$

Из этой теоремы следует, что гармонические функции обладают рядом свойств аналитических функций. В частности, они бесконечно дифференцируемы, для них справедливы **формулы средних значений**, доказательство принципа максимума говорит о том, что он справедлив для гармонических функций.





Меню

Часть I. Теория

Глава 4. Последовательности и ряды



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 4

# Последовательности и ряды

4.1. Ряды Тейлора

4.2. Теоремы единственности

4.3. Последовательности аналитических функций



Меню

Часть I. Теория

Глава 4. Последовательности и ряды

4.1. Ряды Тейлора



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 4.1. Ряды Тейлора

4.1.1. Основные понятия теории рядов

4.1.2. Степенные ряды

4.1.3. Радиус сходимости и формула Коши — Адамара

4.1.4. Разложение в степенной ряд

4.1.5. Эквивалентные описания аналитичности



### 4.1.1. Основные понятия теории рядов

Напомним прежде всего основные понятия общей теории рядов, адаптированные к комплексному случаю. Если  $\{a_k\} \subset \mathbb{C}$  — последовательность комплексных чисел, то символ

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad (4.1)$$

называют *рядом*.

Чисто формальное восприятие знака суммы означает, что мы пытаемся складывать бесконечное число слагаемых. Такая операция нуждается в дополнительном определении.

С каждым *рядом* (4.1) свяжем последовательность сумм

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

которые называются его *частичными суммами*.

*Ряд* (4.1) называется *сходящимся*, если сходится последовательность его частичных сумм, т.е. существует число  $s \in \mathbb{R}$ , для которого

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s.$$

В этом случае  $s$  называется *суммой ряда* и мы пишем  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = s$ . В противном случае ряд называется *расходящимся*.

Итак, по определению вопрос о сходимости ряда сводится к вопросу о сходимости последовательности его частичных сумм. Обратно, если задана последовательность  $\{s_k\} \subset \mathbb{R}$ , то, полагая

$$a_1 = s_1, \quad a_k = s_k - s_{k-1} \quad (k = 2, 3, \dots),$$

получаем *ряд* (4.1), для которого  $\{s_k\}$  является последовательностью частичных сумм (проверьте это самостоятельно).



Таким образом, вопрос о сходимости последовательности — вопрос о сходимости некоторого ряда. Следовательно, рассмотрение рядов — это лишь новая форма изучения последовательностей. Но такой подход даст нам новые возможности как при установлении существования предела, так и при его вычислении. Мы увидим, что теория рядов является мощным средством теории функций комплексного переменного.

**Пример 4.1.** Простейшими примерами сходящихся рядов могут служить следующие:

— ряд с постоянными слагаемыми

$$\sum_{k=1}^{\infty} a$$

сходится тогда и только тогда, когда  $a = 0$ ,

— геометрический ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} az^k, \quad a \neq 0,$$

сходится тогда и только тогда, когда  $|z| < 1$ , при этом

$$\sum_{k=0}^{\infty} az^k = \frac{a}{1-z}, \quad |z| < 1. \quad (4.2)$$

**Лемма 4.1.** *Ряд (4.1) сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм фундаментальна, т.е.*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall n, m \geq n_\varepsilon \quad |s_n - s_m| < \varepsilon.$$

В частности, если ряд (4.1) сходится, то  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

Ряд (4.1) называется *абсолютно сходящимся*, если сходится ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|. \quad (4.3)$$

Из **леммы 4.1** вытекает, что из абсолютной сходимости ряда следует его сходимоть. Обратное неверно — существуют сходящиеся ряды, которые не являются абсолютно сходящимися. Если **ряд (4.1)** сходится, а **ряд (4.3)** расходится, то говорят, что **ряд (4.1)** сходится *условно*.



## 4.1.2. Степенные ряды

**Определение 4.1.** *Степенным рядом* будем называть ряд вида

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k, \quad (4.4)$$

при этом  $c_k$  — *коэффициенты* степенного ряда, а  $z_0$  — его *центр*.

*Областью сходимости ряда (4.4)* называется множество тех  $z \in \mathbb{C}$ , для которых он сходится.

Следующие утверждения показывают, что область сходимости степенного ряда не может быть произвольной и имеет весьма специфическую структуру.

**Лемма 4.2 (Абея).** *Если степенной ряд сходится при некотором  $z^* \neq z_0$ , то он сходится абсолютно в круге*

$$B(z_0 : |z^* - z_0|) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < |z^* - z_0|\}$$

*и равномерно в любом круге  $\bar{B}(z_0, r)$ ,  $0 < r < |z^* - z_0|$ .*

**Доказательство.** В силу сходимости степенного ряда в точке  $z^*$  его слагаемые в этой точке ограничены, т.е. существует такое число  $M > 0$ , что  $|c_k (z^* - z_0)^k| \leq M$  при  $k \in \mathbb{N}$ . Если  $z \in \mathbb{C}$  таково, что  $|z - z_0| < |z^* - z_0|$ , то

$$|c_k (z - z_0)^k| = |c_k (z^* - z_0)^k| \cdot \left| \frac{z - z_0}{z^* - z_0} \right|^k \leq M \left| \frac{z - z_0}{z^* - z_0} \right|^k.$$

Абсолютная сходимость следует теперь из (4.2). Точно так же получается равномерная сходимость в любом круге  $\bar{B}(z_0, r)$  меньшего радиуса.  $\square$

**Теорема 4.1 (Коши – Адамара).** *Пусть  $\{c_k\}_{k=0}^{\infty} \subset \mathbb{C}$  и*

$$l = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}.$$



Тогда при

- 1)  $l = \infty$  **ряд (4.4)** расходится при всех  $z \neq z_0$ ,
- 2)  $l > 0$  **ряд (4.4)** сходится при всех  $z$  с  $|z - z_0| < 1/l$  и расходится при всех  $z$  с  $|z - z_0| > 1/l$ ,
- 3)  $l = 0$  **ряд (4.4)** сходится при любом  $z \in \mathbb{C}$ .

**Доказательство.** 1) В этом случае для любого  $z \neq z_0$  для бесконечно многих  $k \in \mathbb{N}$  выполнено неравенство  $\sqrt[k]{|c_k|} \cdot |z - z_0| > 1$  и слагаемые **ряда (4.4)** не стремятся к 0 — не выполнено необходимое условие сходимости ряда.

В случае 2) при  $|z - z_0| < 1/l$  применим к ряду признак Коши с корнем. Если же  $|z - z_0| > 1/l$ , то (как и в случае 1)) не выполнено необходимое условие сходимости ряда.

Наконец, в случае 3) при любом  $z \in \mathbb{C}$  по признаку Коши с корнем **ряд (4.4)** сходится.  $\square$



### 4.1.3. Радиус сходимости и формула Коши — Адамара

Формулировка [теоремы 4.1](#) делает естественным следующее понятие.

**Определение 4.2.** Число  $R \in \mathbb{R}$  называется *радиусом сходимости* [степенного ряда \(4.4\)](#), если этот ряд сходится при всех  $z$  с  $|z - z_0| < R$  и расходится при всех  $z$  с  $|z - z_0| > R$ .

Круг

$$B(z_0, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}$$

называется *кругом сходимости*.

Если [ряд \(4.4\)](#) сходится только при  $z = z_0$ , то считаем  $R = 0$ , а если [\(4.4\)](#) сходится при любом  $z \in \mathbb{C}$ , то считаем  $R = \infty$ .

[Теорема 4.1](#) доказывает существование радиуса сходимости и дает формулу для его вычисления.

[Теорема 4.2 \(формула Коши – Адамара\)](#). *Радиус сходимости  $R$  [степенного ряда \(4.4\)](#) вычисляется по формуле*

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}. \quad (4.5)$$

Конечно, [формула \(4.5\)](#) справедлива и в случаях  $R = 0$  и  $R = \infty$ , если считать  $1/0 = \infty$  и  $1/\infty = 0$ .

[Теорема 4.3.](#) *Сумма [степенного ряда \(4.4\)](#) с положительным радиусом сходимости аналитична в круге сходимости и его коэффициенты вычисляются по формулам*

$$c_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots,$$

где  $f$  — сумма ряда.

**Доказательство.** Аналитичность суммы ряда вытекает из [леммы Абеля](#) и [теоремы Вейерштрасса](#). Кроме того, из второй части [теоремы Вейерштрасса](#) следует, что при каждом  $n = 0, 1, \dots$  справедливо равенство

$$f^{(n)}(z) = \sum_{k=n}^{\infty} k(k-1) \dots (k-n+1) c_k (z - z_0)^{k-n}.$$



Меню

Часть I. Теория

Глава 4. Последовательности и ряды

4.1. Ряды Тейлора

4.1.3. Радиус сходимости и формула Коши — Адамара



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Беря здесь  $z = z_0$ , видим, что все слагаемые справа обращаются в нуль, кроме первого. Это приводит к равенствам  $f^{(n)}(z_0) = n!c_n$  и мы получаем формулы для коэффициентов.  $\square$

**Следствие 4.1.** *Два степенных ряда **вида (4.4)** с положительными радиусами сходимости, сходящиеся к одной и той же сумме в некотором круге  $B(z_0, \delta)$ , где  $\delta > 0$ , являются тождественными.*





#### 4.1.4. Разложение в степенной ряд

**Определение 4.3.** *Рядом Тейлора* функции  $f$  в точке  $z_0$  называется **степенной ряд**

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k. \quad (4.6)$$

Из **теоремы 4.3** сразу следует, что степенной ряд с положительным **радиусом сходимости** является рядом Тейлора своей суммы.

Конечно, чтобы записать **ряд (4.6)** мы должны потребовать существования **производных** любого порядка в точке  $z_0$ , а для этого на самом деле нужно, чтобы все производные существовали в некоторой **окрестности**  $z_0$ , т.е. функция  $f$  должна быть **аналитичной** в некоторой окрестности точки  $z_0$ . Кроме того, подчеркнем, что в этом определении ничего не говорится о сходимости **ряда (4.6)**.

Таким образом, возникают следующие естественные вопросы:

- сходится ли ряд Тейлора,
- чему равна его сумма в случае сходимости?

**Теорема 4.4 (Тейлора).** Пусть функция  $f$  аналитична в области  $D \subset \mathbb{C}$ ,  $z_0 \in D$ ,  $0 < r < d = \text{dist}(z_0, \partial D)$ . Тогда **степенной ряд (4.4)**, коэффициенты которого вычислены по формулам

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r(z_0)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta, \quad k = 0, 1, \dots, \quad (4.7)$$

сходится в круге  $B(z_0, d)$  к функции  $f$ .

**Доказательство.** Пусть  $z \in B(z_0, d)$  и обозначим  $\rho = |z - z_0| < r$  (ниже мы избавимся от предположения  $\rho < r$ ). Воспользуемся **интегральной формулой Коши** для круга  $B(z_0, r)$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r(z_0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$




Рис. 4.1

и разложим ядро Коши  $(\zeta - z)^{-1}$  в ряд

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^k}{(\zeta - z_0)^{k+1}}.$$

Умножим обе части этого равенства на  $(2\pi i)^{-1}f(\zeta)$ :

$$\frac{1}{2\pi i} \cdot \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} (z - z_0)^k$$

и проинтегрируем это равенство по  $\zeta \in C_r(z_0)$ , получая требуемое равенство

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r(z_0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r(z_0)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta \cdot (z - z_0)^k.$$

При этом почленное интегрирование ряда справа возможно в силу его равномерной сходимости, которая проверяется с помощью признака Вейерштрасса — при  $|\zeta - z_0| = r$  и  $k = 0, 1, \dots$  справедливы неравенства

$$\left| \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} (z - z_0)^k \right| \leq \frac{M}{r} \cdot \left(\frac{\rho}{r}\right)^k, \quad \text{где } M = \sup_{\zeta \in C_r(z_0)} |f(\zeta)|.$$

То, что в (4.7) можно брать любое  $r < d$ , вытекает из **следствия 4.1**. В частности, можно было считать, что  $\rho < r$ . □



## 4.1.5. Эквивалентные описания аналитичности

Следующее утверждение собирает многое из доказанного выше и дает нам возможность различными способами выражать свойство **аналитичности**.

**Теорема 4.5.** Пусть функция  $f$  задана в некоторой окрестности точки  $z_0 \in \mathbb{C}$ . Тогда следующие условия равносильны аналитичности  $f$  в точке  $z_0$ :

- 1)  $f$  **дифференцируема** в некоторой окрестности  $z_0$ ,
- 2)  $f$  есть сумма **степенного ряда** с центром в  $z_0$  с положительным **радиусом сходимости**,
- 3)  $f$  непрерывна в некоторой окрестности  $z_0$  и интеграл от нее по границе любого треугольника равен нулю.

**Доказательство.** То, что из 1) следует 2), вытекает из **теоремы Тейлора**. Обратное утверждение вытекает из **теоремы 4.3**.

По **теореме 3.3** из 1) следует 3). Впрочем, это следует и из **леммы Гурса**. Обратное получаем из **теоремы Мореры**.  $\square$



Меню

Часть I. Теория

Глава 4. Последовательности и ряды

4.2. Теоремы единственности



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 4.2. Теоремы единственности

4.2.1. Локальная форма единственности

4.2.2. Теорема единственности Вейерштрасса



### 4.2.1. Локальная форма единственности

Множество нулей **аналитической** функции имеет весьма специфическую структуру и не может быть «очень большим». Здесь нуль функции — это, конечно, точка из области ее определения, в которой она обращается в нуль.

**Лемма 4.3.** *Если функция  $f$  аналитична и отлична от тождественного нуля в некоторой окрестности точки  $z_0$ , то она отлична от нуля в некоторой проколотой окрестности точки  $z_0$ .*

**Доказательство.** Пусть  $f$  отлична от тождественного нуля в окрестности точки  $z_0$ . По **теореме 4.4** ее можно разложить в **степенной ряд**

$$f(z) = \sum_{k=n}^{\infty} c_k (z - z_0)^k,$$

сходящийся в окрестности  $z_0$ . Здесь  $n$  — наименьший номер, для которого  $c_n \neq 0$  (не все коэффициенты этого ряда равны нулю — иначе она была бы тождественно равна нулю в этой окрестности). Поэтому

$$f(z) = (z - z_0)^n \left[ c_n + \sum_{k=n+1}^{\infty} c_k (z - z_0)^{k-n} \right]$$

и при  $z \neq z_0$  достаточно близком к  $z_0$  выражение в квадратных скобках отлично от нуля, так как первое слагаемое в ней отлично от нуля, а предел второго при  $z \rightarrow z_0$  равен нулю.  $\square$



## 4.2.2. Теорема единственности Вейерштрасса

В частности, [лемма 4.3](#) показывает, что нули *аналитической* функции изолированы от других нулей и этот эффект в ней имеет локальный характер. Следующая теорема дает глобальное утверждение такого же сорта.

**Теорема 4.6 (Вейерштрасса о единственности).** *Если функция  $f$  аналитична в области  $D \subset \mathbb{C}$  и обращается в нуль на бесконечном множестве с предельной точкой в  $D$ , то  $f(z) \equiv 0$  в  $D$ .*

**Доказательство.** Пусть  $Z \subset D$  — совокупность всех внутренних точек множества нулей функции. Тогда, очевидно,  $Z$  открыто.

Покажем, что его дополнение  $D \setminus Z$  в  $D$  также является открытым. В самом деле, если предположить противное, то некоторая точка  $z_0 \in D \setminus Z$  не является внутренней для  $D \setminus Z$ . Тогда она является предельной для  $Z$  и силу [непрерывности](#)  $f$  также является ее нулем. Отсюда и из [леммы 4.3](#) следует, что наша функция тождественно равна нулю в некоторой окрестности  $z_0$  и должно быть  $z_0 \in Z$  в то время как  $z_0 \in D \setminus Z$ .

Итак,  $D = Z \cup (D \setminus Z)$  и оба множества справа открыты и не пересекаются. Отсюда следует, что  $D \setminus Z = \emptyset$  и  $D = Z$ , так как противное противоречит [связности](#) области  $D$ .  $\square$

**Следствие 4.2.** *Если две функции аналитичны в области  $D \subset \mathbb{C}$  и совпадают на бесконечном подмножестве из  $D$  с предельной точкой в  $D$ , то они совпадают в  $D$  тождественно.*

**Доказательство.** Применим [теорему 4.6](#) к разности этих функций.  $\square$



Меню

Часть I. Теория

Глава 4. Последовательности и ряды

4.3. Последовательности аналитических функций



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 4.3. Последовательности аналитических функций

4.3.1. Сходимость внутри области

4.3.2. Принцип счетной компактности

4.3.3. Теорема Витали

4.3.4. Теорема Вейерштрасса



### 4.3.1. Сходимость внутри области

Ниже нам будет удобно пользоваться следующей терминологией. Пусть имеется некоторое свойство, связанное с подмножествами из  $\mathbb{C}$ . Будем говорить, что это свойство выполнено внутри  $A$ , если оно справедливо для любого компактного подмножества  $K \subset A$ . Примерами могут служить ограниченность внутри  $A$ , равномерная сходимость внутри  $A$  и т.д.

Основное содержание многих утверждений в этом параграфе будет состоять в том, что свойства, присущие обычно **непрерывным** функциям (или последовательностям непрерывных функций) на **компактах**, для **аналитических** функций выполняются внутри **областей**.





### 4.3.2. Принцип счетной компактности

Для множеств в евклидовых пространствах справедлив принцип Больцано – Вейерштрасса: каждое бесконечное ограниченное множество содержит сходящуюся подпоследовательность. Положение меняется, когда мы переходим к последовательностям функций — чтобы выделить, к примеру, равномерно сходящуюся подпоследовательность, нужно требовать гораздо больше (см., например, [теорему Арцела – Асколи](#)).

На первый взгляд, удивительным выглядит то, что для [аналитических](#) функций ситуация больше похожа на случай конечномерных пространств. Это показывает следующая теорема, известная под названием «[принцип счетной компактности](#)».

**Теорема 4.7 (Монтеля).** *Если последовательность аналитических функций ограничена внутри области  $D \subset \mathbb{C}$ , то из нее можно выделить подпоследовательность, сходящуюся равномерно внутри  $D$ .*

**Доказательство.** Шаг 1. Пусть  $K \subset D$  — фиксированное [замкнутое ограниченное \(компактное\)](#) множество. Покажем, что последовательность  $\{f_n\}$  равномерно непрерывна на  $K$ . Это означает, что для любого  $\varepsilon > 0$  существует такое  $\delta > 0$ , что для всех  $n \in \mathbb{N}$  и всех  $z_1, z_2 \in K$  со свойством  $|z_1 - z_2| < \delta$  выполнено неравенство  $|f_n(z_1) - f_n(z_2)| < \varepsilon$ .

Введем обозначение

$$\alpha = \frac{1}{4} \text{dist}(K, \partial D) > 0$$

(положительность  $\alpha$  легко вытекает из компактности множеств  $K$  и  $\partial D$ ) и рассмотрим множество

$$K_\alpha = \{z \in D : \text{dist}(z, K) \leq 2\alpha\}.$$

Оно замкнуто и ограничено, поэтому в силу основного условия теоремы

$$\sup_n \sup_{z \in K_\alpha} |f_n(z)| = M < \infty.$$

Пусть  $0 < \varepsilon < \alpha$ . Возьмем точки  $z_1, z_2 \in K$  так, чтобы  $|z_1 - z_2| < \varepsilon$  и применим [формулу Коши](#) к кругу  $B(z_1, 2\alpha)$

$$f_n(z_j) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_\delta(z_1)} \frac{f_n(\zeta)}{\zeta - z_j} d\zeta, \quad j = 1, 2$$



$(C_\alpha(z_1) = \{\zeta : |\zeta - z_j| = 2\alpha\})$  — граница круга  $B(z_1, 2\alpha)$ . Отсюда

$$\begin{aligned} |f_n(z_1) - f_n(z_2)| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_\alpha(z_1)} f_n(\zeta) \frac{z_1 - z_2}{(\zeta - z_1)(\zeta - z_2)} d\zeta \right| \leq \\ &\leq 2\alpha \max_{\zeta \in C_\alpha(z_1)} \left| f_n(\zeta) \frac{z_1 - z_2}{(\zeta - z_1)(\zeta - z_2)} \right| \leq 2\alpha M \frac{|z_1 - z_2|}{2\alpha \cdot \alpha} = \frac{M}{\alpha} |z_1 - z_2|. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что если взять  $\delta = \min\{\varepsilon, \alpha\varepsilon/M\} > 0$ , то для любых  $z_1, z_2 \in K$  со свойством  $|z_1 - z_2| < \delta$  выполнено неравенство

$$|f_n(z_1) - f_n(z_2)| < \varepsilon.$$

Свойство равномерной непрерывности доказано.

Итак, выполнены все условия **теоремы Арцела–Асколи** (равнотепенная непрерывность плюс равномерная ограниченность равносильны счетной компактности), из которой следует, что  $\{f_n\}$  содержит подпоследовательность, равномерно сходящуюся на  $K$ .

Шаг 2. Для того, чтобы доказать, что из  $\{f_n\}$  можно выделить подпоследовательность, сходящаяся равномерно внутри  $D$ , применим диагональный процесс Кантора.

Для  $m \in \mathbb{N}$  определим множество

$$K_m = \left\{ z \in D : \text{dist}(z, \partial D) \geq \frac{1}{m} \right\} \cap \bar{B}(0, m).$$

Для достаточно больших  $m$  эти множества непусты и, кроме того, они ограничены и замкнуты (последнее следует из того, что функция  $z \mapsto \text{dist}(z, \partial D)$  непрерывна). Отметим также, что

$$K_m \subset K_{m+1}, \quad D = \bigcup_{m=1}^{\infty} K_m.$$

По доказанному существует такая подпоследовательность индексов  $\{n_k^1\}$ , что  $\{f_{n_k^1}\}$  сходится равномерно на  $K_1$ . Из  $\{n_k^1\}$  можно выделить такую подпоследовательность  $\{n_k^2\}$ , что  $\{f_{n_k^2}\}$  сходится равномерно



Меню

Часть I. Теория

Глава 4. Последовательности и ряды

4.3. Последовательности аналитических функций

4.3.2. Принцип счетной компактности



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

на  $K_2$ . Продолжая процесс по индукции, на  $j$ -м шаге из последовательности  $\{n_k^{j-1}\}$  выделим подпоследовательность  $\{n_k^j\}$  так, чтобы последовательность  $\{f_{n_k^j}\}$  сходилась равномерно на  $K_j$  и так далее. Обозначим  $n_k = n_k^k$ , тогда ясно что подпоследовательность  $\{f_{n_k}\}$  сходится равномерно на каждом из множеств  $K_m$ .

Выбранная подпоследовательность  $\{f_{n_k}\}$  сходится равномерно внутри  $D$ , так как  $\text{dist}(K, \partial D) > 0$  для любого замкнутого ограниченного множества  $K \subset D$  (см. шаг 1) и  $K \subset K_m$  для  $m > (\text{dist}(K, \partial D))^{-1}$ .  $\square$



### 4.3.3. Теорема Витали

**Теорема 4.8 (Витали).** Если последовательность  $\{f_n\} \subset H(D)$  ограничена внутри  $D$ , и сходится на бесконечном множестве точек с *предельной точкой* в  $D$ , то она равномерно сходится внутри  $D$ .

**Доказательство.** Пусть в некоторой точке  $z_0 \in D$  последовательность расходится. Тогда выделим две подпоследовательности сходящиеся к разным пределам в  $z_0$ . Из этих последовательностей по **теореме Монделя** выделим подпоследовательности, сходящиеся равномерно внутри  $D$  к двум аналитическим функциям, совпадающим на множестве с предельной точкой в  $D$ . По **следствию 4.2** эти функции должны быть тождественны. Противоречие показывает, что  $\{f_n\}$  сходится всюду в  $D$ . А равномерность сходимости внутри  $D$  вытекает из **теоремы Монделя**.  $\square$



### 4.3.4. Теорема Вейерштрасса

Следующая теорема показывает, в частности, что предел последовательности **аналитических** функций, сходящейся равномерно внутри **области**, также является аналитической функцией. Это, в свою очередь, говорит нам о том, что понятие равномерной сходимости внутри области является естественным для класса функций, аналитических в этой области, так как не выводит из этого класса.

**Теорема 4.9 (Вейерштрасса).** Пусть последовательность аналитических функций  $\{f_n\}$  сходится равномерно внутри области  $D$  к функции  $f$ . Тогда

- 1) функция  $f$  аналитична в  $D$ ,
- 2) для любого  $k \in \mathbb{N}$  последовательность  $k$ -х **производных**  $\{f_n^{(k)}\}$  сходится к производной предельной функции  $f^{(k)}$  равномерно внутри  $D$ .

Доказательство. 1) Пусть  $z_0 \in D$  и  $\bar{B}(z_0, r) \subset D$ , тогда по **формуле Коши**

$$f_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-z|=r} \frac{f_n(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta.$$

Переходя здесь к пределу при  $n \rightarrow \infty$ , получаем

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-z|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta.$$

Предельный переход под знаком интеграла справа возможен в силу равномерной сходимости  $f_n$  на окружности  $\{\zeta : |\zeta - z| = r\}$ . Из полученного равенства и **теоремы 3.13** следует, что  $f$  аналитична в в любом круге  $B(z_0, r)$ , содержащемся в  $D$ . Следовательно, функция  $f$  аналитична во всей области  $D$ .



2) Пусть  $z_0 \in D$  и  $\bar{B}(z_0, 2r) \subset D$ . Применим равенство (3.15) из теоремы 3.14 к разности  $f^{(k)} - f_n^{(k)}$ , окружности  $\{\zeta : |\zeta - z| = r\}$  и  $z \in \bar{B}(z_0, r) \subset D$

$$\begin{aligned} |f^{(k)}(z) - f_n^{(k)}(z)| &= \left| \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z_0|=2r} \frac{f(\zeta) - f_n(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta \right| \leq \\ &\leq \frac{k!}{2\pi} \cdot \frac{4\pi r}{r^{k+1}} \sup_{\zeta: |\zeta - z_0|=2r} |f(\zeta) - f_n(\zeta)| = \frac{2k!}{r^k} \sup_{\zeta: |\zeta - z_0|=2r} |f(\zeta) - f_n(\zeta)| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

при  $n \rightarrow \infty$  в силу равномерной сходимости последовательности  $f_n$  на компакте  $\{\zeta : |\zeta - z_0| = 2r\}$ .

Таким образом, последовательность производных  $f_n^{(k)}$  сходится равномерно к  $f^{(k)}$  в любом замкнутом круге  $\bar{B}(z_0, r)$ , для которого  $\bar{B}(z_0, 2r) \subset D$ . Но любой компакт в  $D$  можно покрыть конечным числом таких кругов. Следовательно,  $f_n^{(k)}$  сходится к  $f^{(k)}$  равномерно внутри  $D$ .  $\square$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 5

# Ряды Лорана

5.1. Разложение в ряд Лорана

5.2. Классификация изолированных особых точек



Меню

Часть I. Теория

Глава 5. Ряды Лорана

5.1. Разложение в ряд Лорана



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 5.1. Разложение в ряд Лорана

5.1.1. Ряд Лорана

5.1.2. Формулы для коэффициентов разложения

5.1.3. Неравенства Коши





### 5.1.1. Ряд Лорана

Рассмотрим ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k (z - z_0)^{-k}$$

по отрицательным степеням разностей  $z - z_0$ . С помощью замены  $z - z_0 = \frac{1}{\xi}$  легко видеть, что это ряд сходится в **области**

$$|z - z_0| > \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = R$$

и по **теореме Вейерштрасса о рядах** его сумма **аналитична** в этой области.

Мы будем рассматривать ряды по всем целым степеням разностей  $z - z_0$ .

**Определение 5.1.** *Рядом Лорана* будем называть ряд вида

$$f(z) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k (z - z_0)^k = \sum_{k=-\infty}^{-1} c_k (z - z_0)^k + \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k. \quad (5.1)$$

Часть **ряда Лорана (5.1)** с отрицательными индексами называется его **главной частью**, а часть с неотрицательными индексами — **правильной** или аналитической.

Сумму **ряда Лорана (5.1)** будем понимать как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^{-1} c_k (z - z_0)^k + \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^m c_k (z - z_0)^k$$

(конечно, если эти пределы существуют).

Из рассуждения перед определением ряда Лорана и из **теоремы Коши – Адамара** получаем, что область сходимости ряда Лорана является кольцо

$$K(z_0, r, R) \equiv \{z \in \mathbb{C} : r < |z - z_0| < R\},$$



Меню

Часть I. Теория

Глава 5. Ряды Лорана

5.1. Разложение в ряд Лорана

5.1.1. Ряд Лорана



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

радиусы которого определяются равенствами

$$r = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_{-n}|}; \quad \frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}.$$

Конечно, если  $r \geq R$ , то это кольцо пусто.

Ряды Лорана естественно рассматривать по следующей причине. Если функция аналитична в некотором круге, то она разлагается в **степенной ряд** (см. **теорему Тейлора**) в этом круге. Если же в круге есть точки неаналитичности, то такое разложение уже невозможно. Выбрав кольцо  $K(z_0, r, R)$ , в котором наша функция аналитична, можно попытаться разложить ее в ряд Лорана.



## 5.1.2. Формулы для коэффициентов разложения

Следующая теорема показывает, что **аналитическая** в кольце функция может быть разложена в ряд Лорана, а также позволяет вычислить коэффициенты этого ряда.

**Теорема 5.1 (Лорана).** Пусть  $0 \leq r < R$  и  $z_0 \in \mathbb{C}$ . Если функция  $f$  аналитична в кольце  $K(z_0, r, R)$ ,  $0 \leq r < R$ , то она является суммой сходящегося **ряда Лорана (5.1)**, причем

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_\rho(z_0)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta, \quad r < \rho < R. \quad (5.2)$$




Рис. 5.1

**Доказательство.** Пусть  $z \in K(z_0, r, R)$ , выберем числа  $r'$  и  $R'$  так, чтобы

$$r < r' < |z - z_0| < R' < R,$$

а  $\delta > 0$  возьмем настолько малым, чтобы  $\overline{B}(z, \delta) \subset K(z_0, r', R')$ .



Теперь к функции  $\zeta \rightarrow f(\zeta)(\zeta - z)^{-1}$  применим **интегральную формулу Коши** в области (заштрихованная область на рис. 5.1)

$$D = K(z_0, r', R') \setminus \bar{B}(z, \delta),$$

получая равенство

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_\delta(z)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R'}(z_0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{r'}(z_0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (5.3)$$

Далее заметим, что

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}.$$

А так как  $\left| \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right| < 1$ , то ряд сходится равномерно по  $\zeta$  на  $C_{R'}(z_0)$ . Поэтому первый интеграл в (5.3) разлагается в ряд

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{R'}(z)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{2\pi i} \oint_{C_{R'}(z)} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}}.$$

Аналогично

$$\frac{-1}{\zeta - z} = \frac{1}{z - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\zeta - z_0}{z - z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^n}{(z - z_0)^{n+1}}$$

А так как  $\left| \frac{\zeta - z_0}{z - z_0} \right| < 1$ , то ряд сходится равномерно по  $\zeta$  на  $C_{r'}(z_0)$ . Поэтому второй интеграл в (5.3) разлагается в ряд

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{r'}(z)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}} \cdot \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_{r'}(z)} f(\zeta)(\zeta - z_0)^n d\zeta.$$

Для доказательства того, что формулы коэффициентов не зависят от  $\rho$ , воспользуемся **обобщенной теоремой Коши**, применяя ее к двусвязной области  $K(z_0, \rho, \rho')$  и функции  $\zeta \mapsto \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}}$ , где  $r < \rho < \rho' < R$ .

□



**Определение 5.2.** Ряд Лорана (5.1), коэффициенты которого вычисляются по формулам (5.2), будем называть *рядом Лорана функции*  $f$  в кольце  $K(z_0, r, R)$ .

Справедливо следующее утверждение, которое является в некотором смысле обратным к **теореме Лорана**.

**Теорема 5.2.** Пусть  $0 \leq r < R$  и  $z_0 \in \mathbb{C}$ . Если ряд (5.1) сходится равномерно внутри кольца  $K(z_0, r, R)$ ,  $0 \leq r < R$ , то он является рядом Лорана своей суммы.

**Доказательство.** Эта теорема является следствием **теоремы Вейерштрасса**. Действительно, все слагаемые ряда Лорана аналитичны и ряд сходится равномерно внутри кольца  $K(z_0, r, R)$ , поэтому его сумма аналитична в этом кольце.

Для вычисления коэффициентов ряда (5.1) обозначим  $f$  его сумму, умножим его на  $\frac{1}{2\pi i}(z - z_0)^{-n-1}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , и проинтегрируем почленно по окружности  $|z - z_0| = \rho \in (r, R)$ , получая

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C_\rho(z_0)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{C_\rho(z_0)} (z - z_0)^{k-n-1} dz = c_n.$$

Последнее равенство вытекает из того, что интеграл

$$\int_{C_\rho(z_0)} (z - z_0)^{k-n-1} dz$$

равен  $2\pi i$  при  $k = n$  и нулю при  $k \neq n$  (см. **лемму 3.2**). □



### 5.1.3. Неравенства Коши

Из [формул \(5.2\)](#) нетрудно получить следующие оценки для коэффициентов ряда Лорана функции  $f$

$$|c_k| \leq M_\rho \rho^{-k}, \quad k \in \mathbb{N}, \quad M_\rho = \max_{z \in C_\rho(z_0)} |f(z)|, \quad (5.4)$$

которые называют обычно [неравенствами Коши](#).

Действительно, в силу [\(5.2\)](#) и [теоремы 3.1](#) получаем

$$|c_k| = \left| \oint_{C_\rho(z_0)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{C_\rho(z_0)} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z_0|^{k+1}} dl \leq \frac{M_\rho}{\rho^{k+1}} \cdot 2\pi\rho.$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 5.2. Классификация изолированных особых точек

- 5.2.1. Правильные точки функции
- 5.2.2. Полюсы
- 5.2.3. Существенно особые точки
- 5.2.4. Случай бесконечно удаленной точки
- 5.2.5. Теорема Сохоцкого
- 5.2.6. Целые и мероморфные функции



## 5.2.1. Правильные точки функции

Пусть функция  $f$  аналитична в проколоте круге  $B^\circ(z_0, r)$  при некотором  $r > 0$ . Тогда либо найдется такое число  $c_0 \in \mathbb{C}$ , что переопределение нашей функции в точке  $z_0$  равенством  $f(z_0) = c_0$  делает ее аналитичной также и в точке  $z_0$ , либо такого числа нет.

**Определение 5.3.** В первом случае  $z_0$  называют *правильной точкой* для  $f$  (часто используется также термин «*устраняемая особая точка*»). Во втором случае, говорят, что  $z_0$  — *изолированная особая точка*  $f$ .

Простой способ проверки того, что точка является правильной для функции, дает следующее утверждение.

**Теорема 5.3.** Пусть функция  $f$  аналитична в проколоте круге  $B^\circ(z_0, r)$ ,  $r > 0$ . Тогда  $z_0$  является для нее правильной точкой тогда и только тогда, когда  $f$  ограничена в некоторой проколоте окрестности  $z_0$ .

**Доказательство.** Ограниченность функции в окрестности правильной точки очевидна.

Для доказательства обратного утверждения разложим нашу функцию в ряд Лорана по **теореме 5.1** и воспользуемся **неравенствами (5.4)** для коэффициентов Лорана: если  $|f(z)| \leq M$  в  $B^\circ(z_0, r)$ , то для любого  $0 < \rho < r$  выполнены неравенства  $|c_k| \leq M\rho^{-k}$ . При  $\rho \rightarrow +0$  получаем отсюда, что  $c_k = 0$  при всех  $k < 0$ . Т.е.

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k \quad (5.5)$$

и доопределение  $f(z_0) = c_0$  делает функцию  $f$  аналитической в  $B(z_0, r)$ . □

**Следствие 5.1.** Точка  $z_0$  является правильной точкой для функции  $f$  в том и только в том случае, когда ее разложение в ряд Лорана имеет вид (5.5), т.е. является ее рядом Тейлора.

Это вытекает из доказательства **теоремы 5.3**.

Понятие правильной точки функции не очень содержательно и не представляет интереса для теории.

Мы изучим более подробно изолированные особые точки. Основным и естественным средством при этом будут служить разложения в ряды Лорана.





## 5.2.2. Полюсы

Пусть функция  $f$  аналитична в проколотом круге  $B^\circ(z_0, r)$ ,  $r > 0$ . Тогда из теоремы 5.3 вытекает, что  $z_0$  является **изолированной особой точкой** для  $f$  в том и только том случае, когда

$$\overline{\lim}_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty.$$

**Определение 5.4.** Изолированная особая точка  $z_0$  функции  $f$  называется ее **полюсом**, если

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty. \quad (5.6)$$

Самый простой пример полюса — точка  $z_0$  для функции  $f(z) = (z - z_0)^{-n}$ , где  $n \in \mathbb{N}$ . По существу, этот пример показывает, как устроена функция в окрестности любого полюса, так как следующая теорема утверждает, что эта ситуация вполне типична.

**Теорема 5.4.** *Изолированная особая точка  $z_0 \in \mathbb{C}$  функции  $f$  является ее полюсом тогда и только тогда, когда существует такое  $n \in \mathbb{N}$ , что разложение  $f$  в ряд Лорана имеет вид*

$$f(z) = \sum_{k=-1}^{-n} c_k (z - z_0)^k + \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k, \quad \text{где } c_{-n} \neq 0. \quad (5.7)$$

**Доказательство.** Рассмотрим вспомогательную функцию  $g = 1/f$ , заданную в такой проколотой окрестности  $B^\circ(z_0, r)$  точки  $z_0$ , в которой  $f(z) \neq 0$  (ее существование обеспечивается **условием (5.6)**). Эта функция  $g$  аналитична в  $B^\circ(z_0, r)$  и  $z_0$  является ее **правильной точкой** (что также обеспечивается **условием (5.6)**), причем  $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = 0$ . В силу **следствия 5.1** ее лорановское разложение имеет вид

$$g(z) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z - z_0)^k = (z - z_0)^n \sum_{k=0}^{\infty} a_{n+k} (z - z_0)^k$$

при некотором  $n \in \mathbb{N}$  и  $a_n \neq 0$ .



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Так как  $a_n \neq 0$ , то функция  $h$ , определенная равенством

$$\frac{1}{h(z)} = \sum_{k=0}^{\infty} a_{n+k}(z - z_0)^k,$$

аналитична в некоторой окрестности точки  $z_0$ . Разлагая  $h$  в ряд Тейлора, видим, что ряд Лорана функции  $f(z) = (z - z_0)^{-n}h(z)$  имеет вид (5.7).

Обратно, разложение Лорана вида (5.7) дает нам

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^n f(z) = c_{-n} \neq 0,$$

поэтому (5.6) выполнено. □

**Теорема 5.4** делает естественной следующую классификацию полюсов.

**Определение 5.5.** Будем говорить, что изолированная особая точка  $z_0 \in \mathbb{C}$  функции  $f$  является ее *полюсом порядка (кратности)  $n \in \mathbb{N}$* , если разложение Лорана для  $f$  имеет вид (5.7).

Полюс кратности  $n = 1$  называется *простым*.

Пусть функция  $f$  аналитична в некоторой окрестности точки  $z_0 \in \mathbb{C}$  и  $n \in \mathbb{N}$ . Условимся называть точку  $z_0$  *нулем порядка (кратности)  $n$*  функции  $f$ , если

$$f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(n-1)}(z_0) = 0, \quad f^{(n)}(z_0) \neq 0.$$

Другими словами, это означает, что разложение функции  $f$  в ряд Тейлора в точке  $z_0$  имеет вид

$$f(z) = \sum_{k=n}^{\infty} c_k (z - z_0)^k, \quad \text{где } c_n \neq 0.$$

Еще одна эквивалентная форма: в некоторой окрестности нуля кратности  $n$  функция  $f$  представима в виде  $f(z) = (z - z_0)^n g(z)$ , где  $g$  аналитична в этой окрестности и  $g(z_0) \neq 0$ .

**Теорема 5.5.** Точка  $z_0 \in \mathbb{C}$  — полюс порядка  $n$  для функции  $f$  тогда и только тогда, когда  $z_0$  — нуль порядка  $n$  для функции  $1/f$ .



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Доказательство. Пусть  $z_0$  — полюс порядка  $n$  для  $f$ . Тогда функция  $g(z) = (z - z_0)^n f(z)$ , аналитична и отлична от нуля в некоторой окрестности  $z_0$ , так как  $g(z_0) = c_{-n} \neq 0$ . Поэтому функция  $1/g$  аналитична в этой окрестности и разлагается в ряд Тейлора

$$\frac{1}{g(z)} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{f(z)} = (z - z_0)^n \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

и  $z_0$  — нуль порядка  $n$  для  $1/f$ . Каждый шаг в этом рассуждении обратим, поэтому обратное утверждение также верно.  $\square$



### 5.2.3. Существенно особые точки

Пусть функция  $f$  **аналитична** в проколоте круге  $B^\circ(z_0, r)$  при некотором  $r > 0$  и  $z_0$  не является ни **правильной точкой**, ни **полюсом**. Такие изолированные особенности называются существенно особыми точками для  $f$ .

**Определение 5.6.** **Изолированная особая точка**  $z_0$  функции  $f$  называется **существенно особой точкой** для  $f$ , если в этой точке она не имеет ни конечного, ни бесконечного предела.

Как и в случае полюса (см. **теорему 5.4**) судить о том, является ли изолированная особенность существенно особой точкой, можно по ряду Лорана.

**Теорема 5.6.** *Изолированная особая точка функции  $f$  является существенно особой тогда и только тогда, главная часть ряда Лорана в этой точке содержит бесконечно много ненулевых слагаемых.*

**Доказательство.** Правильная точка, полюс и существенно особая точка являются взаимоиключающими случаями изолированной особенности. Для завершения доказательства остается применить **следствие 5.1** и **теорему 5.4**. □

Таким образом, вид неаналитической части ряда Лорана полностью распознает тип изолированной особенности в точке  $z_0$ :

- если она отсутствует, то  $z_0$  — правильная точка,
- если в ней лишь конечное число ненулевых слагаемых, то  $z_0$  — полюс соответствующего порядка,
- если ненулевых слагаемых бесконечно много, то  $z_0$  — существенная особенность.

Следующее утверждение аналогично **теореме 5.5** и дает способ проверки на существенную особенность для  $f$  с помощью функции  $1/f$ .

**Теорема 5.7.** *Пусть функция  $f$  аналитична и отлична от нуля в некоторой проколоте окрестности точки  $z_0$ .*

*Тогда если  $z_0$  является существенно особой точкой для  $f$ , то  $z_0$  — существенно особая точка для  $1/f$ .*



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

**Доказательство.** Функция  $g = 1/f$  аналитична в той же проколотой окрестности точки  $z_0$ , которая является для нее изолированной особенностью.

Если предположить, что  $z_0$  — полюс для  $g$ , то по **теореме 5.5**  $z_0$  является нулем для  $f$ . Поэтому  $f$  аналитична в точке  $z_0$ , что невозможно по условию.

Следовательно,  $z_0$  является либо правильной, либо существенно особой для для  $g$ . Если  $z_0$  — правильная точка для  $g$ , то либо  $g(z_0) = 0$  и  $f$  имеет в  $z_0$  полюс (по **теореме 5.5**), либо  $g(z_0) \neq 0$  и  $g(z) \neq 0$  в некоторой окрестности  $z_0$ , тогда функция  $1/g = f$  аналитична в точке  $z_0$ . Это опять невозможно. Остается единственное:  $z_0$  — существенно особая точка для  $g$ .  $\square$



## 5.2.4. Случай бесконечно удаленной точки

Понятие изолированной особой точки можно распространить и на случай  $z_0 = \infty$  следующим образом.

Пусть функция **аналитична** в некоторой окрестности бесконечно удаленной точки, т.е. в области вида  $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$  с достаточно большим  $R$ .

**Определение 5.7.** Будем говорить, что бесконечно удаленная точка является правильной, полюсом порядка  $n$  или существенно собой точкой для функции  $f$ , если 0 является таковой для функции  $g : z \mapsto f(1/z)$ .

Разложим функцию  $g : z \mapsto f(1/z)$  в ряд Лорана в точке 0,

$$g(\zeta) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \zeta^k + \sum_{k=1}^{\infty} a_{-k} \zeta^{-k}.$$

По количеству ненулевых слагаемых в неаналитической части этого разложения мы можем проверить тип особенности точки  $\zeta = 0$  для функции  $g$ .

Выполняя в этом разложении замену  $\zeta = 1/z$  и учитывая связь между  $f$  и  $g$ , мы получим разложение

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{-k} + \sum_{k=1}^{\infty} a_{-k} z^k$$

для  $f$  в окрестности бесконечно удаленной точки. Для того, чтобы иметь унифицированную запись разложения в ряд Лорана в точках  $z_0 \in \mathbb{C}$  (см. (5.1)) и  $z_0 = \infty$  заменим в последнем ряде  $a_k$  на  $c_{-k}$ , приходя к ряду

$$f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k z^k + \sum_{k=-\infty}^0 c_k z^k. \quad (5.8)$$

Это разложение мы будем называть **рядом Лорана функции  $f$  на бесконечности**. Однако теперь главной частью этого разложения является первая сумма, а аналитической — вторая.

С помощью **ряда (5.8)** него мы будем судить о типе особенности функции  $f$  в бесконечно удаленной точке по числу ненулевых коэффициентов с положительными индексами в **разложении (5.8)**:



Меню

Часть I. Теория

Глава 5. Ряды Лорана

5.2. Классификация изолированных особых точек

5.2.4. Случай бесконечно удаленной точки



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

- если все они отсутствуют, то  $\infty$  — правильная точка для  $f$ ,
- если их конечное число, то  $\infty$  — полюс соответствующего порядка,
- если их бесконечно много, то  $\infty$  является существенной особенностью функции  $f$ .



## 5.2.5. Теорема Сохоцкого

Асимптотическое поведение вблизи **правильной точки** функции и вблизи **полюса** уже выяснено. Имен-  
но,

— если  $z_0$  — правильная точка для  $f$ , то существует предел  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ ,

— если  $z_0$  — полюс для  $f$ , то  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$ ,

— если  $z_0$  — **полюс порядка  $n$**  для  $f$ , то существует предел  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z - z_0)^n$ .

В окрестности **существенной особой точки** поведение функции значительно сложнее, что показывает следующее утверждение.

**Теорема 5.8 (Сохоцкого).** *Если точка  $z_0$  — существенно особая для  $f$ , то для любого  $w \in \widehat{\mathbb{C}}$  найдется последовательность  $z_k \rightarrow z_0$  такая, что  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_k) = w$ .*

**Доказательство.** Если  $w = \infty$ , то все доказано, так как  $f$  неограничена в любой окрестности  $z_0$  (см. начало **пункта 5.2.2**).

Пусть  $w \in \mathbb{C}$ . Если  $z_0$  — **предельная точка** множества нулей функции  $f(z) - w$ , то все доказано. Если же нет, то  $f(z) - w \neq 0$  в некоторой окрестности  $z_0$  и по **теореме 5.7** для функции  $z \mapsto (f(z) - w)^{-1}$  точка  $z_0$  также является существенно особой. По доказанному найдется последовательность  $z_k \rightarrow z_0$ , для которой  $(f(z_k) - w)^{-1} \rightarrow \infty$ , т.е.  $f(z_k) \rightarrow w$ .  $\square$

На самом деле справедливо следующее более глубокое утверждение, которое мы приводим здесь без доказательства.

**Теорема 5.9 (Пикара).** *Если  $z_0$  — существенно особая точка функции  $f$ , то в любой окрестности точки  $z_0$   $f$  принимает каждое значение  $w \in \mathbb{C}$ , кроме, быть может, одного, бесконечно много раз.*

Значение  $w$ , которое в теореме Пикара функция не принимает, называют обычно исключительным. Рассмотрим в связи с этим две функции

$$\exp \frac{1}{z}, \quad \sin \frac{1}{z}$$





Меню

Часть I. Теория

Глава 5. Ряды Лорана

5.2. Классификация изолированных особых точек

5.2.5. Теорема Сохоцкого



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

и точку  $z_0 = 0$ , которая является существенно особой для каждой из них. Для первой функции исключительное значение  $w_0 = 0$ , а для второй исключительного значения нет.



## 5.2.6. Целые и мероморфные функции

**Аналитическая** функция, не имеющая особых точек в расширенной плоскости  $\widehat{\mathbb{C}}$ , является тождественно постоянной. Действительно, ее разложение в ряд Тейлора имеет вид

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k \quad (5.9)$$

и сходится при всех  $z \in \mathbb{C}$ . Этот же ряд является разложением Лорана  $f$  в бесконечно удаленной точке. Поскольку  $\infty$  не является **особой**, то (см. пункт 5.2.4)  $c_k = 0$  при всех  $k \in \mathbb{N}$ .

Функция, аналитическая всюду в  $\mathbb{C}$  называется **целой**. Такие функции имеют единственную особенность — бесконечно удаленную точку.

Если  $n \in \mathbb{N}$  и в **разложении (5.9)** все коэффициенты  $c_k$  с номерами  $k > n$  равны нулю, а  $c_n \neq 0$ , то  $\infty$  является **полюсом порядка  $n$** . Такая функция является многочленом.

Если же в (5.9) бесконечно много коэффициентов  $c_k$  отличны от нуля, то  $\infty$  является **существенно особой** для  $f$ . Такие функции называются **целыми трансцендентными**. Примерами могут служить  $\exp z$ ,  $\sin z$ ,  $\cos z$ .

Функция называется **мероморфной** в области  $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ , если она не имеет в этой области других особых точек, кроме полюсов. Простейший пример мероморфной функции — это  $(z - z_0)^{-n}$ , у которой точка  $z_0 \in \mathbb{C}$  является полюсом порядка  $n$ .

**Теорема 5.10.** *Любая функция, мероморфная в расширенной плоскости  $\widehat{\mathbb{C}}$ , является рациональной, т.е. имеет вид*

$$f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)},$$

где  $P$  и  $Q$  — многочлены.

**Доказательство.** Наша функция имеет лишь конечное число полюсов, так как каждый из них является изолированным. Пусть  $z_k$  — конечный полюс порядка  $n_k$ ,  $k = 1, 2, \dots, p$ , для  $f$ . Возможно еще  $\infty$



Меню

Часть I. Теория

Глава 5. Ряды Лорана

5.2. Классификация изолированных особых точек

5.2.6. Целые и мероморфные функции



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

является полюсом порядка  $n$ . Вычтем из  $f$  главные части рядов Лорана, соответствующих этим особенностям,

$$f(z) - \sum_{k=1}^p \sum_{m=1}^{n_k} \frac{c_{mk}}{(z - z_k)^m} - \sum_{m=1}^n c_m z^m.$$

Для полученной разности все точки  $z_k$ ,  $k = 1, 2, \dots, p$ , и  $\infty$  являются устранимыми особенностями. Других особенностей она не имеет. По **теореме Лиувилля** эта разность есть тождественная постоянная.  $\square$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 6

# Теория вычетов

- 6.1. Вычеты и основная теорема о вычетах
- 6.2. Теорема о логарифмическом вычете и ее приложения



Меню

Часть I. Теория

Глава 6. Теория вычетов

6.1. Вычеты и основная теорема о вычетах



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 6.1. Вычеты и основная теорема о вычетах

6.1.1. Вычеты

6.1.2. Формулы для вычисления вычетов

6.1.3. Теорема Коши о вычетах

6.1.4. Вычет в бесконечно удаленной точке

6.1.5. Теорема о полной сумме вычетов



### 6.1.1. Вычеты

Пусть функция  $f$  **аналитична** в некоторой проколотой окрестности  $B^\circ(z_0, \varepsilon)$  **изолированной особой точки**  $z_0 \in \mathbb{C}$ .

**Определение 6.1.** *Вычетом функции  $f$*  в изолированной особой точке  $z_0 \in \mathbb{C}$  называется число

$$\operatorname{Res}_{z_0} f = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r(z_0)} f(z) dz, \quad 0 < r < \varepsilon. \quad (6.1)$$

Используя **теорему 3.4**, нетрудно показать, что значение интеграла в (6.1) не зависит от  $r \in (0, \varepsilon)$ .

Действительно, если  $0 < r' < r < \varepsilon$ , то, применяя к двусвязной области  $B(z_0, r) \setminus \overline{B}(z_0, r')$  **теорему 3.4**, получаем равенство

$$\oint_{(C_r(z_0))^+} f(z) dz + \oint_{(C_{r'}(z_0))^-} f(z) dz = 0.$$

или

$$\oint_{(C_r(z_0))^+} f(z) dz = \oint_{(C_{r'}(z_0))^+} f(z) dz.$$

В частности, это рассуждение показывает, что для вычисления вычета в (6.1) можно брать достаточно малое  $r > 0$ .



## 6.1.2. Формулы для вычисления вычетов

Поскольку представлением **аналитической** функции в **изолированной особой точке** является ряд Лорана, то естественно использовать этот ряд для вычисления **вычета**. **Равенство (5.2)** в **теореме Лорана** при  $k = 0$  показывает, это действительно возможно.

**Теорема 6.1.** Если  $z_0 \in \mathbb{C}$  — **изолированная особая точка** функции  $f$ , то вычет  $\operatorname{Res}_{z_0} f$  равен коэффициенту  $c_{-1}$  при  $(z - z_0)^{-1}$  в разложении Лорана для  $f$  в этой точке.

Рассмотрим несколько примеров на вычисление вычетов.

**Пример 6.1.** Рассмотрим функцию

$$\exp\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!z^k}, \quad z \neq 0.$$

Это разложение сходится в проколотой плоскости  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$  и потому является ее рядом Лорана для точки  $z_0 = 0$ . В силу **теоремы 6.1**  $\operatorname{Res}_0 \exp(1/z) = 1$ .

**Пример 6.2.** Если особая точка  $z_0 \in \mathbb{C}$  является **правильной**, то вычет в этой точке равен нулю, так как в этом случае по **следствию 5.1** ряд Лорана вырождается в ряд Тейлора — все коэффициенты Лорана с отрицательными индексами равны нулю.

В связи с последним примером отметим, что из того, что вычет в особой точке равен нулю, не следует, что эта особенность является устранимой. Другие лорановские коэффициенты с отрицательными индексами могут быть неравными нулю. Пример  $f(z) = z^{-2}$  показывает это.

**Пример 6.3.** Если  $z_0$  — **простой полюс** для  $f$  (кратности 1), то

$$\operatorname{Res}_{z_0} f = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z - z_0).$$



В самом деле, ряд Лорана в таком случае имеет вид

$$f(z) = \sum_{k=-1}^{\infty} c_k (z - z_0)^k \quad \text{или} \quad f(z)(z - z_0) = \sum_{k=-1}^{\infty} c_k (z - z_0)^{k+1}.$$

Переходя в этом равенстве к пределу при  $z \rightarrow z_0$  получим требуемое.

Следующая теорема дает способ вычисления вычета в **полюсе любого порядка** и обобщает результат последнего примера.

**Теорема 6.2.** Если  $z_0 \in \mathbb{C}$  — полюс кратности  $n$ , то

$$\operatorname{Res}_{z_0} f = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z - z_0)^n f(z)].$$

**Доказательство.** Воспользуемся **теоремой 5.4** — умножим обе части разложения Лорана в **полюсе (5.7)** на  $(z - z_0)^n$ , получим равенство

$$(z - z_0)^n f(z) = \sum_{k=-n}^{\infty} c_k (z - z_0)^{k+n}.$$

Продифференцируем это равенство  $(n-1)$ -раз:

$$\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z - z_0)^n f(z)] = (n-1)! c_{-1} + \sum_{k=-n+1}^{\infty} c_k A_k (z - z_0)^{k+n},$$

где  $A_k = (n+k)(n+k-1) \dots (k+1)$ . Осталось перейти к пределу при  $z \rightarrow z_0$ . □





### 6.1.3. Теорема Коши о вычетах

Своим появлением **вычеты** обязаны Коши. Одним из основных назначений вычетов является возможность вычислять интегралы по кривым. Как реализуется эта возможность — показывает следующая важная теорема.




Рис. 6.1

**Теорема 6.3 (Коши, о вычетах).** Пусть  $D \subset \mathbb{C}$  — стандартная многосвязная область, функция  $f$  **аналитична** в  $D$ , кроме конечного множества  $S = \{z_1, z_2, \dots, z_n\} \subset D$  **изолированных особых точек**, и **непрерывна** в  $\overline{D} \setminus S$ . Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z_k} f.$$

**Доказательство.** Выберем  $r > 0$  так, чтобы круги  $\overline{B}(z_k, r) \subset D$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$ , попарно не пересекались и содержались в  $D$ . Применим к многосвязной области

$$D_r = D \setminus \bigcup_{k=1}^n \overline{B}(z_k, r)$$



Меню

Часть I. Теория

Глава 6. Теория вычетов

6.1. Вычеты и основная теорема о вычетах

6.1.3. Теорема Коши о вычетах



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

теорему Коши, получая равенство

$$0 = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D_r} f(z) dz = \oint_{\partial D} f(z) dz - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r(z_k)} f(z) dz.$$

В силу теоремы 6.1 отсюда следует нужное равенство.





### 6.1.4. Вычет в бесконечно удаленной точке

Пусть функция  $f$  **аналитична** во внешности круга  $\bar{B}(0, r)$  достаточно большого радиуса и  $z_0 = \infty$  является изолированной особой точкой для  $f$ .

**Определение 6.2.** *Вычетом функции  $f$  в изолированной особой точке  $\infty$  называется число*

$$\operatorname{Res}_{\infty} f = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C_r(0))^-} f(z) dz, \quad r > R.$$

Как и в случае конечной изолированной особой точки, интеграл в **определении 6.2** не зависит от  $r$  (его надо брать достаточно большим).

**Теорема 6.4.** *Если  $\infty$  — изолированная особая точка функции  $f$ , то вычет  $\operatorname{Res}_{\infty} f$  равен  $-c_{-1}$  — коэффициенту при  $z^{-1}$  в **разложении Лорана (5.8)** для  $f$  в бесконечно удаленной точке, взятому с противоположным знаком.*

**Доказательство.** Достаточно проинтегрировать **ряд (5.8)** по отрицательно ориентированной окружности  $C_R(0)$  и применить **лемму 3.2**.  $\square$

**Пример 6.4.** Если  $\infty$  является правильной особой точкой (см. **пункт 5.2.4**), то **ряд Лорана (5.8)** выводится в ряд

$$\sum_{k=-\infty}^0 c_k z^k,$$

поэтому **теорема 6.2** дает нам  $\operatorname{Res}_{\infty} f = -c_{-1}$ .

Обратим внимание на отличие результата последнего **примера 6.4** от случая конечной особенности (ср. с **примером 6.2**).



**Теорема 6.5.** Если  $\infty$  — полюс кратности  $n$ , то

$$\operatorname{Res} f_{\infty} = \frac{(-1)^n}{(n+1)!} \lim_{z \rightarrow \infty} \left[ z^{n+2} f^{(n+1)}(z) \right].$$

**Доказательство.** Для бесконечно удаленной точки используем **разложение Лорана (5.8)**

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^n c_k z^k,$$

которое продифференцируем  $n+1$  раз, а затем умножим на  $z^{n+2}$ ,

$$z^{n+2} f^{(n+1)}(z) = (-1)^{n+1} (n+1)! c_{-1} + \sum_{k=-\infty}^{-2} c_k A_k z^{k+1},$$

где  $A_k = k(k-1)\dots(k-n)$ . Отсюда при  $z \rightarrow \infty$  получаем требуемое. □



### 6.1.5. Теорема о полной сумме вычетов

**Теорема 6.6.** Пусть функция  $f$  *аналитична* всюду в  $\mathbb{C}$ , кроме *конечного* множества  $S = \{z_1, z_2, \dots, z_n\} \subset \mathbb{C}$  *изолированных особых точек*. Тогда справедливо равенство

$$\sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z_k} f + \operatorname{Res}_{\infty} f = 0.$$

**Доказательство.** Для достаточно большого  $r > 0$  все точки из  $S$  содержатся в круге  $B(0, r)$ . Поэтому в силу **теоремы 6.3** справедливо равенство

$$\sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z_k} f = \oint_{C_r^+(0)} f(z) dz,$$

правая часть которого равна  $-\operatorname{Res}_{\infty} f$  (см. **определение 6.1**). □



Меню

Часть I. Теория

Глава 6. Теория вычетов

6.2. Теорема о логарифмическом вычете и ее приложения



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 6.2. Теорема о логарифмическом вычете и ее приложения

6.2.1. Логарифмический вычет

6.2.2. Принцип аргумента

6.2.3. Теорема Руше

6.2.4. Принцип сохранения области



### 6.2.1. Логарифмический вычет

Пусть  $z_0 \in \mathbb{C}$  — **изолированная особая точка** функции  $f$ , которая **аналитична** в некоторой проколотой окрестности  $B^\circ(z_0, \varepsilon)$  и отлична там от нуля.

**Определение 6.3.** *Логарифмическим вычетом* функции  $f$  в изолированной особой точке  $z_0 \in \mathbb{C}$  называется **вычет** ее логарифмической производной  $f'/f$  в этой точке.

Другими словами, логарифмический вычет — это

$$\operatorname{Res}_{z_0} \frac{f'}{f} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C(z_0, r)} \frac{f'(z)}{f(z)} dz.$$

Рассмотрим примеры на вычисление логарифмического вычета.

**Пример 6.5.** Пусть функция **аналитична** в некоторой окрестности точки  $z_0 \in \mathbb{C}$ , которая является для нее нулем кратности  $n$ . Тогда

$$\operatorname{Res}_{z_0}(f'/f) = n. \quad (6.2)$$

**Решение.** Действительно, функция  $f$  представима в виде  $f(z) = (z - z_0)^n g(z)$ , где  $g$  **аналитична** в окрестности  $z_0$  и  $g(z) \neq 0$  в этой окрестности. Тогда

$$f'(z) = n(z - z_0)^{n-1} g(z) + (z - z_0)^n g'(z),$$

откуда

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{n}{z - z_0} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Так как второе слагаемое справа **аналитично** в некоторой окрестности точки  $z_0$ , то **равенство (6.2)** вытекает из случая  $n = -1$  **леммы 3.2**.  $\square$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Пример 6.6. Пусть функция **аналитична** в некоторой окрестности точки  $z_0 \in \mathbb{C}$ , которая является для нее **полюсом кратности**  $p$ . Тогда

$$\operatorname{Res}_{z_0}(f'/f) = -p. \quad (6.3)$$

Решение. Это можно доказать повторяя рассуждение из **примера 6.5**. Однако, можно просто сослаться на этот пример, так как если  $g = 1/f$ ,  $f'/f = -g'/g$  и  $z_0$  является нулем кратности  $p$  для  $g$ .  $\square$

Следующая теорема является основной в этом параграфе.

**Теорема 6.7 (о логарифмическом вычете).** Пусть

- 1)  $D \subset \mathbb{C}$  — стандартная многосвязная область,
  - 2) функция  $\varphi$  аналитична в  $D$  и **непрерывна** на  $\bar{D}$ ,
  - 3) функция  $f$  аналитична в  $D$ , кроме конечного числа полюсов в точках  $b_1, b_2, \dots, b_p \in D$ , имеет конечное число нулей в точках  $a_1, a_2, \dots, a_N \in D$  (каждый нуль и полюс записан столько раз, какова его кратность)
  - 4)  $f$  непрерывно продолжима вместе со своей производной  $f'$  на  $\partial D$  и  $f(z) \neq 0$  при  $z \in \partial D$ .
- Тогда справедливо равенство

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \varphi(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{k=1}^N \varphi(a_k) - \sum_{k=1}^P \varphi(b_k). \quad (6.4)$$

**Доказательство.** Пусть  $a \in D$  — нуль кратности  $n$  функции  $f$ . Тогда в некоторой окрестности точки  $a$  справедливо представление

$$f(z) = (z - a)^n f_1(z),$$

где функция  $f_1$  аналитична и отлична от нуля в этой окрестности. Кроме того, для функции  $\varphi$

$$\varphi(z) = \varphi(a) + (z - a)\varphi_1(z),$$

где  $\varphi_1$  аналитична в некоторой окрестности точки  $a$ . Поэтому

$$\varphi(z) \frac{f'(z)}{f(z)} = [\varphi(a) + (z - a)\varphi_1(z)] \left[ \frac{n}{z - a} + f_1'(z) \right] = \varphi(a) \frac{n}{z - a} + f_2(z),$$





Меню

Часть I. Теория

Глава 6. Теория вычетов

6.2. Теорема о логарифмическом вычете и ее приложения

6.2.1. Логарифмический вычет



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

где  $f_2$  — функция, аналитическая в окрестности точки  $a$ . Отсюда получаем, что

$$\operatorname{Res} a \left[ \varphi \frac{f'}{f} \right] = n\varphi(a).$$

Совершенно такое же рассуждение показывает, что если  $b \in D$  — полюс кратности  $p$  для функции  $f$ , то

$$\operatorname{Res} b \left[ \varphi \frac{f'}{f} \right] = -p\varphi(b).$$

Теперь осталось просуммировать полученные равенства по всем нулям и полюсам функции  $f$  и применить **теорему Коши о вычетах** к интегралу в левой части **равенства 6.4**.  $\square$



## 6.2.2. Принцип аргумента

**Лемма 6.1.** Пусть  $I = [\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$  — отрезок и  $F : I \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$  — *непрерывная* функция, не обращающаяся в нуль. Тогда существует такая непрерывная функция  $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ , что

$$F(t) = |F(t)|e^{i\varphi(t)}, \quad t \in I. \quad (6.5)$$

Любые две такие функции отличаются на тождественную постоянную.

**Доказательство.** Пусть

$$\varepsilon = 2 \min\{|F(t)| : t \in I\} > 0$$

(на компакте  $I$  непрерывная функция  $t \mapsto |F(t)|$  принимает наименьшее значение) и  $\delta > 0$  определяется по  $\varepsilon$  свойством равномерной непрерывности функции  $F$  (см. **теорему Кантора**), т.е. для любых  $t_1, t_2 \in I$  из  $|t_1 - t_2| < 2\delta$  следует  $|F(t_1) - F(t_2)| < \varepsilon$ .

Разобьем отрезок  $I$  конечным числом точек  $t_k = \alpha + (k-1)\delta$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$ , на части длины  $\delta$ . При этом образ каждого отрезка  $I_k = [t_{k-1}, t_k]$  лежит в круге  $B_k = B(F(t_{k-1}), \varepsilon)$  и точка 0 удалена не менее, чем на  $\varepsilon$ , от каждого из этих кругов. Отметим, что  $B_k \cap B_{k-1} \neq \emptyset$  для каждого  $k$ .

В каждом из этих кругов мы можем выделить однозначную ветвь функции  $z \mapsto \operatorname{Arg} z$  (см. **п. 2.4.3**). Используя это, будем последовательно строить искомую функцию  $\varphi$  на каждом из отрезков  $I_k$ .

Сначала фиксируем некоторую ветвь  $\varphi_1$  функции  $z \mapsto \operatorname{Arg} z$  в круге  $B_1$ . Тогда для любой ветви  $\varphi_2$  аргумента  $z$  в круге  $B_2$  будет

$$\varphi_1(z) - \varphi_2(z) = c, \quad z \in B_1 \cap B_2,$$

где  $c$  — некоторая постоянная. Вычитая из  $\varphi_2$  эту постоянную, добиваемся того, что  $\varphi_1(z) = \varphi_2(z)$  на  $B_1 \cap B_2$ . Продолжая это построение по индукции, на  $k$ -м шаге выбираем ветвь аргумента  $\varphi_k$  в круге  $B_k$  так, чтобы  $\varphi_k(z) = \varphi_{k-1}(z)$  на  $B_k \cap B_{k-1}$ .

Искомая функция  $\varphi$  определяется теперь так:

$$\varphi(t) = \varphi_k(F(t)), \quad t \in I_k, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$



Меню

Часть I. Теория

Глава 6. Теория вычетов

6.2. Теорема о логарифмическом вычете и ее приложения

6.2.2. Принцип аргумента



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Она удовлетворяет **условию (6.5)** и непрерывна на каждом  $I_k$ , как композиция непрерывных функций и, следовательно, непрерывна на  $I$ .

Покажем теперь, что любые две такие функции отличаются на тождественную постоянную. Пусть  $\varphi$  и  $\psi$  — две непрерывные функции, удовлетворяющие **условию (6.5)**.

Возьмем любую фиксированную точку  $t_0 \in (\alpha, \beta)$ . Тогда в некотором интервале  $J \subset (\alpha, \beta)$ , содержащем точку  $t_0$  справедливы представления

$$\varphi(t) = \varphi_1(F(t)), \quad \psi(t) = \varphi_2(F(t)), \quad t \in J,$$

где  $\varphi_1$  и  $\varphi_2$  — некоторые однозначные ветви аргумента  $z$  в некотором круге  $B$  с центром в точке  $F(t_0)$ . Так как  $\varphi_1(z) = \varphi_2(z) + c$  ( $c$  — некоторая постоянная), то функция  $\varphi - \psi$  постоянна на  $J$ .

В силу произвольности  $t_0$  функция  $\varphi - \psi$  локально постоянна на  $(\alpha, \beta)$ , поэтому она постоянна.  $\square$

Применим **лемму 6.1** в следующей ситуации. Пусть  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  — ориентированная **жорданова кривая** или **контур**, на которой задана непрерывная функция  $f : \Gamma \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ , не обращающаяся в нуль. Если  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \Gamma$  — параметризация  $\Gamma$ , сохраняющая ориентацию, то по **лемме 6.1** найдется такая непрерывная функция  $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ , что

$$f(\gamma(t)) = |f(\gamma(t))|e^{i\varphi(t)}, \quad t \in [\alpha, \beta].$$

При этом разность  $\varphi(\beta) - \varphi(\alpha)$  не зависит от выбора функции  $\varphi$ . Поэтому корректным является следующее определение: разность  $\varphi(\beta) - \varphi(\alpha)$  называется **приращением аргумента функции вдоль кривой (контура)  $\Gamma$**  и обозначается  $\Delta_\Gamma \arg f$ .

Легко убедиться в том, что такое определение не зависит от выбора параметризации.

В следующей теореме используется следующие обозначения:

$N(f, D)$  — число нулей функции  $f$  в области  $D \subset \mathbb{C}$ ,

$P(f, D)$  — число полюсов функции  $f$  в области  $D \subset \mathbb{C}$

с учетом их кратностей.

**Теорема 6.8 (принцип аргумента).** Пусть  $D \subset \mathbb{C}$  — стандартная односвязная область с кусочно-гладкой границей, функция  $f$  удовлетворяет условиям **теоремы о логарифмическом вычете** и имеет конечное число **полюсов** в  $D$ . Тогда

$$N(f, D) - P(f, D) = \Delta_{\partial D} \arg f.$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Доказательство. Пусть  $\gamma : [0, 2\pi) \rightarrow \partial D$  — положительная параметризация границы  $\partial D$ . Тогда в силу равенства (3.5)

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{f'(z)}{f(z)} dz &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f'(\gamma(t))}{f(\gamma(t))} \gamma'(t) dt = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} (\operatorname{Ln} f \circ \gamma)' dt = \operatorname{Ln} f(\gamma(2\pi)) - \operatorname{Ln} f(\gamma(0)) = \\ &= [\ln |f(\gamma(2\pi))| - \ln |f(\gamma(0))|] + i[\operatorname{Arg} f(\gamma(2\pi)) - \operatorname{Arg} f(\gamma(0))]. \end{aligned}$$

Действительная часть выражения справа равна нулю, а мнимая есть  $\Delta_{\partial D} \arg f$ . Доказываемое равенство вытекает теперь из равенства (6.4), в котором следует взять функцию  $\varphi(z) \equiv 1$ .  $\square$



### 6.2.3. Теорема Руше

**Теорема 6.9 (Руше).** Пусть  $D \subset \mathbb{C}$  — стандартная односвязная область, функции  $f$  и  $g$  *аналитичны* в  $D$  и *непрерывны* в  $\bar{D}$  вместе со своими *производными*, причем

$$|f(\zeta)| > |g(\zeta)| \quad \text{при } \zeta \in \partial D.$$

Тогда  $f$  и  $f + g$  имеют одинаковое число нулей в  $D$ .

**Доказательство.** Для  $\alpha \in [0, 1]$  рассмотрим семейство функций

$$h_\alpha(z) = f(z) + \alpha g(z).$$

Ясно, что  $h_\alpha(z) \neq 0$  при всех  $\alpha \in [0, 1]$  и  $z \in \partial D$ , так как

$$|f(z) + \alpha g(z)| \geq |f(z)| - \alpha |g(z)| > (1 - \alpha)|f(z)|$$

и  $f(z) \neq 0$  при  $z \in \partial D$ .

Применим к  $h_\alpha$  **теорему о логарифмическом вычете**, получая

$$\oint_{\partial D} \frac{f'(z) + \alpha g'(z)}{f(z) + \alpha g(z)} dz = N(\alpha), \quad (6.6)$$

где  $N(\alpha)$  — количество нулей  $h_\alpha$  в  $D$ .

Левая часть (6.6) непрерывна по  $\alpha \in [0, 1]$  (так как подынтегральная функция непрерывно зависит от  $\alpha$ ). Функция  $N(\alpha)$  также непрерывна по  $\alpha$ . Но  $N(\alpha)$  принимает только целые значения, поэтому она постоянна и  $N(0) = N(1)$ . Значит число нулей в  $D$  для  $f + g$  и  $g$  одинаково.  $\square$

Смысл теоремы Руше в том, что можно вычислять количество нулей функции, упрощая выражение для нее отбрасываем ее «небольших частей».

Для иллюстрации теоремы Руше докажем с ее помощью основную теорему алгебры.



**Теорема 6.10.** *Каждый алгебраический многочлен*

$$P_n(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k, \quad z \in \mathbb{C},$$

*степени  $n$  имеет ровно  $n$  комплексных нулей (с учетом их кратности).*

**Доказательство.** Запишем наш полином в виде  $P_n = f + g$ , где

$$f(z) = a_0 z^n, \quad g(z) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k z^k.$$

Так как  $P_n$  имеет полюс порядка  $n$  в бесконечно удаленной точке, то все его корни (если таковые имеются) лежат в круге  $B(0, R)$  достаточно большого радиуса  $R$ . Кроме того,  $f(z)/g(z) \rightarrow \infty$  при  $z \rightarrow \infty$  и можно также считать, что  $|f(z)| > |g(z)|$  при  $|z| = R$ . По **теореме Руше**  $P_n$  имеет в круге  $B(0, R)$  столько же нулей, сколько и  $a_0 z^n$  — ровно  $n$ . □



## 6.2.4. Принцип сохранения области

Напомним, что **область**  $D \subset \mathbb{C}$  — открытое связное множество.

**Теорема 6.11 (принцип сохранения области).** Пусть функция  $f$  **аналитична** в области  $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$  и отлична от тождественной постоянной. Тогда образ  $f(D)$  является областью.

**Доказательство.** **Связность** образа  $f(D)$  является общетопологическим фактом (**аналитическая** функция **непрерывна**). Существенно комплексным фактом является **открытость** образа.

Докажем, что  $f(D)$  — открытое множество. Пусть  $z_0 \in D$  и  $w_0 = f(z_0) \in f(D)$ . Докажем, что некоторая окрестность точки  $w_0$  также содержится в  $f(D)$ .

Сначала считаем  $z_0 \neq \infty$  и  $w_0 \neq \infty$ . Тогда найдется круг  $\overline{B}(z_0, \rho) \subset D$ , в котором  $f(z) \neq w_0$ . Это следует из **теоремы 4.6**.

Обозначим

$$r = \min\{|f(z) - w_0| : z \in C_\rho(z_0)\}.$$

Тогда  $r > 0$ , так как непрерывная функция  $z \mapsto |f(z) - w_0|$  принимает свое минимальное значение на компакте  $C_\rho(z_0)$ .

Покажем, что  $B(w_0, r) \subset f(D)$ . Если  $w \in B(w_0, r)$  — произвольная точка, то

$$|w - w_0| < r < |f(z) - w_0|.$$

По **теореме Руше** функция

$$f(z) - w = [f(z) - w_0] - [w - w_0]$$

имеет в круге  $B(z_0, \rho)$  столько нулей сколько и  $f(z) - w_0$  (а она их имеет). Итак,  $f(z) = w$  в некоторой точке  $z \in B(z_0, \rho)$ , т.е.  $w \in f(D)$ . А так как  $w$  — произвольная точка  $B(w_0, r)$ , то  $B(w_0, r) \subset f(D)$  и  $f(D)$  открыто.

Если  $z_0 \neq \infty$ ,  $w = \infty$ , то функция  $f$  имеет полюс в точке  $z_0$  и  $g = 1/f$  имеет в  $z_0$  нуль. По доказанному  $g(z_0) = 0$  — внутренняя точка ее области значений. Если  $z_0 = \infty$ ,  $w = \infty$ , то точно так же рассуждаем с функцией  $g(z) = 1/f(1/z)$ . □



Меню

Часть I. Теория

Глава 7. Дополнительные главы комплексного анализа



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 7

# Дополнительные главы комплексного анализа

- 7.1. Аналитическое продолжение
- 7.2. Однолистные функции
- 7.3. Конформное отображение областей
- 7.4. Конформные отображения многоугольников





Меню

Часть I. Теория

Глава 7. Дополнительные главы комплексного анализа

7.1. Аналитическое продолжение



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 7.1. Аналитическое продолжение

7.1.1. Элемент аналитической функции и его продолжение

7.1.2. Принцип симметрии Римана-Шварца



### 7.1.1. Элемент аналитической функции и его продолжение

Будем говорить, что функция  $f_0$ , **аналитическая** в области  $D_0 \subset \widehat{\mathbb{C}}$ , допускает **аналитическое продолжение** в область  $D_1 \subset \widehat{\mathbb{C}}$ , имеющую непустое связное пересечение с  $D_0$ , если существует функция  $f_1$ , аналитическая в области  $D_1$ , для которой

$$f_0(z) = f_1(z) \quad \text{при} \quad z \in D_0 \cap D_1.$$

Простейшим примером служит аналитическое продолжение аналитической функции в устранимую особую точку с сохранением свойства непрерывности. Это продолжение задается рядом Тейлора с центром в этой точке.

**Пример 7.1.** Рассмотрим гамма-функцию Эйлера, задаваемую несобственным интегралом

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt.$$

Аналогично тому, как это делалось в курсе математического анализа, нетрудно установить, что интеграл (??) сходится при  $\operatorname{Re} z > 0$ .

Построим аналитическое продолжение гамма-функции с помощью функционального соотношения  $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ , которое при  $\operatorname{Re} z > 0$  получается интегрированием по частям.

Используем это соотношение для определения гамма-функции в более широкой области, чем исходная. Такой подход кажется естественным, так как в этом соотношении заложено ее важнейшее свойство — давать определение факториала для нецелых показателей (на самом деле, роль гамма-функции Эйлера в математике значительно шире).

Именно, положим

$$\Gamma(z) := \frac{\Gamma(z+1)}{z} \quad \text{при} \quad \operatorname{Re} z > -1, z \neq 0.$$

Повторяя эту процедуру, мы можем продолжить гамма-функцию в левую полуплоскость, за исключением точек  $z = -n$ ,  $n = 0, 1, \dots$ , в которых она будет иметь **полюсы**.



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Пример 7.2. Рассмотрим задачу аналитического продолжения **логарифма**, начиная с его разложения Тейлора в круге  $D_0 = B(1, 1)$

$$f_0(z) = \ln z = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} (z-1)^k \quad z \in B(1, 1).$$

Из **теоремы Вейерштрасса** вытекает, что при  $z \in B(1, 1)$

$$f_0'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} (z-1)^{k-1} = \frac{1}{1-(z-1)} = \frac{1}{z}.$$

Отсюда по **формуле Ньютона–Лейбница**

$$f(z) = \int_1^z \frac{d\zeta}{\zeta}, \quad z \in B(1, 1), \quad (7.1)$$

где интегрирование ведется, например, по отрезку  $[1, z]$ .

Это равенство может служить для аналитического продолжения логарифмической функции. Именно, положим

$$f_1(z) = \int_0^z \frac{d\zeta}{\zeta}, \quad z \in D_1 = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0],$$

где интеграл снова берется по отрезку  $[1, z]$ .

Вместо разреза по отрицательной полуоси  $(-\infty, 0]$  можно было бы использовать другой, например, по любому лучу, исходящему из начала координат. Тогда мы получим аналитическое продолжение логарифма в другую область. Объединение таких областей даст проколотую плоскость  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ .

Отметим еще, что интеграл в (7.1) имеет смысл для любого пути, соединяющего 1 и  $z \in \mathbb{C}$  и не проходящего через точку 0. Однако, его значение уже будет зависеть от пути (сколько оборотов будет сделано вокруг начала координат).

Дадим теперь более общее понятие аналитического продолжения. В отличие от него аналитическое продолжение, введенное в начале параграфа будем называть **непосредственным**.



**Определение 7.1.** Пара  $\{D, f\}$ , где  $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$  — выпуклая область,  $f \in H(D)$  называется *элементом аналитической функции*. Два элемента  $\{D_0, f_0\}$  и  $\{D_1, f_1\}$  называются равными, если  $D_0 = D_1$  и  $f_0(z) \equiv f_1(z)$  в  $D_0$ .




Рис. 7.1

**Определение 7.2.** Элемент  $\{D_1, f_1\}$  называется (непосредственным) *аналитическим продолжением элемента*  $\{D_0, f_0\}$ , если

- 1)  $D_0 \cap D_1 \neq \emptyset$ ,
- 2)  $f_0(z) = f_1(z)$ ,  $z \in D_0 \cap D_1$ .

Если в этом случае  $D_0 \subset D_1$ , то будем говорить также, что элемент  $\{D_0, f_0\}$  *подчинен* элементу  $\{D_1, f_1\}$ .

**Определение 7.3.** Конечный набор элементов  $\{D_k, f_k\}_{k=0}^n$  называется *цепью*, если каждый элемент  $\{D_k, f_k\}$  является аналитическим продолжением предыдущего элемента  $\{D_{k-1}, f_{k-1}\}$ .



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

В этом случае также говорят, что  $\{D_n, f_n\}$  является аналитическим продолжением  $\{D_0, f_0\}$  по соединяющей цепи (см. рис. 7.2).

Напомним, что бинарное отношение « $\sim$ » на множестве  $X$  называется *отношением эквивалентности*, если выполнены следующие условия

- 1)  $\forall x \in X \quad x \sim x$  (свойство рефлексивности),
- 2)  $\forall x, y \in X \quad x \sim y \Rightarrow y \sim x$  (свойство симметричности),
- 3)  $\forall x, y, z \in X \quad (x \sim y) \wedge (y \sim z) \Rightarrow x \sim z$  (свойство транзитивности).

Пусть « $\sim$ » — отношение эквивалентности на множестве  $X$  и  $x \in X$ , тогда

$$\hat{x} := \{y \in X : y \sim x\}$$

называется *классом эквивалентности* элемента  $x$ . Тогда для любого  $x \in X$  класс эквивалентности (или фактор-класс)  $\hat{x}$  не пуст, б) любые два класса эквивалентности либо не пересекаются, либо совпадают, в) объединение всех классов эквивалентности совпадает со множеством  $X$ . Множество всех классов эквивалентности называется фактор-пространством множества  $X$  по отношению эквивалентности  $\sim$ .

Рассмотрим множество  $\mathcal{E}$  всех элементов  $\{D, f\}$  и введем в нем отношение эквивалентности: два элемента эквивалентны, если один из них является аналитическим продолжением другого по некоторой цепи (проверьте самостоятельно, что это — действительно отношение эквивалентности).




Рис. 7.2

Каждый фактор-класс  $\mathcal{E}$  по указанному отношению эквивалентности называется *полной аналитической функцией*.



Областью существования полной аналитической функции называется объединение областей всех элементов, входящих в этот класс. Будем обозначать ее  $\text{Dom } F$ . Область существования полной аналитической функции является областью (докажите это самостоятельно).

Каждая точка  $z \in \text{Dom } F$  может входить в различные области элементов класса и соответствующие функции в этой точке не обязаны иметь одинаковые значения, т.е. полная аналитическая функция, вообще говоря, многозначна.

Желая избежать многозначности, Риман предложил некоторое обобщение понятия области определения полной аналитической функции — так называемая риманова поверхность.

Существо дела состоит в том, что точку  $z \in \text{Dom } F$ , принадлежащую областям двух элементов  $\{D_0, f_0\}$  и  $\{D_1, f_1\}$  полной аналитической функции, мы рассматриваем как одну и ту же, тогда и только тогда, когда эти элементы являются непосредственными аналитическими продолжениями друг друга.

Может случиться, что пересечение областей  $D_0$  и  $D_1$  непусто, однако элементы  $\{D_0, f_0\}$  и  $\{D_1, f_1\}$  являются аналитическими продолжениями друг друга по некоторой цепи, содержащей некоторые промежуточные элементы. В таком случае мы не отождествляем точки из  $D_0 \cap D_1$ .

Чтобы придать наглядность этому процессу предположим, что для каждого  $D$  заготовлена «модель  $D$ » (кусочек плоскости). Процесс объединения областей представим себе как склеивание (отождествление) тех частей, точки которых отождествляются. В результате этого процесса «склеивания» мы получаем многослойную (вообще говоря) поверхность, расположенную над областью  $\text{Dom } F$ .

Элементы аналитической функции вида

$$\left( B(z_0, r), \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \right)$$

называются *каноническими*.

Нетрудно убедиться (сделайте это самостоятельно), что любой элемент  $\{D, f\}$  аналитической функции является результатом аналитического продолжения по цепи любого канонического элемента, подчиненного ему. Поэтому при построении полной аналитической функции в качестве исходного класса можно брать не все множество элементов данного класса, а лишь его подмножество, состоящее из канонических элементов.

Вопрос о существовании однозначных ветвей полной аналитической функции рассматривается в следующей теореме, которую мы приведем здесь без доказательства.



Меню

Часть I. Теория

Глава 7. Дополнительные главы комплексного анализа

7.1. Аналитическое продолжение

7.1.1. Элемент аналитической функции и его продолжение



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

**Теорема 7.1 (о монодромии).** Если область  $D \subset \mathbb{C}$  односвязна, а элемент аналитической функции  $\{D_0, f\}$ ,  $D_0 \subset D$ , допускает аналитическое продолжение по любому пути  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow D$ , то существует такая однозначная аналитическая функция  $F : D \rightarrow \mathbb{C}$ , что  $f(z) = F(z)$ ,  $z \in D_0$ .

Термин «монодромия» переводится как «однозначность». **Теорема 7.1** говорит нам, что для выделения однозначной ветви необходимо найти односвязную подобласть в области определения полной аналитической функции, в которой некоторый элемент допускает аналитическое продолжение по любому пути.



## 7.1.2. Принцип симметрии Римана-Шварца

Рассмотрим некоторые специальные достаточные условия аналитической продолжаемости функции. Начнем с доказательства вспомогательного утверждения, показывающего, грубо говоря, что функция, **аналитическая** в окрестности **жордановой кривой**  $\Gamma_0$  и **непрерывная** на этой кривой, является аналитической и в точках  $\Gamma_0$ .




Рис. 7.3

Пусть  $D_1, D_2 \subset \mathbb{C}$  — две **области**,  $D_1 \cap D_2 = \emptyset$ , имеющие общий участок границы — **спрямляемую** жорданову кривую  $\Gamma$ ,  $\Gamma_0$  — та же кривая, но без концов. Положим  $D = D_1 \cup D_2 \cup \Gamma_0$ .

**Лемма 7.1.** Пусть функции  $f_k$  аналитичны в  $D_k$  и непрерывны в  $D_k \cup \Gamma_0$  соответственно ( $k = 1, 2$ ), причем  $f_1(z) = f_2(z)$  при  $z \in \Gamma_0$ . Тогда функция

$$\varphi(z) = \begin{cases} f_1(z), & z \in D_1 \cup \Gamma_0, \\ f_2(z), & z \in D_2, \end{cases}$$

аналитична в  $D$ .





Доказательство. Достаточно доказать аналитичность в точках  $z_0 \in \Gamma_0$ . Пусть  $B(z_0, \delta) \subset D$ , тогда функция

$$\Phi(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_\delta(z_0)} \frac{\varphi(\xi) d\xi}{\xi - z}, \quad z \in B(z_0, \delta),$$

аналитична в круге  $B(z_0, \delta)$ .

Обозначим  $\tilde{D}_k = D_k \cap B(z_0, \delta)$ ,  $k = 1, 2$ , и в этих областях применим **интегральную формулу Коши**

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial \tilde{D}_k} \frac{f_k(\xi) d\xi}{\xi - z} = \begin{cases} f_k(z), & z \in \tilde{D}_k, \\ 0, & z \notin \tilde{D}_k. \end{cases}$$

Складывая эти равенства, получим

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_\delta(z_0)} \frac{\varphi(\xi) d\xi}{\xi - z} = \begin{cases} f_1(z), & z \in \tilde{D}_1, \\ f_2(z), & z \in \tilde{D}_2 \end{cases}$$

(интегралы по общей части границ областей  $\tilde{D}_1$  и  $\tilde{D}_2$ , которая является частью  $\Gamma_0$ , уничтожаются, так как интегрирование по ним происходит в противоположных направлениях). Поэтому  $\Phi \equiv \varphi$  в  $\tilde{D}_1 \cup \tilde{D}_2$ , а на  $\Gamma_0$  это следует из непрерывности.  $\square$

**Теорема 7.2 (принцип симметрии Римана – Шварца).** Пусть граница области  $D \subset \mathbb{C}$  содержит открытую дугу  $\gamma_0$   $\widehat{\mathbb{C}}$ -окружности  $\gamma \subset \partial D$ , функция  $f$  аналитична в  $D$ , непрерывна в  $D \cup \gamma_0$  и образ  $\Gamma_0 = f(\gamma_0)$  является открытой дугой некоторой  $\widehat{\mathbb{C}}$ -окружности.

Тогда функцию  $f$  можно аналитически продолжить из области  $D$  через дугу  $\gamma_0$  в область  $D^*$ , симметричную  $D$  относительно  $\gamma_0$  по правилу

$$f(z) = f^*(z^*), \quad z \in D^*. \quad (7.2)$$

(В формулировке теоремы открытая дуга — дуга без концов, а  $*$  означает отображения симметрии относительно  $\gamma_0$  и  $\Gamma_0$  соответственно.)



Доказательство. Применяя подходящие **дробно-линейные отображения** сводим доказательство к случаю, когда  $\Gamma_0$  и  $\gamma_0$  — интервалы на вещественной прямой. В этом случае  $f^*(z) = f(\bar{z})$ .

Если  $z_0 \in D$ , то существует такой круг  $B(z_0, r)$ ,  $r > 0$ , что

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n, \quad z \in B(z_0, r).$$

Следовательно, при  $z \in B(\bar{z}_0, r)$  справедливо равенство

$$f^*(z) = \overline{f(\bar{z})} = \sum_{n=0}^{\infty} \bar{c}_n(z - \bar{z}_0)^n.$$

В силу **теоремы 4.5** продолженная функция аналитична в точках  $D^*$ .

В силу непрерывности функции  $f$  в  $D \cup \gamma_0$  и того, что  $f$  на  $\gamma_0$  имеет действительные значения при  $z \rightarrow x_0 \in \gamma_0$  (в  $D^*$ )

$$\lim_{z \rightarrow x_0} f^*(z) = \lim_{\bar{z} \rightarrow x_0} \overline{f(\bar{z})} = \overline{f(x_0)} = f(x_0).$$

Итак, выполнены условия **леммы 7.1**, применение которой доказывает аналитичность продолженной функции и в точках  $\gamma_0$ .  $\square$

Смысл термина «принцип симметрии» объясняет **формула (7.2)** — функция, задаваемая этим равенством переводит точки, симметричные относительно  $\gamma_0$ , в точки, симметричные относительно  $\Gamma_0 = f(\gamma_0)$ .

Важный и интересный пример применения принципа симметрии мы рассмотрим немного позже в п. **7.4.2**, когда изучим новую функцию — эллиптический синус.



Меню

Часть I. Теория

Глава 7. Дополнительные главы комплексного анализа

7.2. Однолистные функции



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 7.2. Однолистные функции

7.2.1. Теорема о числе прообразов

7.2.2. Критерий локальной однолистности

7.2.3. Особые точки однолистных функций

7.2.4. Последовательности однолистных функций



Меню

Часть I. Теория

Глава 7. Дополнительные главы комплексного анализа

7.2. Однолистные функции

7.2.1. Теорема о числе прообразов



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

### 7.2.1. Теорема о числе прообразов

Пусть функция  $f$  **аналитична** в точке  $z_0$ ,  $w_0 = f(z_0)$  и  $n \in \mathbb{N}$ . Будем говорить, что  $z_0$  является  *$n$ -кратной  $w_0$ -точкой функции  $f$* , если  $f^{(k)}(z_0) = 0$  при  $k = 1, 2, \dots, n-1$  и  $f^{(n)}(z_0) \neq 0$ .

**Теорема 7.3.** *Если  $z_0$  является  $n$ -кратной  $f(z_0)$ -точкой функции  $f$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , то существуют такие круги  $B(z_0, r)$ ,  $r > 0$ , и  $B(f(z_0), \rho)$ ,  $\rho > 0$ , что каждая точка  $w \in B(f(z_0), \rho)$  имеет ровно  $n$  прообразов в  $B(z_0, r)$  (различных, если  $w \neq f(z_0)$ ).*

**Доказательство.** По условию функция  $f$  имеет нуль кратности  $n$  в точке  $z_0$ . Существует замкнутый круг  $\bar{B}(z_0, r)$ , в котором функции  $f - f(z_0)$  и  $f'$  нет других нулей, кроме точки  $z_0$ . Тогда

$$\rho = \inf\{|f(z) - f(z_0)| : z \in C_r(z_0)\} > 0.$$

Возьмем  $w \in B(f(z_0), \rho)$  и рассмотрим функцию

$$g(z) = f(z) - w = [f(z) - f(z_0)] + [f(z_0) - w].$$

Так как  $|f(z) - f(z_0)| \geq \rho > |f(z_0) - w|$  при  $z \in C_r(z_0)$ , то по **теореме Руше** функция  $g = f - w$  имеет в круге  $B(z_0, r)$  столько же нулей (с учетом их кратности), сколько и  $f - f(z_0)$ , т.е.  $n$ . Все эти нули простые, так как производная  $g' = f'$  не имеет нулей, отличных от  $z_0$ .  $\square$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран




Рис. 7.4



## 7.2.2. Критерий локальной однолистности

Напомним, что функция  $f$  называется **однолистной** в области  $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ , если она инъективна, т.е.

$$f(z_1) \neq f(z_2) \quad \text{для любых точек } z_1 \neq z_2 \text{ из } D.$$

Следующая лемма дает необходимое условие локальной однолистности.

**Лемма 7.2.** Если функция  $f$  **аналитична** в точке  $z_0$  и  $f'(z_0) \neq 0$ , то  $f$  **однолисна** в некоторой окрестности  $z_0$  и обратная функция  $f^{-1}$  **однолисна** и **аналитична** в некоторой окрестности точки  $f(z_0)$ .

**Доказательство.** Однолистность является прямым следствием теоремы об обратной функции из курса математического анализа. Пусть  $f$  однолисна в круге  $B(z_0, r)$ . Отметим, что по **теореме 6.11** образ  $f(B(z_0, r))$  является **открытым** множеством.

Для существования **производной** у обратной функции в любой точке  $w \in f(B(z_0, r))$  возьмем  $w_1 \in f(B(z_0, r))$ ,  $w \neq w_1$ . Тогда найдутся такие  $z, z_1 \in B(z_0, r)$ , что  $w = f(z)$ ,  $w_1 = f(z_1)$ , при этом  $z_1 \neq z$ . Кроме того, если  $w_1 \rightarrow w$ , то  $z_1 \rightarrow z$  (что легко вывести из леммы Больцано – Вейрштрасса – сделайте это самостоятельно). Поэтому

$$\lim_{w_1 \rightarrow w} \frac{f^{-1}(w_1) - f^{-1}(w)}{w_1 - w} = \lim_{z_1 \rightarrow z} \frac{1}{\frac{f(z_1) - f(z)}{z_1 - z}} = \frac{1}{f'(z)}. \quad \square$$

Пример функции  $f(z) = e^z$  показывает, что это утверждение не носит глобального характера. Ее производная всюду в  $\mathbb{C}$  отлична от нуля, однако  **$e^z$  не является глобально однолистной**.

Для глобальной однолистности условие отсутствия нулей у производной является необходимым.

**Теорема 7.4.** Если функция  $f$  **аналитична** и **однолисна** в области  $D \subset \mathbb{C}$ , то  $f'(z) \neq 0$  в  $D$ .

**Доказательство.** Предположим, что  $f'(z_0) = 0$  в некоторой точке  $z_0 \in D$ . Тогда для некоторого  $n \geq 2$

$$f(z) = f(z_0) + \sum_{k=n}^{\infty} c_k (z - z_0)^k, \quad \text{причем } c_n \neq 0.$$



Меню

Часть I. Теория

Глава 7. Дополнительные главы комплексного анализа

7.2. Однолистные функции

7.2.2. Критерий локальной однолистности



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

В силу **теоремы о единственности** существует такое  $r_1 > 0$ , что

$$f'(z) \neq 0, \quad z \in \bar{B}^\circ(z_0, r_1).$$

Рассмотрим вспомогательную функцию

$$g(z) = f(z) - f(z_0) = (z - z_0)^n \sum_{k=n}^{\infty} c_k (z - z_0)^{k-n}$$

и отметим, что второй множитель справа отличен от нуля в некотором круге  $\bar{B}(z_0, r_2)$ . Это означает, что  $z_0$  является корнем кратности  $n$  для функции  $g$ . Положим

$$r = \frac{1}{2} \min\{r_1, r_2\} > 0$$

и

$$2\alpha = \inf\{|g(z)| : z \in C_r(z_0)\} > 0.$$

Тогда  $|g(z)| \geq 2\alpha$  при  $z \in C_r(z_0)$  и к функциям  $g$  и  $h(z) \equiv \alpha$  можно применить **теорему Руше**, согласно которой  $g$  и  $g+h$  имеют одинаковое число нулей в  $B(z_0, r)$ . Функция  $g$  имеет там  $n$ -кратный корень  $z_0$ , а все корни  $g+h = g+\alpha$  просты (ее производная отлична от нуля при  $z \neq z_0$ ). Следовательно, и  $f(z) = f(z_0) + \alpha$  в  $n \geq 2$  точках, что невозможно в силу однолистности  $f$ .  $\square$

Будем говорить, что функция  $f$  **однолистка в точке**  $z_0 \in \mathbb{C}$ , если она однолистка в некоторой окрестности этой точки.

**Теорема 7.5.** *Функция  $f$ , аналитическая в точке  $z_0 \in \mathbb{C}$ , будет однолистной в этой точке тогда и только тогда, когда  $f'(z_0) \neq 0$ .*

**Доказательство.** Необходимость вытекает из **теоремы 7.4**. Достаточность является следствием **теоремы 7.3**, согласно которой каждое значение в точках из этой окрестности принимается ровно один раз, так как  $z_0$  является 1-кратной  $f(z_0)$ -точкой для  $f$ .  $\square$



Меню

Часть I. Теория

Глава 7. Дополнительные главы комплексного анализа

7.2. Однолистные функции

7.2.2. Критерий локальной однолистности



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Рассмотрим теперь понятие однолистности в бесконечно удаленной точке. Естественно считать, что функция однолистка в  $\infty$ , если функция  $\zeta \rightarrow f(1/\zeta)$  однолистка в точке 0. Если  $f$  **аналитична в точке  $\infty$** , то разложение функции  $\zeta \rightarrow f(1/\zeta)$  в ряд Тейлора в нуле имеет вид

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \zeta^k,$$

и ее однолиственность в нуле по **теореме 7.5** равносильна тому, что  $a_1 \neq 0$ . Это дает разложение

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{-k},$$

функции  $f$  в  $\infty$  и мы приходим к следующему критерию однолистности на бесконечности.

**Теорема 7.6.** *Функция  $f$ , аналитическая в точке  $\infty \in \widehat{\mathbb{C}}$ , будет однолистной в этой точке тогда и только тогда, когда  $\operatorname{Res}_{\infty} f \neq 0$ .*





### 7.2.3. Особые точки однолистных функций

Выясним теперь, какими **особыми точками** могут обладать однолистные функции. Оказывается они не могут быть произвольными.

**Теорема 7.7.** Пусть  $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$  — область,  $S \subset D$  — конечное множество и функция  $f$  **аналитична** и однолистка в  $D \setminus S$ .

Тогда все точки из  $S$  являются **устраняемыми** для  $f$ , кроме, быть может, одной, которая может быть только **полюсом 1-го порядка**.

**Доказательство.** Пусть  $z_0 \in S$ ,  $z_0 \neq \infty$ . Выберем  $r > 0$  настолько малым, чтобы  $B(z_0, r) \subset D$  и пусть  $w_0 \notin \overline{f(B^\circ(z_0, r))}$  (здесь черта обозначает **замыкание** множества).

Рассмотрим вспомогательную функцию  $g(z) = (f(z) - w_0)^{-1}$ , которая аналитична и ограничена в  $B(z_0, r)$ , поэтому  $z_0$  является **устраняемой особенностью для  $g$** . Положим  $g(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} g(z)$  и доопределим  $f$  в точке  $z_0$ , полагая

$$f(z_0) = \begin{cases} w_0 + 1/g(z_0), & \text{если } g(z_0) \neq 0, \\ \infty, & \text{если } g(z_0) = 0. \end{cases}$$

При таком определении  $f$  локально ограничена в каждой точке  $z_0 \in S$ , где  $g(z_0) \neq 0$ . Поэтому такие точки из  $S$  являются для  $f$  **устраняемыми**. Если же  $g(z_0) = 0$ , то  $z_0$  является **полюсом для  $f$** , так как в этом случае  $f(z) \rightarrow \infty$  при  $z \rightarrow z_0$ .

Доопределив таким образом  $f$  на  $S$ , покажем, что она однолистка в  $D$ .

В самом деле, если предположить, что для каких-то двух различных точек  $z_1, z_2 \in D$  будет  $f(z_1) = f(z_2)$ , то

$$B(z_1, r) \cap B(z_2, r) \neq \emptyset, \quad B(z_k, r) \subset D, \quad k = 1, 2, \quad (7.3)$$

для достаточно малого  $r > 0$ , образы  $f(B(z_k, r))$  этих кругов будут открыты по **принципу сохранения области** и точка  $f(z_1) = f(z_2)$  будет внутренней для  $f(B(z_1, r)) \cap f(B(z_2, r))$ . Поэтому каждое значение из этого пересечения будет приниматься дважды, что противоречит однолистности функции  $f$  на  $D \setminus S$ . Однолистность  $f$  на  $D$  доказана.



Меню

Часть I. Теория

Глава 7. Дополнительные главы комплексного анализа

7.2. Однолистные функции

7.2.3. Особые точки однолистных функций



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

В частности, полюс может быть только в одной точке  $z_0$ . Если порядок  $n$  этого полюса больше единицы, то функция  $1/f$  имела бы нуль порядка  $n \geq 2$  в  $z_0$  и по **теореме 7.3** в некоторой окрестности  $z_0$  каждое значение принимала бы по крайней мере дважды в различных точках. Это же было бы верно и для  $f$ , что невозможно из-за ее однолистности.  $\square$



## 7.2.4. Последовательности однолистных функций

**Теорема 7.8.** Пусть последовательность  $\{f_n\}$  *аналитических* и однолистных функций сходится равномерно внутри  $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$  к функции  $f$ , отличной от тождественной постоянной.

Тогда  $f$  аналитична и однолистка в  $D$ .

**Доказательство.** Если  $f(z_1) = f(z_2) = w_0$ , то возьмем  $r > 0$  настолько малым, чтобы выполнялось *условие (7.3)* и в кругах  $B(z_k, r)$  значение  $w_0$  функция  $f$  больше не принимает. Пусть

$$\rho = \inf\{|f(z) - w_0| : z \in \Gamma := C_r(z_1) \cup C_r(z_2)\} > 0,$$

$\Gamma \subset D$  — **компакт**, поэтому в силу равномерной сходимости на  $\Gamma$  существует такое  $n$ , что  $|f_n(z) - f(z)| < \rho \leq |f(z) - w_0|$  для всех  $z \in \Gamma$ . В каждом из кругов  $B(z_1, r)$  и  $B(z_2, r)$  применим **теорему Руше**, по которой функция

$$f_n - w_0 = [f_n - f] + [f - w_0]$$

имеет в каждом из этих кругов столько же нулей, что  $f - w_0$ . Итак,  $f_n$  принимает значение  $w_0$  в каждом из кругов  $B(z_1, r)$  и  $B(z_2, r)$ , что противоречит однолистности  $f_n$ .  $\square$



Меню

Часть I. Теория

Глава 7. Дополнительные главы комплексного анализа

7.3. Конформное отображение областей



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 7.3. Конформное отображение областей

7.3.1. Автоморфизмы основных областей

7.3.2. Теорема Римана



### 7.3.1. Автоморфизмы основных областей

Мы уже встречались с термином «автоморфизм», когда рассматривали **дробно-линейные отображения** основных областей — расширенной плоскости  $\widehat{\mathbb{C}}$ , плоскости  $\mathbb{C}$  и **круга (2.11)**. Сейчас мы расширим это понятие и рассмотрим его более подробно.

**Определение 7.4.** Пусть  $D \subset \mathbb{C}$  — **область**. Отображение  $\varphi : D \rightarrow D$  называется **автоморфизмом области**  $G$  если

- 1)  $\varphi$  **аналитична** в  $D$ ,
- 2)  $\varphi$  отображает  $D$  на  $D$  однолистно (взаимно однозначно).

Множество всех автоморфизмов области  $D$  обозначается  $\text{Aut } D$ .

Это множество является группой относительно операции композиции и обратным элементом к автоморфизму  $\varphi$  является обратная функция  $\varphi^{-1}$ .

Действительно, если  $\varphi$  является автоморфизмом области  $D$ , то по **теореме 7.4** ее **производная** отлична от нуля всюду в  $D$ . По **лемме 7.2** обратная функция  $\varphi^{-1}$  аналитична в каждой точке из  $D$  и также однолисна. Следовательно,  $\varphi^{-1}$  является автоморфизмом области  $D$ .

Опишем группы автоморфизмов основных областей  $\widehat{\mathbb{C}}$ ,  $\mathbb{C}$  и  $U$  (единичного круга).

**Теорема 7.9.** *Любой автоморфизм каждой из областей  $\widehat{\mathbb{C}}$ ,  $\mathbb{C}$  и  $U$  является дробно-линейным отображением.*

**Доказательство.** Пусть  $\varphi$  — автоморфизм расширенной плоскости  $\widehat{\mathbb{C}}$  и  $\varphi(z_0) = \infty$ . Тогда по **теореме 7.7** единственной **особенностью** функции  $\varphi$  является  $z_0$  — **полюс первого порядка**, а по **теореме 5.10**

$$\varphi(z) = \begin{cases} \frac{a}{z - z_0} + b & \text{при } z_0 \neq \infty, \\ az + b & \text{при } z_0 = \infty, \end{cases}$$

при некоторых  $a, b \in \mathbb{C}$ .



Теперь рассмотрим любой автоморфизм  $\varphi$  плоскости  $\mathbb{C}$ . Доопределим его равенством  $\varphi(\infty) = \infty$ . Тогда оно непрерывно в бесконечности. Действительно, если предположить, что для некоторой последовательности  $z_k \rightarrow \infty$  последовательность  $w_k = \varphi(z_k)$  будет ограниченной, то, выделяя из нее сходящуюся подпоследовательность  $w_{k_i} \rightarrow w_0 \in \mathbb{C}$ , получили бы  $z_{k_i} = \varphi^{-1}(w_{k_i}) \rightarrow \varphi^{-1}(w_0)$ .

Отсюда следует, что функция  $1/\varphi$  аналитична в проколотой окрестности бесконечности и имеет в точке  $\infty$  устранимую особенность.

Такое же рассуждение верно и для обратного отображения. Итак, мы продолжили  $\varphi$  до автоморфизма расширенной плоскости  $\widehat{\mathbb{C}}$ , причем  $\varphi(\infty) = \infty$ . Как уже доказано, тогда оно имеет вид  $\varphi(z) = az + b$ .

Рассмотрим, наконец, любой автоморфизм  $\varphi$  единичного круга  $U$ . Пусть  $\varphi(0) = w_0 \in U$ . Рассмотрим **дробно-линейный автоморфизм единичного круга**

$$\psi(w) = \frac{w - w_0}{1 - \overline{w_0}w},$$

переводящий  $w_0$  в 0. Тогда композиция  $f = \psi \circ \varphi$  является автоморфизмом круга  $U$ , переводящим 0 в 0. Так как  $|f(z)| < 1$  при  $|z| < 1$ , то по **лемме Шварца** будет  $|f(z)| \leq |z|$  в  $U$ .

Повторяя это рассуждение для обратного автоморфизма  $f^{-1}$ , получим неравенство  $|f^{-1}(\zeta)| < |\zeta|$  для всех  $\zeta \in U$ . Беря здесь  $\zeta = f(z)$ , видим, что  $|z| \leq |f(z)|$  при всех  $z \in U$ . Следовательно,  $|z| = |f(z)|$  при  $z \in U$ . В силу случая равенства в **лемме Шварца**  $f(z) = e^{i\theta}z$ .

Таким образом, мы получаем, что

$$\varphi(z) = (\psi^{-1} \circ f)(z) = e^{i\theta}\psi^{-1}(z),$$

а это дробно-линейное отображение. □

Вспоминая п.2.3.6, мы получаем следующие описания всех автоморфизмов основных областей:

$$\text{Aut } \widehat{\mathbb{C}} = \left\{ z \mapsto \frac{az + b}{cz + d} : a, b, c, d \in \mathbb{C}, ad - bc \neq 0 \right\},$$

$$\text{Aut } \mathbb{C} = \{z \mapsto az + b : a, b \in \mathbb{C}, a \neq 0\},$$

$$\text{Aut } U = \left\{ z \mapsto e^{i\theta} \frac{z - z_0}{1 - \overline{z_0}z} : \theta \in \mathbb{R}, z_0 \in U \right\}.$$



## 7.3.2. Теорема Римана

Рассмотрим теперь **конформные** отображения различных **областей**.

**Определение 7.5.** Две области  $D, \Delta \subset \widehat{\mathbb{C}}$  называются **конформно эквивалентными**, если существует функция  $f$ , **аналитическая** и однолистная в  $D$ , со свойством

$$f(D) = \Delta.$$

Точно так же, как на с. 205 (после **определения 7.4**), доказывается, что обратное отображение  $f^{-1}$  к  $f$  в **определении 7.5** также аналитично и однолистно отображает  $\Delta$  на  $D$ . Так что области  $D$  и  $\Delta$  в этом определении действительно равноправны.

Заметим, что расширенная комплексная плоскость  $\widehat{\mathbb{C}}$  **компактна**, поэтому она не может быть гомеоморфна открытым областям  $\mathbb{C}$  и  $U$ . Кроме того,  $\mathbb{C}$  не является конформно эквивалентной единичному кругу, так как иначе существовала бы функция, аналитическая во всей плоскости  $\mathbb{C}$ , по модулю ограниченная единицей. Но такая функция обязана быть тождественной постоянной по **теореме Лиувилля**.

Рассмотрим следующий вопрос — какие области являются конформно эквивалентными единичному кругу  $U$ ? Односвязность области, конечно, необходима для этого (докажите это самостоятельно).

Ответ на поставленный вопрос дает **теорема Римана**, доказываемая ниже: граница односвязной области должна иметь более одной точки. В связи с этим заметим, что у  $\widehat{\mathbb{C}}$  и  $\mathbb{C}$  границы — это соответственно  $\emptyset$  и  $\{\infty\}$ .

**Лемма 7.3.** Любую односвязную область  $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ , граница которой содержит более одной точки можно однолистно отобразить на область внутри единичного круга  $U$ , содержащую  $0$ .

**Доказательство.** Пусть сначала  $D$  имеет внешнюю точку  $z_0$ , т.е. внутренность дополнения  $\widehat{\mathbb{C}} \setminus D$  непуста.

Если  $z_0 = \infty$ , то  $D$  содержится в некотором круге  $D \subset B(0, R)$  и отображение  $z \mapsto z/R$  переведет  $D$  в единичный круг. Если  $z_0 \neq \infty$ , то сначала выполним отображение  $z \mapsto (z - z_0)^{-1}$ , которое переведет  $D$  в область, для которой  $\infty$  является внешней точкой и приходим к первому случаю.

Совершая **автоморфизм** единичного круга из **примера 2.2** добиваемся того, что  $0$  принадлежит образу нашей области.



Меню

Часть I. Теория

Глава 7. Дополнительные главы комплексного анализа

7.3. Конформное отображение областей

7.3.2. Теорема Римана



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Пусть теперь  $D$  не имеет внешних точек. Так как граница  $D$  содержит по крайней мере две точки  $a$  и  $b$ , то функция

$$z \mapsto \frac{z - a}{z - b}$$

переведет  $D$  в область  $D_1$ , не содержащую  $0$  и  $\infty$ . В области  $D_1$  функция  $z \rightarrow \sqrt{z}$  аналитически продолжима по любому пути и по **теореме о монодромии** существует однозначная ветвь этой функции, аналитическая в  $D_1$ , которая переводит  $D_1$  в область  $D_2$  с внешними точками (если  $w \in D_2$ , то  $-w \notin \overline{D_2}$ ). Снова приходим к уже разобранным случаю.  $\square$

**Теорема 7.10 (Римана).** Любая односвязная область  $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ , граница которой содержит более одной точки, конформно эквивалентна единичному кругу  $U$ .

Если  $z_0 \in D$ , то аналитическая и однолистная функция  $f$  со свойством  $f(D) = U$ , удовлетворяющая условиям  $f(z_0) = 0$ ,  $f'(z_0) > 0$ , определяется единственным образом.

**Доказательство.** В силу **леммы 7.3** можно считать, что  $D \subset U$  и  $0 \in D$ . Рассмотрим множество  $\mathcal{A}$  аналитических и однолистных в области  $D$  функций, удовлетворяющих условиям

$$f(D) \subset U, \quad f(0) = 0, \quad f'(0) > 0.$$

Это множество не пусто, так как  $\lambda z \in \mathcal{A}$  при  $\lambda \in (0, 1]$ .

Так как  $B(0, r) \subset D$  при некотором  $r > 0$ , то по **лемме Шварца**  $|f'(0)| \leq 1/r$  для каждой функции  $f \in \mathcal{A}$ , поэтому

$$1 \leq l_0 = \sup\{f'(0) : f \in \mathcal{A}\} < +\infty$$

Возьмем последовательность функций  $\{f_n\} \subset \mathcal{A}$  так, чтобы  $f'_n \rightarrow l_0$ . В силу **теоремы Монделя** из  $\{f_n\}$  можно выделить подпоследовательность, сходящуюся равномерно внутри  $D$  к некоторой функции  $f_0$ , которая аналитична и однолисна в  $D$ , причем  $f_0(0) = 0$ ,  $f'_0(0) = l_0$ , т.е.  $f \in \mathcal{A}$ . Докажем, что эта функция  $f_0$  отображает  $D$  на  $U$ .

Предположим противное, т.е. некоторая точка  $a \in U$  не входит в образ  $f_0(D)$ . Рассмотрим **дробно-линейное отображение**

$$b_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}$$





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

(см. [пример 2.2](#)). Тогда

$$b'_a = \frac{1 - |a|^2}{(1 - \bar{a}z)^2}.$$

Пусть

$$g(z) = e^{-i\lambda} b_{\sqrt[+]{|a|}} \left( \sqrt[+]{e^{i\lambda} b_a(f_0(z))} \right), \quad \lambda = \pi - \arg a.$$

Однозначная ветвь  $z \mapsto \sqrt[+]{e^{i\lambda} b_a(f_0(z))}$  существует по [теореме о монодромии](#) (функция под знаком корня не обращается в нуль).

Легко видеть, что  $g \in \mathcal{A}$  (проверьте это самостоятельно).

Непосредственный подсчет показывает, что

$$\begin{aligned} g'(0) &= b'_{\sqrt[+]{|a|}} \left( \sqrt[+]{e^{i\lambda} b_a(0)} \right) \frac{b'_a(0)}{2 \sqrt[+]{e^{i\lambda} b_a(0)}} f'_0(0) = b'_{\sqrt[+]{|a|}} \left( \sqrt[+]{-ae^{i\lambda}} \right) \frac{1 - |a|^2}{2 \sqrt[+]{ae^{i\lambda}}} f'_0(0) = \\ &= \frac{1 - |a|}{(1 - |a|)^2} \frac{1 - |a|^2}{2 \sqrt[+]{|a|}} f'_0(0) = \frac{1 + |a|}{2 \sqrt[+]{|a|}} f'_0(0) > f'_0(0). \end{aligned}$$

Это противоречит определению  $l_0$  и тому, что  $f'_0(0) = l_0$ .

Докажем единственность. Пусть  $f_1$  и  $f_2$  две функции, удовлетворяющие нашим условиям. Тогда композиция  $h(z) = f_1(f_2^{-1}(z))$  является автоморфизмом круга  $U$ , причем  $h(0) = 0$ . [Поэтому](#)

$$h(z) = e^{i\lambda} \frac{z - 0}{1 - 0z} = e^{i\lambda} z.$$

Отсюда  $f_1(z) = e^{i\lambda} f_2(z)$ , но  $f'_1(0)$  и  $f'_2(0)$  положительны, поэтому  $\lambda = 0$ . □

**Следствие 7.1.** Любые две области  $D, \Delta \subset \widehat{\mathbb{C}}$ , границы которых состоят более чем из одной точки, являются конформно эквивалентными.

**Доказательство.** Если  $f : D \rightarrow U$  и  $g : \Delta \rightarrow U$  — функции, определяемые из теоремы Римана для областей  $D$  и  $\Delta$ , то отображение  $g^{-1} \circ f$  устанавливает конформную эквивалентность  $D$  и  $\Delta$ . □



Меню

Часть I. Теория

Глава 7. Дополнительные главы комплексного анализа

7.4. Конформные отображения многоугольников



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 7.4. Конформные отображения многоугольников

7.4.1. Эллиптические интегралы 1-го рода

7.4.2. Эллиптический синус

7.4.3. Формула Кристоффеля – Шварца



## 7.4.1. Эллиптические интегралы 1-го рода

**Теорема Римана** является теоремой существования — она утверждает лишь, что функция Римана (осуществляющая **аналитическое** и однолистное отображение на единичный круг) существует, но не дает способа для нахождения такой функции.

Поэтому представляет интерес указание явной конструкции для функции Римана в случае хотя бы в случае наиболее просто устроенных **областей**. В этом параграфе мы дадим такую конструкцию для случая многоугольника.

Для  $0 < k < 1$  введем так называемый **эллиптический интеграл первого рода**

$$F(z) = F(z, k) := \int_0^z \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}} \quad (7.4)$$

и рассмотрим отображение верхней полуплоскости  $H$  с его помощью. Для краткости будем обозначать подинтегральную функцию в (7.4)

$$\varphi(z) = \sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}.$$

Мы рассматриваем здесь однозначную ветвь  $\varphi$ , определяемую условием  $\varphi(0) = 1$ , в односвязной области  $D$ , которая получается из  $\mathbb{C}$  выбрасыванием четырех лучей

$$D = \mathbb{C} \setminus \{z : z = \pm 1 - iy, z = \pm 1/k - iy, y \geq 0\}.$$

Интеграл в (7.4) берется по любой спрямляемой жордановой кривой, соединяющей начало координат 0 и  $z$ .

В исключительных точках  $\pm 1, \pm 1/k, \infty$  функцию  $F$  можно доопределить как абсолютно сходящиеся несобственные интегралы. К примеру, при  $z = 1$  положим

$$F(1) = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}} = \lim_{x \rightarrow 1-0} \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}.$$



Сходимость этого интеграла вытекает из оценки

$$|\varphi(z)| \geq c\sqrt{|1-z|} \quad \text{при} \quad |1-z| \leq \delta$$

(с и  $\delta$  — некоторые положительные постоянные). Аналогично определяются  $F(-1)$  и  $F(\pm 1/k)$ . Для определения  $F(\infty)$  как несобственного интеграла

$$F(\infty) = \int_0^{\infty} \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}$$

можно использовать оценку

$$|\varphi(z)| \geq c|z|^2 \quad \text{при} \quad |z| \geq \delta.$$

Определенная таким образом функция  $F$  **аналитична** в полуплоскости  $H$  и непрерывна в  $\bar{H}$ . В самом деле, как **первообразная** аналитической функции она аналитична в  $\bar{H} \setminus \{\pm 1, \pm 1/k\}$ . Непрерывность в исключительных точках  $\pm 1, \pm 1/k$  и  $\infty$  легко вывести из приведенных оценок (проделайте это самостоятельно).

Покажем, что **функция (7.4)** однолистно отображает полуплоскость  $H$  на открытый прямоугольник  $\Delta$  с вершинами в точках

$$-K, \quad K, \quad K + iK', \quad -K + iK' \quad (7.5)$$

где

$$K = F(1, k) = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}, \quad (7.6)$$

$$K' = F\left(\frac{1}{k}, k\right) - F(1, k) = \int_1^{1/k} \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}. \quad (7.7)$$

При  $z \in I_1 = [0, 1]$  **интеграл (7.4)** принимает положительные значения, возрастающие от  $F(0, k)$  до  $F(1, k)$ . Поэтому функция  $w = F(z, k)$  взаимно однозначно и непрерывно отображает на отрезок  $[0, K] \subset \mathbb{C}_w$ .




Рис. 7.5

При переходе через точку  $t = 1$  множитель  $1 - t$  в подкоренном выражении **интеграла (7.4)** меняет знак и на отрезке  $l_2 = [1, 1/k]$  этот интеграл представим в виде

$$F(x, k) = K + i \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{(t^2 - 1)(1 - k^2 t^2)}},$$

причем выбор ветви квадратного корня здесь согласован с выбором ветви корня в **(7.4)** на  $l_1$ . Отсюда ясно, что **интеграл (7.4)** отображает взаимно однозначно и непрерывно  $l_2$  на вертикальный отрезок в  $\mathbb{C}_w$ , соединяющий точки  $K$  и  $K + iK'$ .

При переходе через точку  $t = 1/k$  множитель  $1 - kt$  под корнем в **(7.4)** меняет знак. Легко видеть, что

$$\int_{1/k}^{\infty} \frac{dt}{\sqrt{(t^2 - 1)(1 - k^2 t^2)}} = K.$$

Поэтому, рассуждая аналогично, мы видим, что **интеграл (7.4)** отображает взаимно однозначно и непрерывно луч  $l_3 = [1/k, \infty]$  в отрезок с концами в точках  $K + iK'$  и  $iK'$ .

Наконец, подобные рассуждения показывают, что **(7.4)** отображает взаимно однозначно и непрерывно отрицательную часть действительной прямой на ломаную с вершинами в точках  $iK'$ ,  $-K + iK'$ ,  $-K$  и  $0$ .

Этим показано, что **интеграл (7.4)** взаимно однозначно и непрерывно отображает границу полуплоскости  $H$  на границу прямоугольника с вершинами в **точках (7.5)**.



Отсюда уже можно вывести, что **функция (7.4)** осуществляет однолистное и **конформное** отображение полуплоскости на открытый прямоугольник с **вершинами (7.5)**.

Докажем сначала, что  $\Delta \subset F(H)$ . Если  $w \in \Delta$ , то в силу **интегральной формулы Коши**

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Delta} \frac{d\xi}{\xi - w} = 1.$$

После замены переменной  $\xi = F(\zeta)$  с учетом того, что  $F(\partial H) = \partial\Delta$ , получим

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial H} \frac{F'(\zeta)}{F(\zeta) - w} d\zeta = 1.$$

По **теореме о логарифмическом вычете** функция  $F - w$  имеет простой нуль в некоторой точке  $z \in H$ . Следовательно,  $\Delta \subset F(H)$ .

Для доказательства обратного включения  $F(H) \subset \Delta$  предположим противное — существует точка  $w_0 \notin \Delta$ , для которой  $F(z_0) = w_0$  при некотором  $z_0 \in H$ . Тогда если  $w_0 \notin \bar{\Delta}$ , то

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Delta} \frac{d\xi}{\xi - w} = 0.$$

Отсюда аналогично предыдущему выводим, что  $F - w_0$  не имеет нулей в  $H$ , а это противоречит тому, что  $w_0 \in F(H)$ . Случай  $w_0 \in \partial\Delta$  также невозможен, так как иначе (**поскольку  $f(H)$  — область**)  $B(w_0, r) \subset f(H)$  при некотором  $r > 0$  и  $\mathbb{C} \setminus \bar{\Delta}$  содержит точки из  $F(H)$ , хотя мы уже показали, что это не так. Итак, мы показали, что  $F(H) = \Delta$ .

Отметим, что вывод равенства  $F(H) = \Delta$  из  $F(\partial H) = \partial\Delta$  не использовал какие-то специфические свойства **эллиптического интеграла**. Следовательно, мы доказали следующий общий факт, известный как принцип взаимно однозначного соответствия.

**Теорема 7.11.** Пусть  $D, \Delta \subset \hat{\mathbb{C}}$  — односвязные области, границами которых являются кусочно-гладкие **жордановы кривые**. Пусть еще функция  $f$  **аналитична** в  $D$ , непрерывна вместе со своей **производной** на  $\partial D$  и отображает  $\partial D$  на  $\partial\Delta$  взаимно однозначно с сохранением ориентации. Тогда  $f$  однолистно и **конформно** отображает  $D$  на  $\Delta$ .



Меню

Часть I. Теория

Глава 7. Дополнительные главы комплексного анализа

7.4. Конформные отображения многоугольников

7.4.1. Эллиптические интегралы 1-го рода



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Эта теорема часто используется при построении конкретных однолистных конформных отображений заданных областей.



## 7.4.2. Эллиптический синус

В п. 7.4.1 было показано, что **эллиптический интеграл первого рода**  $z \mapsto F(z, k)$ ,  $0 < k < 1$ , однолистно и **конформно** отображает верхнюю полуплоскость  $H = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$  на прямоугольник  $\Delta$  с вершинами в **точках (7.5)** (см. также (7.6)–(7.7)).

Обратная функция, отображающая прямоугольник  $\Delta$  в  $H$ , называется **эллиптическим синусом** и обозначается  $\operatorname{sn}(k)$ , т.е.  $\operatorname{sn}(k) : \Delta \rightarrow H$ . С помощью принципа симметрии эта функция продолжается как мероморфная двоякопериодическая функция на всю комплексную плоскость.

Вертикальный интервал  $(K, K + iK')$  функция  $\operatorname{sn}(k)$  отображает на интервал  $(1, 1/k)$ . В силу **принципа симметрии Римана–Шварца** область  $\Delta_{+1}$ , симметричную  $\Delta$  относительно интервала  $(K, K + iK')$ , отображается аналитическим продолжением функции  $\operatorname{sn}(k)$  на нижнюю полуплоскость  $H^* = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z < 0\}$ .

Точно так же вертикальный интервал  $(-K, -K + iK')$  функция  $\operatorname{sn}(k)$  отображает на интервал  $(-1, -1/k)$  и в силу принципа симметрии область  $\Delta_{-1}$ , симметричную  $\Delta$  относительно  $(-K, -K + iK')$ , также отображается аналитическим продолжением функции  $\operatorname{sn}(k)$  на нижнюю полуплоскость  $H^* = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z < 0\}$ .

Этот процесс аналитического продолжения с помощью принципа симметрии теперь можно применить и к областям  $\Delta_{\pm 1}$  и так далее. Кроме того, подобный процесс можно применить и к аналитическому продолжению функции  $\operatorname{sn}(k)$  через горизонтальные интервалы  $(-K, K)$  и  $(-K + iK', k + iK')$ . В результате мы получим аналитическое продолжение эллиптического синуса  $\operatorname{sn}(k)$  на всю плоскость. Читателю предлагается самостоятельно проверить следующие свойства этого аналитического продолжения, которое мы также обозначаем  $\operatorname{sn}(k)$ :

- 1)  $\operatorname{sn}(k)$  имеет **простые полюса** в точках вида  $2mK + i(2n + 1)K'$ ,  $n, m \in \mathbb{Z}$ ,
- 2)  $\operatorname{sn}(k)$  имеет простые нули в точках вида  $2mK + 2niK'$ ,  $n, m \in \mathbb{Z}$ ,
- 3)  $\operatorname{sn}(k)$  является периодической и ее периодом является любое число вида  $4mK + 2niK'$ ,  $n, m \in \mathbb{Z}$ .





### 7.4.3. Формула Кристоффеля – Шварца

Пусть  $P \subset \mathbb{C}$  — многоугольник с последовательными вершинами  $A_1, A_2, \dots, A_n$  и углом  $\pi\alpha_k$  при вершине  $A_k$ . По **теореме Римана** существует однолистное **конформное** отображение  $F$  верхней полуплоскости  $H = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im } z > 0\}$  на  $P$ . Можно показать, что такая функция  $F$  задается равенством

$$F(z) = c_1 \int_{z_0}^z (t - a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdot \dots \cdot (t - a_n)^{\alpha_n - 1} dt + c_2,$$

где  $z_0 \in \mathbb{C}$ ,  $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$  — некоторые числа и  $a_k = F^{-1}(A_k)$  — прообразы вершин многоугольника. Эта функция называется **интегралом Кристоффеля – Шварца**. Ясно, что она является обобщением эллиптического интеграла.

Интеграл Кристоффеля – Шварца можно использовать для построения функций, конформно отображающих полуплоскость  $H$  на заданный многоугольник. Это доказывается аналогично тому, как это делалось для **эллиптического интеграла первого рода** в случае прямоугольника.

Выбор начального значения  $z_0$  и ветви подинтегрального выражения не является принципиальным — другой выбор приведет к изменению  $c_1$  и  $c_2$ .



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

# Предметный указатель

а    в    г    з    и    к    л    м    н    о    п    р    с    т  
у    ф    ц    э    я



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## а

автоморфизм

дробно-линейный  
области

аналитическое продолжение  
непосредственное  
элемента



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## В

ВЫЧЕТ

логарифмический  
функции  
бесконечности



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Г

группа

нейтральный элемент

обратный элемент



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

# 3

замыкание множества



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

# И

интеграл

Коши

плотность

Кристоффеля – Шварца

типа Коши

плотность



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## К

класс эквивалентности

компакт

комплексная плоскость

комплексные числа

аргумент

главное значение

действительная часть

мнимая часть

мнимые

модуль

поле

равенство

сложение

сопряженное

умножение

форма

алгебраическая

тригонометрическая

комплексный числа

форма

экспоненциальная

контур

ориентация

положительная

параметризация

меняющая ориентацию

сохраняющая ориентацию

кривая

длина

жорданова

гладкая

замкнутая

концы

кусочно-гладкая

ориентация

ориентированная

замена параметра

параметризация

спрямляемая

криволинейный интеграл

по пути





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

# Л

лемма

Абеля

Гурса

Жордана

Шварца

линейно связное множество

ломаная



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## М

мнимая единица

многосвязная область

ориентированная граница

стандартная

многоугольник

множество

граница

замкнутое

компактное

ограниченное

открытое

связное

модуль непрерывности



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Н

неравенство

Коши

нуль функции

порядок (кратность)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## О

область

граница

компонента связности

жорданова

конформно эквивалентная

многосвязная

односвязная

порядок связности

окрестность точки

проколота

окружность

$\hat{C}$ -окружность

обобщенная

оператор Лапласа

открытое покрытие

отношение

эквивалентности

отображение

дробно-линейное

конформное



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## П

парадокс Бернулли  
первообразная  
полигон  
полная аналитическая функция  
полюс  
    порядок (кратность)  
    простой  
предел функции  
преобразованиями симметрии  
    относительно окружности  
    относительно прямой  
принцип  
    счетной компактности  
приращение аргумента  
    вдоль кривой  
прицип  
    симметрии Римана – Шварца  
производная



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Р

ряд

Лорана

главная часть

на бесконечности

правильная часть

функции

Тейлора

расходящийся

степенной

коэффициенты

круг сходимости

область сходимости

радиус сходимости

центр

сумма

сходящийся

абсолютно

условно

частичная сумма



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## С

### симметрия

зеркальное отражение

инверсия

относительно окружности

относительно прямой

### синус

эллиптический

стереографическая проекция

сфера Римана

сферическая метрика



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Т

### теорема

Арцела–Асколи

Вейерштрасса

Вейерштрасса о единственности

Витали

Жордана

Кантора

Коши

для многосвязной области

интегральная

о вычетах

обобщенная интегральная

Коши–Адамара

Лиувилля

Лорана

Монтеля

Мореры

Пикара

Римана

Руше

Сохоцкого

Тейлора

глобальный критерий непрерывности

двойственности открытых и замкнутых множеств

круговое свойство

о логарифмическом вычете

о монодромии

о трех точках

правила дифференцирования

принцип аргумента

принцип максимума модуля, вторая формулировка

принцип максимума модуля, первая формулировка

принцип сохранения области

свойства криволинейного интеграла

свойства открытых множеств

формула

Коши

Коши–Адамара

Ньютона–Лейбница

Шварца

среднего значения

### точка

граничная

изолированная

особая

изолированная

устраняемая

правильная

предельная

существенно особая





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## У

угловой коэффициент касательной  
уравнения Коши – Римана



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ф

формула

Эйлера

функция

Жуковского

аналитическая

гармоническая

гармонически сопряженная

гиперболическая

ареакосинус

ареасинус

косинус

синус

голоморфная

дифференцируемая

косинус

котангенс

кратность  $w_0$ -точки

логарифмическая

главное значение

мероморфная

многозначная

непрерывность

в точке

на множестве

однозначная

однолистная

в точке

равномерно непрерывная

регулярная

синус

основной период

степенная

тангенс

тригонометрическая

арккосинус

арккотангенс

арксинус

арктангенс

целая 162

трансцендентная

экспоненциальная

основной период



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ц

цепь



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Э

элемент

аналитической функции

канонический

подчинение

эллиптический интеграл

первого рода



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Я

ядро Коши



# Определения

Автоморфизм области  
Аналитическая функция  
Аналитическое продолжение элемента  
Вычет функции на бесконечности  
Вычет функции  
Дифференцируемость  
Дробно-линейное отображение  
Жорданова кривая  
Замкнутое множество  
Замыкание множества  
Интеграл типа Коши  
Компактное множество  
Контур  
Конформно эквивалентные области  
Конформное отображение  
Кривая  
Криволинейный интеграл по пути  
Логарифмическая функция  
Логарифмический вычет  
Множество комплексных чисел  
Непрерывная функция  
Область

Ограниченное множество  
Окрестность точки  
Особенность бесконечно удаленной точки  
Особые точки функции  
Открытое множество  
Первообразная  
Полюс  
Порядок полюса  
Предел функции  
Предельная точка  
Производная  
Равномерно непрерывная функция  
Радиус сходимости  
Ряд Лорана функции  
Ряд Лорана  
Ряд Тейлора  
Связное множество  
Симметричные точки  
Спрямяемая кривая  
Степенная функция  
Степенной ряд  
Существенно особая точка



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Функции гиперболический синус и гиперболический косинус

Функции синус и косинус

Функции тангенс и котангенс

Цепь

Экспоненциальная функция

Элемент аналитической функции



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Автоморфизм области

Пусть  $D \subset \mathbb{C}$  — область. Отображение  $\varphi : D \rightarrow D$  называется *автоморфизмом области*  $G$  если

1)  $\varphi$  аналитична в  $D$ ,

2)  $\varphi$  отображает  $D$  на  $D$  однолистно (взаимно однозначно).

[\[Перейти к основному тексту\]](#)





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Аналитическая функция

Функция  $f$ , определенная в некоторой окрестности точки  $z_0$ , называется *аналитической* в этой точке, если она дифференцируема в некоторой окрестности точки  $z_0$ .

Функция  $f$  называется аналитической в бесконечно удаленной точке  $z_0 = \infty$ , если функция  $f(1/z)$  аналитична в точке  $0$ .

Функция называется аналитической в некоторой области  $G \subset \mathbb{C}$ , если она аналитична в каждой точке этой области. [\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню

Часть I. Теория

Определения

Аналитическое продолжение элемента



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Аналитическое продолжение элемента

Элемент  $\{D_1, f_1\}$  называется (непосредственным) *аналитическим продолжением элемента*  $\{D_0, f_0\}$ , если

1)  $D_0 \cap D_1 \neq \emptyset$ ,

2)  $f_0(z) = f_1(z)$ ,  $z \in D_0 \cap D_1$ .

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Вычет функции на бесконечности

*Вычетом функции  $f$*  в изолированной особой точке  $\infty$  называется число

$$\operatorname{Res}_{\infty} f = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C_r(0))^-} f(z) dz, \quad r > R.$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Вычет функции

*Вычетом функции*  $f$  в изолированной особой точке  $z_0 \in \mathbb{C}$  называется число

$$\operatorname{Res}_{z_0} f = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r(z_0)} f(z) dz, \quad 0 < r < \varepsilon. \quad (0.1)$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Дифференцируемость

Функция  $f$  заданная в некоторой окрестности точки  $z_0 \in \mathbb{C}$  называется  *$\mathbb{C}$ -дифференцируемой*<sup>1</sup> в этой точке, если существует такое комплексное число  $D \in \mathbb{C}$ , что

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = Dh + o(h), \quad h \rightarrow 0. \quad (O.2)$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)

---

<sup>1</sup>Мы используем этот термин для того, чтобы отличить рассматриваемое понятие дифференцируемости от того, которое рассматривается в действительном анализе (на последнее мы будем ссылаться как на  $\mathbb{R}$ -дифференцирование).



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Дробно-линейное отображение

*Дробно-линейными* называются отображения вида

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad \Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0. \quad (0.3)$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Жорданова кривая

Кривая  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  называется *жордановой*, если она имеет взаимно-однозначную параметризацию.

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Замкнутое множество

Множество называется *замкнутым*, если оно содержит все свои предельные точки.

[\[Перейти к основному тексту\]](#)





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Замыкание множества

*Замыканием* множества  $A$  называется множество  $\bar{A} = A \cup A'$ .

*Границей* множества  $A$  в метрическом пространстве называется множество

$$\partial A = \bar{A} \cap \overline{A^c}. \quad (0.4)$$

Точки, принадлежащие границе множества, называются *граничными* точками для него.

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Интеграл типа Коши

Интеграл (3.13) называется *интегралом типа Коши*<sup>2</sup>. Функция  $f$  в (3.13) называется *плотностью интеграла типа Коши*. [\[Перейти к основному тексту\]](#)

---

<sup>2</sup>В отличие от *интеграла Коши*.



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Компактное множество

Множество  $A \subset \mathbb{C}$  называется *компактным* или *компактом*, если из любого открытого покрытия этого множества можно выделить конечное подпокрытие. [\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Контур

Множество  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  называется *контуром* (*замкнутой жордановой кривой*) в  $\mathbb{C}$ , если существует непрерывная взаимнооднозначная функция  $\gamma : C \rightarrow \mathbb{C}$ , для которой  $\gamma(C) = \Gamma$  (здесь  $C = \{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta| = 1\}$  — единичная окружность). [\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Конформно эквивалентные области

Две области  $D, \Delta \subset \widehat{\mathbb{C}}$  называются *конформно эквивалентными*, если существует функция  $f$ , *аналитическая* и однолистная в  $D$ , со свойством

$$f(D) = \Delta.$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Конформное отображение

Непрерывное отображение  $f \in C(G)$  области  $G \subset \mathbb{C}$  называется *конформным* в точке  $z_0 \in G$ , если оно сохраняет углы между кривыми, проходящими через эту точку. [\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Кривая

Множество  $\Gamma \subset \mathbb{C}$  называется *кривой*, если существует непрерывная функция  $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ , для которой

$$\Gamma = \gamma([\alpha, \beta]).$$

Отображение  $\gamma$  называется *параметризацией* кривой.

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню

Часть I. Теория

Определения

Криволинейный интеграл по пути



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Криволинейный интеграл по пути

Число  $I \in \mathbb{C}$  называется пределом интегральных сумм, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall (\Pi, \xi) \quad \lambda_\Pi < \delta \implies |s(\Pi, \xi) - I| < \varepsilon.$$

Если такой предел существует, то он называется *криволинейным интегралом (второго рода) от функции  $f$  вдоль кривой (контура)  $\Gamma$*  и обозначается

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz. \tag{0.5}$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Логарифмическая функция

*Логарифмической* (с основанием  $e$ ) называется многозначная функция

$$\operatorname{Ln} z = \{\ln |z| + i(2\pi k + \arg z) : k \in \mathbb{Z}\} = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z.$$

*Главным значением* логарифма называется

$$\ln z = \ln |z| + i \arg z.$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Логарифмический вычет

*Логарифмическим вычетом* функции  $f$  в изолированной особой точке  $z_0 \in \mathbb{C}$  называется **вычет** ее логарифмической производной  $f'/f$  в этой точке. [\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Множество комплексных чисел

*Множество всех комплексных чисел (комплексная плоскость)*  $\mathbb{C}$  определяется как множество

$$\mathbb{C} := \{z = (x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

всех упорядоченных пар действительных чисел, на котором определены отношение равенства и две операции — сложения и умножения.

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Непрерывная функция

Функция  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $D \subset \mathbb{C}$ , называется *непрерывной* в предельной точке  $z_0 \in D$ , если

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0).$$

В изолированной точке области определения любая функция считается непрерывной.

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Область

Непустое открытое связное множество в  $\mathbb{C}$  называется *областью*.

Область называется *жордановой*, если ее *границей* является *контур*. [\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ограниченное множество

Непустое множество в  $\mathbb{C}$  называется *ограниченным*, если оно содержится в некотором круге.

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Окрестность точки

*Окрестностью точки*  $z \in \mathbb{C}$  называется любое открытое множество, содержащее эту точку. Если  $G \subset X$  — окрестность точки  $x \in X$ , то  $G^\circ = G \setminus \{x\}$  называется *проколотой* окрестностью этой точки. [\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню

Часть I. Теория

Определения

Особенность бесконечно удаленной точки



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Особенность бесконечно удаленной точки

Будем говорить, что бесконечно удаленная точка является правильной, полюсом порядка  $n$  или существенно собой точкой для функции  $f$ , если  $0$  является таковой для функции  $g : z \mapsto f(1/z)$ .

[\[Перейти к основному тексту\]](#)





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Особые точки функции

В первом случае  $z_0$  называют *правильной точкой* для  $f$  (часто используется также термин «*устраняемая особая точка*»). Во втором случае, говорят, что  $z_0$  — *изолированная особая точка*  $f$ .

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Открытое множество

Множество  $A \subset \mathbb{C}$  называется *открытым*, если для любой точки  $z \in A$  существует открытый круг  $B(z, r)$  положительного радиуса  $r > 0$  с центром в этой точке, содержащийся в  $A$ .

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Первообразная

Функция  $F$  называется *первообразной* для функции  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ , если для всех  $z \in D$  справедливо равенство

$$F'(x) = f(z).$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Полюс

Изолированная особая точка  $z_0$  функции  $f$  называется ее *полюсом*, если

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty. \quad (0.6)$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Порядок полюса

Будем говорить, что изолированная особая точка  $z_0 \in \mathbb{C}$  функции  $f$  является ее *полюсом порядка (кратности)  $n \in \mathbb{N}$* , если разложение Лорана для  $f$  имеет вид (5.7).

Полюс кратности  $n = 1$  называется *простым*.

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



## Предел функции

Число  $w_0 \in \mathbb{C}$  называется *пределом функции*  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  в предельной точке  $z_0$  множества  $D \subset \mathbb{C}$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall z \in D \quad (0 < |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - w_0| < \varepsilon).$$

Точка  $\infty \in \widehat{\mathbb{C}}$  является пределом функции  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$

1) в предельной точке  $z_0$  множества  $D \subset \mathbb{C}$ , если

$$\forall A > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall z \in D \quad (0 < |z - z_0| < \delta \implies |f(z)| > A),$$

2) в бесконечно удаленной точке неограниченного множества  $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$ , если

$$\forall A > 0 \quad \exists \Delta > 0 \quad \forall z \in D \quad (|z| > \Delta \implies |f(z)| > A),$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Предельная точка

Точка  $z \in \mathbb{C}$  называется *предельной* для множества  $A \subset \mathbb{C}$ , если в любой проколотой окрестности  $x$  есть точки из  $A$ . [\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Производная

Пусть функция  $f$  задана в окрестности точки  $z_0 \in \mathbb{C}$ . Если существует конечный предел

$$f'(z_0) := \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0},$$

то он называется *производной* функции  $f$  в точке  $z_0$ .

[\[Перейти к основному тексту\]](#)





Меню

Часть I. Теория

Определения

Равномерно непрерывная функция



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Равномерно непрерывная функция

Пусть  $D \subset \mathbb{C}$ . Функция  $f : D \rightarrow \mathbb{C}$  называется *равномерно непрерывной* на  $D$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall z', z'' \in D \quad |z' - z''| < \delta \implies |f(z') - f(z'')| < \varepsilon.$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



## Радиус сходимости

Число  $R \in \mathbb{R}$  называется *радиусом сходимости степенного ряда (0.9)*, если этот ряд сходится при всех  $z$  с  $|z - z_0| < R$  и расходится при всех  $z$  с  $|z - z_0| > R$ .

Круг

$$B(z_0, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}$$

называется *кругом сходимости*.

Если ряд (0.9) сходится только при  $z = z_0$ , то считаем  $R = 0$ , а если (4.4) сходится при любом  $z \in \mathbb{C}$ , то считаем  $R = \infty$ . [\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ряд Лорана функции

Ряд Лорана (0.7), коэффициенты которого вычисляются по формулам (5.2), будем называть *рядом Лорана функции*  $f$  в кольце  $K(z_0, r, R)$ . [\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ряд Лорана

*Рядом Лорана* будем называть ряд вида

$$f(z) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k (z - z_0)^k = \sum_{k=-\infty}^{-1} c_k (z - z_0)^k + \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k. \quad (0.7)$$

Часть **ряда Лорана (0.7)** с отрицательными индексами называется его *главной частью*, а часть с неотрицательными индексами — *правильной* или аналитической. [\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ряд Тейлора

*Рядом Тейлора* функции  $f$  в точке  $z_0$  называется **степенной ряд**

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k. \quad (0.8)$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Связное множество

Множество  $A \subset \mathbb{C}$  называется *связным*, если не существует таких двух открытых множеств  $G_1 \subset \mathbb{C}$  и  $G_2 \subset \mathbb{C}$ , что

$$G_1 \cap G_2 = \emptyset, \quad A \cap G_1 \neq \emptyset, \quad A \cap G_2 \neq \emptyset, \quad A \subset G_1 \cup G_2.$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Симметричные точки

Две точки  $z, z^* \in \mathbb{C}$  называются *симметричными относительно прямой*, если они лежат на одном и том же перпендикуляре к этой прямой на равном расстоянии от нее.

Две точки  $z, z^* \in \mathbb{C}$  называются *симметричными относительно окружности*, если они лежат на одном луче с началом в центре окружности и произведение расстояний от этих точек до центра окружности равно квадрату ее радиуса.

Центр окружности будем считать симметричным бесконечно удаленной точке  $\infty$ .

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Спрямяемая кривая

Если множество  $\{l(\Pi)\}$  ограничено, то жорданова кривая  $\Gamma$  называется *спрямяемой*. В таком случае *длиной кривой* называется число

$$l_\Gamma := \sup_{\Pi} l(\Pi).$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Степенная функция

*Степенной* функцией с показателем  $\mu \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  называется многозначная функция

$$z^\mu = e^{\mu \operatorname{Ln} z} = |z|^\mu e^{i\mu \arg z} e^{2\pi i k \mu}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Степенной ряд

*Степенным рядом* будем называть ряд вида

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k, \quad (0.9)$$

при этом  $c_k$  — *коэффициенты* степенного ряда, а  $z_0$  — его *центр*.

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Существенно особая точка

Изолированная особая точка  $z_0$  функции  $f$  называется *существенно особой точкой* для  $f$ , если в этой точке она не имеет ни конечного, ни бесконечного предела. [\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню

Часть I. Теория

Определения

Функции гиперболический синус и гиперболический косинус



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Функции гиперболический синус и гиперболический косинус

Для  $z \in \mathbb{C}$  положим

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}.$$

Эти функции называются соответственно *гиперболическими синусом* и *гиперболическими косинусом*.

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Функции синус и косинус

Для  $z \in \mathbb{C}$  положим

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}. \quad (O.10)$$

Эти функции называются *синусом* и *косинусом* соответственно.

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Функции тангенс и котангенс

Для  $z \in \mathbb{C}$  положим

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} z &= \frac{\sin z}{\cos z}, & z &\neq \frac{\pi}{2} + \pi k \quad (k \in \mathbb{Z}), \\ \operatorname{ctg} z &= \frac{\cos z}{\sin z}, & z &\neq \pi k \quad (k \in \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Эти функции называются *тангенсом* и *котангенсом* соответственно.

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Цепь

Конечный набор элементов  $\{D_k, f_k\}_{k=0}^n$  называется *цепью*, если каждый элемент  $\{D_k, f_k\}$  является аналитическим продолжением предыдущего элемента  $\{D_{k-1}, f_{k-1}\}$ . [\[Перейти к основному тексту\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Экспоненциальная функция

Для  $z \in \mathbb{C}$  положим<sup>3</sup>

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y),$$

где  $z = x + iy$ .

[\[Перейти к основному тексту\]](#)

---

<sup>3</sup>Иногда мы пишем  $\exp z$  вместо  $e^z$ .





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Элемент аналитической функции

Пара  $\{D, f\}$ , где  $D \subset \widehat{\mathbb{C}}$  — выпуклая область,  $f \in H(D)$  называется *элементом аналитической функции*. Два элемента  $\{D_0, f_0\}$  и  $\{D_1, f_1\}$  называются равными, если  $D_0 = D_1$  и  $f_0(z) \equiv f_1(z)$  в  $D_0$ .

[\[Перейти к основному тексту\]](#)



## Часть II

# Задачи

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Глава 3. Функции комплексного переменного. Предел, непрерывность, дифференцируемость

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Глава 5. Линейная функция

Глава 6. Дробно-линейная функция

Глава 7. Функция Жуковского

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций. Интеграл Кристоффеля – Шварца. Отображение полуплоскости на треугольник.

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Глава 10. Степенные ряды

Глава 11. Ряды Тейлора

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Глава 13. Ряд Лорана

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Глава 15. Вычисление вычетов

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Глава 19. Вычисление интегралов от многозначных функций

Решения и указания

Ответы



Меню

Часть II. Задачи

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 1

# Комплексные числа и действия над ними

- 1.1. Задания для аудиторной работы
- 1.2. Базовые индивидуальные задания
- 1.3. Задания для самостоятельной работы
- 1.4. Задания творческого характера



## 1.1. Задания для аудиторной работы

1. Найти  $z_1 + z_2$ ,  $z_1 - z_2$ ,  $z_1 \cdot z_2$ ,  $z_1/z_2$ ,  $z_1^2 + z_2^2$ , если:

1)  $z_1 = 1 - i$ ,  $z_2 = 1 + i$ ;

[Решение] [Ответ]

2)  $z_1 = 1 + i$ ,  $z_2 = 1 - i$ ;

[Ответ]

3)  $z_1 = 1 - 2i$ ,  $z_2 = 2 + i$ ;

[Ответ]

4)  $z_1 = 1 + i$ ,  $z_2 = i$ ;

[Ответ]

5)  $z_1 = 1 - i$ ,  $z_2 = i$ ;

[Ответ]

6)  $z_1 = 1 - 3i$ ,  $z_2 = 1 + 3i$ .

[Ответ]

2. Найти модуль и главное значение аргумента ( $\arg z \in (-\pi, \pi]$ ) комплексных чисел  $z$ ,  $-z$ ,  $\bar{z}$ ,  $-\bar{z}$ , если:

1)  $z = 1 + i$ ;

[Решение] [Ответ]

2)  $z = 1 + i\sqrt{3}$ ;

[Ответ]

3)  $z = \sqrt{3} + i$ ;

[Ответ]

4)  $z = i$ ;

[Ответ]

5)  $z = 1$ ;

[Ответ]

6)  $z = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$ .

[Ответ]

3. Представить комплексное число  $z$  в тригонометрической и показательной форме и найти  $z^6$ , если:

1)  $z = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$ ;

[Решение] [Ответ]

2)  $z = 1 - i\sqrt{3}$ ;

[Ответ]



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

3)  $z = \sqrt{3} + i;$  [Ответ]

4)  $z = -1 + i;$  [Ответ]

5)  $z = -i;$  [Ответ]

6)  $z = i.$  [Ответ]

4. Найти все значения следующих корней и указать их расположение на комплексной плоскости:

1)  $\sqrt[4]{1};$  [Решение] [Ответ]

2)  $\sqrt[3]{-i};$  [Ответ]

3)  $\sqrt[3]{-1};$  [Ответ]

4)  $\sqrt[4]{-1};$  [Ответ]

5)  $\sqrt[3]{8i};$  [Ответ]

6)  $\sqrt{1 + i\sqrt{3}}.$  [Ответ]

5. Решить уравнение:

1)  $z^2 + |z| = 0;$  [Решение] [Ответ]

2)  $|z| + z = 2\bar{z} + 1 + 9i;$  [Ответ]

3)  $iz + 2\bar{z} = i;$  [Ответ]

4)  $z\bar{z} = 3 + i + z;$  [Ответ]

5)  $|z| - iz = 2 + i;$  [Ответ]

6)  $z\bar{z} = -|z|^2.$  [Ответ]



6. Изобразить на комплексной плоскости множества, если:

1)  $\{z : 0 < \operatorname{Re}(iz) < 1\}$ ;

2)  $\{z : 0 < \operatorname{Im}(iz) < 1\}$ ;

3)  $\left\{z : 0 < \arg z < \frac{\pi}{4}\right\}$ ;

4)  $\{z : 1 < |z - i| < 2\}$ ;

5)  $\{z : |z - 1| = |z + i|\}$ ;

6)  $\{z : |z + i| = 1\}$ .

[Решение]

7. Какие кривые задаются следующими параметрическими уравнениями?

1)  $z = i + e^{it}$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ ;

2)  $z = 1 - it$ ,  $t \in [0, 1]$ ;

3)  $z = t + 2ti$ ,  $t \in [0, 4]$ ;

4)  $z = t + \frac{1}{t}i$ ,  $t \in (0, +\infty)$ ;

5)  $z = t + it^2$ ,  $t \in \mathbb{R}$ ;

6)  $z = e^{it}$ ,  $t \in [0, \pi]$ .

[Решение] [Ответ]

[Ответ]

[Ответ]

[Ответ]

[Ответ]

[Ответ]



## 1.2. Базовые индивидуальные задания

8. Найти  $z_1 + z_2$ ,  $z_1 - z_2$ ,  $z_1 \cdot z_2$ ,  $z_1/z_2$ ,  $z_1^2 + z_2^2$ , если:

1)  $z_1 = 1 + 2i$ ,  $z_2 = 1 - i$ ;

2)  $z_1 = 1 - 2i$ ,  $z_2 = 2 - i$ ;

3)  $z_1 = 2 - i$ ,  $z_2 = i$ ;

4)  $z_1 = 2 + i$ ,  $z_2 = 1 + i$ ;

5)  $z_1 = i$ ,  $z_2 = 2 + 3i$ ;

6)  $z_1 = -2i$ ,  $z_2 = 1 + 2i$ ;

7)  $z_1 = 1 - i$ ,  $z_2 = 3 - i$ ;

8)  $z_1 = -1 - i$ ,  $z_2 = 1 - 2i$ ;

9)  $z_1 = 4 + 5i$ ,  $z_2 = 4 - 5i$ ;

10)  $z_1 = 2 - 3i$ ,  $z_2 = 3 + 2i$ ;

11)  $z_1 = 2 + i$ ,  $z_2 = 2 - i$ ;

12)  $z_1 = -i$ ,  $z_2 = -1 - i$ ;

13)  $z_1 = 1$ ,  $z_2 = 1 - i$ ;

14)  $z_1 = 4 - i$ ,  $z_2 = 1 + 4i$ ;

15)  $z_1 = 3 + i$ ,  $z_2 = 3 - i$ ;

16)  $z_1 = 1 - 7i$ ,  $z_2 = 7 - i$ ;

17)  $z_1 = 8 - i$ ,  $z_2 = i$ ;





$$18) z_1 = 1 - 8i, z_2 = 2 + 16i;$$

$$19) z_1 = 1 + i, z_2 = 1 + 2i;$$

$$20) z_1 = 1 - i, z_2 = 2 + i.$$

9. Для комплексного числа  $z = x + iy$  найти модуль и главное значение аргумента ( $\arg z \in (-\pi, \pi]$ ), если:

$$1) z = \sqrt{3} + i;$$

$$2) z = -\sqrt{3} - i;$$

$$3) z = \sqrt{3} - i;$$

$$4) z = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$5) z = 3 + 4i;$$

$$6) z = 3 - 4i;$$

$$7) z = -3 + 4i;$$

$$8) z = \sqrt{2} - \sqrt{2}i;$$

$$9) z = -1;$$

$$10) z = -i;$$

$$11) z = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$12) z = 1 + i\sqrt{3};$$

$$13) z = 1 - i\sqrt{3};$$

$$14) z = i;$$

$$15) z = 1 - 2i;$$



$$16) z = 2 + i;$$

$$17) z = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$18) z = 1 + 5i;$$

$$19) z = -2 + +2i;$$

$$20) z = -\sqrt{3} + i.$$

10. Представить комплексное число  $z = x + iy$  в тригонометрической и показательной форме и найти  $z^n$ , если:

$$1) z = \sqrt{2} - i\sqrt{2}, n = 8;$$

$$2) z = \frac{1}{2} + i\frac{1}{2}, n = 4;$$

$$3) z = 2 - 2\sqrt{3}i, n = 3;$$

$$4) z = -2\sqrt{3} + 2i, n = 6;$$

$$5) z = -1, n = 10;$$

$$6) z = i, n = 4;$$

$$7) z = -\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}, n = 6;$$

$$8) z = \sqrt{3} - 3i, n = 3;$$

$$9) z = 3 - \sqrt{3}i, n = 6;$$

$$10) z = \sqrt{5} - i\sqrt{5}, n = 4;$$

$$11) z = \sqrt{3} + 3i, n = 6;$$

$$12) z = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, n = 9;$$



$$13) z = 1 - i, n = 4;$$

$$14) z = 3 - 3i, n = 8;$$

$$15) z = 3 + 3i, n = 4;$$

$$16) z = 1 - i\sqrt{3}, n = 3;$$

$$17) z = \sqrt{3} + i\sqrt{3}, n = 4;$$

$$18) z = \sqrt{2} - i\sqrt{2}, n = 10;$$

$$19) z = -1 - i\sqrt{3}, n = 6;$$

$$20) z = 1 + i\sqrt{3}, n = 9.$$

11. Найти все значения  $\sqrt[n]{z}$  и указать их расположение на комплексной плоскости, если:

$$1) z = i, n = 5;$$

$$2) z = -1, n = 8;$$

$$3) z = 1, n = 4;$$

$$4) z = 1 - i, n = 6;$$

$$5) z = 1 + i\sqrt{3}, n = 4;$$

$$6) z = 3 + i\sqrt{3}, n = 8;$$

$$7) z = 3 - i\sqrt{3}, n = 2;$$

$$8) z = -i, n = 5;$$

$$9) z = 1 + i, n = 4;$$

$$10) z = -1 - i, n = 6;$$

$$11) z = \sqrt{2} + i\sqrt{2}, n = 3;$$



$$12) z = \sqrt{2} - i\sqrt{2}, n = 5;$$

$$13) z = \sqrt{3} + 3i, n = 6;$$

$$14) z = -\sqrt{3} + i, n = 5;$$

$$15) z = -1 + i, n = 6;$$

$$16) z = -\sqrt{3} - 3i, n = 4;$$

$$17) z = -8, n = 3;$$

$$18) z = 27i, n = 3;$$

$$19) z = \sqrt{3} - \sqrt{3}i, n = 6;$$

$$20) z = \sqrt{2} - \sqrt{2}i, n = 4.$$

12. Изобразите на комплексной плоскости следующие множества точек:

$$1) \{z : 2 < |z - i| < 4\};$$

$$2) \{z : 1 < |z| < 2\};$$

$$3) \left\{z : 0 < \arg(z - i) < \frac{\pi}{4}\right\};$$

$$4) \{z : 0 < \operatorname{Re}(i\bar{z}) < 1\};$$

$$5) \{z : |\bar{z} - i| > 1\};$$

$$6) \{z : |z - i| = |z + i|\};$$

$$7) \left\{z : \arg z = \frac{\pi}{4}\right\};$$

$$8) \left\{z : \frac{\pi}{4} < \arg z < \frac{\pi}{2}\right\};$$

$$9) \{z : z \cdot \bar{z} = 4\};$$



$$10) \{z : (z - i)\overline{(z - i)} = 16\};$$

$$11) \{z : \operatorname{Re} z + \operatorname{Im} z > 1\};$$

$$12) \{z : 2 \operatorname{Re} z + \operatorname{Im} \bar{z} = 1\};$$

$$13) \{z : |z + 1| = |z - 1|\};$$

$$14) \{z : 1 < \operatorname{Im} \bar{z} < 4\};$$

$$15) \{z : \operatorname{Im} z + \operatorname{Re}(z + i) < 3\};$$

$$16) \{z : \operatorname{Im}(z + i) + \operatorname{Re}(z + 1) = 1\};$$

$$17) \left\{z : 0 < \arg(z - i) < \frac{\pi}{2}\right\};$$

$$18) \{z : \operatorname{Re} z < \operatorname{Im} \bar{z}\};$$

$$19) \{z : \operatorname{Re} z = \operatorname{Im} z\};$$

$$20) \{z : |z + 1| = |z - i|\}.$$

13. Какие кривые задаются следующими параметрическими уравнениями? Изобразите их на комплексной плоскости.

$$1) z = 1 + 2e^{it}, t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right];$$

$$2) z = i + e^{it}, t \in [0, \pi];$$

$$3) z = t + i, t \in [0, 1];$$

$$4) z = (1 - t) + ti, t \in [-1, 1];$$

$$5) z = t^2 + ti, t \in [0, 1];$$

$$6) z = t + i\sqrt{t}, t \in [0, 4];$$

$$7) z = 2 + (1 - t)i, t \in [0, 1];$$



$$8) z = 2 + 2ti, t \in [0, 5];$$

$$9) z = \frac{1}{t} + ti, t \in (0, +\infty);$$

$$10) z = 2(e^{it} + e^{-it}), t \in [0, \pi];$$

$$11) z = e^t \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right), t \in \mathbb{R};$$

$$12) z = t + 4t^2i, t \in [0, 2];$$

$$13) z = 4(1 + e^{it})^{-2}, t \in [-\pi, \pi];$$

$$14) z = 2e^{it} + e^{-it}, t \in [0, \pi];$$

$$15) z = e^{it} + 2e^{-it}, t \in [0, \pi];$$

$$16) z = -1 + e^{it}, t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right];$$

$$17) z = t + it^3, t \in [0, 1];$$

$$18) z = t^3 + it, t \in [0, 1];$$

$$19) z = t + i \ln t, t \in [0, e];$$

$$20) z = t + ie^t, t \in [0, 1].$$



## 1.3. Задания для самостоятельной работы

14. Решите уравнение:

1)  $iz^2 + 2z + 4 = 0$ ;

2)  $z^4 + iz^2 + 2 = 0$ ;

3)  $(1 + i)z^2 - iz + 2 + 3i = 0$ ;

4)  $z^6 + iz^3 - i = 0$ ;

5)  $|z| \cdot z + \bar{z} + 1 + i = 0$ ;

6)  $\operatorname{Re} \bar{z} + 2 \operatorname{Im} z + 3z + 1 - i = 0$ ;

7)  $|z + 2i| + z = 4$ ;

8)  $|z + i| = |z - i|$ ;

9)  $(1 + i)^n = (1 - i)^n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ;

10)  $z^6 - 3z^3 - 4 = 0$ .

15. Пользуясь формулой Муавра, выразить  $\sin kx$ ,  $\cos kx$  через степени  $\sin x$ ,  $\cos x$ , если:

1)  $k = 3$ ;

2)  $k = 4$ ;

3)  $k = 5$ ;

4)  $k = 6$ ;

5)  $k = 7$ .



16. Пользуясь формулой Муавра, выразить  $\sin^k x$ ,  $\cos^k x$  через тригонометрические функции кратных углов, если:

1)  $k = 3$ ;

2)  $k = 4$ ;

3)  $k = 5$ ;

4)  $k = 6$ ;

5)  $k = 7$ .

17. Найти суммы:

1)  $\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx$ ;

2)  $\cos x + \cos 2x + \dots + \cos nx$ ;

3)  $\sin x + \sin 3x + \dots + \sin(2n - 1)x$ ;

4)  $\cos x + \cos 3x + \dots + \cos(2n - 1)x$ ;

5)  $\sin x - \sin 2x + \dots + (-1)^n \sin nx$ ;

6)  $\sin x + \sin(x + y) + \dots + \sin(x + ny)$ ;

7)  $\cos x + \cos(x + y) + \dots + \cos(x + ny)$ .

18. Изобразить на комплексной плоскости множества точек:

1)  $\{z : |z| = \operatorname{Re} z + 1\}$ ;

2)  $\{z : |2z| > |1 + z^2|\}$ ;

3)  $\{z : |z| < \arg z, 0 \leq \arg z < 2\pi\}$ ;

4)  $\{z : |z| < \arg z, 0 < \arg z \leq 2\pi\}$ ;





$$5) \{z : |z|^2 - \operatorname{Im} z \leq 0\};$$

$$6) \{z : |z|^2 + \operatorname{Im} z = 4\};$$

$$7) \left\{ z : \operatorname{Im} \frac{z-1}{z-2} = 0, \operatorname{Re} \frac{z-1}{z-2} = 0 \right\}.$$

19. С помощью геометрических построений доказать следующие соотношения:

$$1) \left| |z_1| - |z_2| \right| \leq |z_1 - z_2|;$$

$$2) \left| \frac{z}{|z|} - 1 \right| \leq |\arg z|;$$

$$3) |z - 1| \leq \left| |z| - 1 \right| + |z| \cdot |\arg z|;$$

$$4) |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2);$$

$$5) |1 - \bar{z}_1 z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 = (1 - |z_1|^2)(1 - |z_2|^2);$$

$$6) \frac{1}{2}(|z_1| + |z_2|) \left| \frac{z_1}{|z_1|} + \frac{z_2}{|z_2|} \right| \leq |z_1 + z_2|.$$



## 1.4. Задания творческого характера

20. Вычислить сумму

$$1 + C_n^1 \cos x + C_n^2 \cos 2x + \dots + C_n^n \cos nx.$$

21. Доказать, что число

$$p = (n^2 + 1)(m^2 + 1)(l^2 + 1), \quad n, m, l \in \mathbb{Z},$$

можно представить в виде суммы двух точных квадратов.

22. Доказать, что

$$\arg z = 2 \arctg \frac{b}{a + |z|},$$

если  $z = a + ib \notin (-\infty, 0]$ .

23. Существуют ли два неравных комплексных числа, каждое из которых равно кубу другого? Сколько таких пар чисел имеется?

24. Студент Петров рассуждает. «Очевидно, что

$$i^{21} = (i^4)^{\frac{21}{4}} = 1^{\frac{21}{4}} = 1.$$

С другой стороны

$$i^{21} = (i^4)^5 \cdot i = 1^5 \cdot i = i.$$

Следовательно  $i = 1$ ». В чем его ошибка?

25. Доказать, что для любых  $a, b, c \in \mathbb{R}$

$$\left| \sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{a^2 + c^2} \right| \leq |b - c|.$$



26. Задача Эйлера. Известно, что в каждом параллелограмме сумма квадратов его диагоналей равна сумме квадратов всех его сторон. Насколько отличаются те же суммы в случае произвольного четырехугольника. Доказать, что справедливо следующее утверждение (теорема Эйлера о четырехугольнике). Сумма квадратов сторон любого четырехугольника больше суммы квадратов его диагоналей на учетверенный квадрат отрезка, соединяющего середины диагоналей.
27. Пусть  $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ . Каков геометрический смысл равенства

$$\operatorname{Im} \frac{z_1 - z_2}{z_1 - z_3} = 0?$$

28. Доказать теорему Птолемея. В каждом вписанном в окружность выпуклом четырехугольнике сумма произведений противоположных сторон равна произведению его диагоналей.



Меню

Часть II. Задачи

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 2

# Элементарные трансцендентные функции

- 2.0. Некоторые предварительные сведения
- 2.1. Задания для аудиторной работы
- 2.2. Базовые индивидуальные задания
- 2.3. Задания для самостоятельной работы
- 2.4. Задания творческого характера



## 2.0. Некоторые предварительные сведения

1. Показательная функция  $w = e^z$  определяется следующим образом:

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y), \quad z = x + iy \in \mathbb{C}.$$

В частности, если  $z = iy$ ,  $y \in \mathbb{R}$ , то справедливы формулы Эйлера:

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y, \quad e^{-iy} = \cos y - i \sin y.$$

Показательная функция  $w = e^z$  обладает следующими свойствами:

а)  $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$ , где  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ ;

б)  $e^{z+2k\pi i} = e^z$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ), т.е.  $e^z$  является периодической функцией с периодом  $2\pi i$ .

2. Логарифмическая функция  $w = \operatorname{Ln} z$ ,  $z \neq 0$ , определяется как функция, обратная показательной, причем при  $z \in \mathbb{C}$ ,  $z \neq 0$

$$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Функция  $\operatorname{Ln} z$  является многозначной.

Функция  $\ln z = \ln |z| + i \arg z$  называется главным значением логарифма.

Справедливы следующие соотношения:

$$\operatorname{Ln}(z_1, z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2, \quad \operatorname{Ln} \left( \frac{z_1}{z_2} \right) = \operatorname{Ln} z_1 - \operatorname{Ln} z_2.$$

3. Общая степенная функция  $w = z^a$ ,  $a = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$ , определяется равенством

$$z^a = e^{a \operatorname{Ln} z}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Функция  $z^a$ ,  $z \in \mathbb{C}$  является, вообще говоря, многозначной. Ее главное значение есть

$$z^a = e^{a \ln z}.$$



4. Общая показательная функция  $w = a^z$ ,  $a > 0$  определяется равенством

$$a^z = e^{z \operatorname{Ln} a}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Эта функция также является многозначной и ее значение

$$a^z = e^{z \operatorname{Ln} a}.$$

5. Тригонометрические функции  $\cos z$ ,  $\sin z$ ,  $\operatorname{tg} z$ ,  $\operatorname{ctg} z$  определяются следующими равенствами:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \operatorname{tg} z = \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \operatorname{ctg} z = \frac{\cos z}{\sin z}.$$

Имеют место следующие формулы Эйлера:

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z, \quad e^{-iz} = \cos z - i \sin z, \quad z \in \mathbb{C}.$$

6. Гиперболические функции  $\operatorname{sh} z$ ,  $\operatorname{ch} z$ ,  $\operatorname{th} z$ ,  $\operatorname{cth} z$  определяются равенствами

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{th} z = \frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z}, \quad \operatorname{cth} z = \frac{\operatorname{ch} z}{\operatorname{sh} z}.$$

Тригонометрические и гиперболические функции связаны между собой следующими отношениями:

$$\begin{aligned} \sin z &= -i \operatorname{sh} iz, & \operatorname{sh} z &= -i \sin iz, & \cos z &= \operatorname{ch} iz, & \operatorname{ch} z &= \cos iz, \\ \operatorname{tg} z &= -i \operatorname{th} iz, & \operatorname{th} z &= -i \operatorname{tg} iz, & \operatorname{ctg} z &= i \operatorname{cth} iz, & \operatorname{cth} z &= i \operatorname{ctg} iz. \end{aligned}$$

7. Обратные тригонометрические функции  $\operatorname{Arcsin} z$ ,  $\operatorname{Arccos} z$ ,  $\operatorname{Arctg} z$ ,  $\operatorname{Arcctg} z$  определяются, как функции, обратные соответственно к функциям  $\sin w$ ,  $\cos w$ ,  $\operatorname{tg} w$ ,  $\operatorname{ctg} w$ .

Например, если  $z = \sin w$ , то  $w$  называется арксинусом числа  $z$  и обозначается  $w = \operatorname{Arcsin} z$ .

Все эти функции являются многозначными и выражаются через логарифмические функции

$$\begin{aligned} \operatorname{Arcsin} z &= -i \operatorname{Ln} (iz + \sqrt{1 - z^2}), & \operatorname{Arccos} z &= -i \operatorname{Ln} (z + \sqrt{z^2 - 1}), \\ \operatorname{Arctg} z &= -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{1 + iz}{1 - iz}, & \operatorname{Arcctg} z &= -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{z + i}{z - i}. \end{aligned}$$

Главные значения обратных тригонометрических функций  $\operatorname{arcsin} z$ ,  $\operatorname{arccos} z$ ,  $\operatorname{arctg} z$ ,  $\operatorname{arcctg} z$  получают, если брать главные значения, соответствующих логарифмических функций.



## 2.1. Задания для аудиторной работы

29. Вычислить числа и изобразить на комплексной плоскости:

1)  $\operatorname{Ln}(-1), i^i$ ;

[Решение] [Ответ]

2)  $\operatorname{Ln} i, (1 - i)^i$ ;

[Ответ]

3)  $\operatorname{Ln}(1 + i), (-1)^i$ ;

[Ответ]

4)  $\operatorname{Ln}(1 - i), 1^{-i}$ ;

[Ответ]

5)  $\operatorname{Ln}(1 + i\sqrt{3}), (1 + i)^i$ ;

[Ответ]

6)  $\operatorname{Ln}(-i), (i)^{1+i}$ .

[Ответ]

30. Найти  $\operatorname{Re} f(z)$  и  $\operatorname{Im} f(z)$  функции  $w = f(z)$  (в случае, если  $f(z)$  многозначна, считать, что  $f(z)$  — ее главная ветвь), если:

1) а)  $w = iz^2$ , б)  $w = \operatorname{ch} iz$ , в)  $w = z^i$ ;

[Решение] [Ответ]

2) а)  $w = \frac{z+i}{z-i}$ , б)  $w = \operatorname{sh} z$ , в)  $w = i^z$ ;

[Ответ]

3) а)  $w = (iz)^2 - 2\bar{z}$ , б)  $w = \cos iz$ , в)  $w = (-1)^z$ ;

[Ответ]

4) а)  $w = \frac{1}{z} + z$ , б)  $w = \sin iz$ , в)  $w = (1 + i)^z$ ;

[Ответ]

5) а)  $w = z \cdot \bar{z} + iz$ , б)  $w = \operatorname{sh} iz$ , в)  $w = (1 - i)^z$ ;

[Ответ]

6) а)  $w = \frac{z}{z+1}$ , б)  $w = \cos z$ , в)  $w = z(1 + i)$ .

[Ответ]



31. Доказать следующие равенства:

$$1) \operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln} \left( z + \sqrt{z^2 - 1} \right);$$

[Решение]

$$2) \sin^2 z + \cos^2 z = 1;$$

[Решение]

$$3) \operatorname{tg} iz = i \operatorname{th} z;$$

[Решение]

$$4) \operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = 1;$$

$$5) \operatorname{Arctg} z = \frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{i+z}{i-z};$$

$$6) \operatorname{Arth} z = \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \frac{1+z}{1-z}.$$

32. Найти все значения функций:

$$1) \operatorname{Arcsin} i;$$

[Решение] [Ответ]

$$2) \operatorname{Arccos} i;$$

[Ответ]

$$3) \operatorname{Arccos} 2;$$

[Ответ]

$$4) \operatorname{Arth} i;$$

[Ответ]

$$5) \operatorname{Arch} 2i;$$

[Ответ]

$$6) \operatorname{Arcsin} \frac{1}{2}.$$

[Ответ]

33. Решить уравнения:

$$1) \cos z = 2;$$

[Решение] [Ответ]

$$2) \sin z + \cos z = 2;$$

[Ответ]

$$3) \operatorname{ch} z - \operatorname{sh} z = 1;$$

[Ответ]

$$4) \operatorname{sh} z - \operatorname{ch} z = 2i;$$

[Ответ]





Меню

Часть II. Задачи

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

2.1. Задания для аудиторной работы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

5)  $\operatorname{th} z = i$ ;

[[Ответ](#)]

6)  $\sin z - \cos z = 3$ ;

[[Ответ](#)]

7)  $\sin z - \cos z = i$ ;

[[Ответ](#)]

8)  $\operatorname{sh} z + \operatorname{ch} z = i$ ;

[[Ответ](#)]



## 2.2. Базовые индивидуальные задания

34. Найти все значения функций:

1)  $\operatorname{Ln}(-4)$ ,  $(1 - i\sqrt{3})^i$ ;

2)  $\operatorname{Ln}(1 - i\sqrt{3})$ ,  $i^{1-i}$ ;

3)  $\operatorname{Ln}(2 - 3i)$ ,  $(-1)^{1-i}$ ;

4)  $\operatorname{Ln} 2$ ,  $(1 + i\sqrt{3})^i$ ;

5)  $\operatorname{Ln}(\sqrt{3} + i)$ ,  $(-i)^{-i}$ ;

6)  $\operatorname{Ln}(ie)$ ,  $(-i)^i$ ;

7)  $\operatorname{Ln}(-1 - i)$ ,  $(1 + i)^{1+i}$ ;

8)  $\operatorname{Ln} \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ ,  $(1 + i\sqrt{3})^{-i}$ ;

9)  $\operatorname{Ln}(-e)$ ,  $(1 - i)^{1+i}$ ;

10)  $\operatorname{Ln}(\sqrt{3} - i)$ ,  $(1 + i)^{1-i}$ ;

11)  $\operatorname{Ln}(-2i)$ ,  $i^{3i}$ ;

12)  $\operatorname{Ln}(-1 - i\sqrt{3})$ ,  $(-i)^{1+i}$ ;

13)  $\operatorname{Ln}(-2 + 3i)$ ,  $(2i)^{1-i}$ ;

14)  $\operatorname{Ln}(-1 - i)$ ,  $(1 - i)^{1-i}$ ;

15)  $\operatorname{Ln}(3 + 4i)$ ,  $(-1)^{1+i}$ ;

16)  $\operatorname{Ln}(-ie)$ ,  $(1 - i\sqrt{3})^i$ ;



$$17) z = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$18) \operatorname{Ln} \frac{1-i}{\sqrt{2}}, (-1)^{1+i};$$

$$19) \operatorname{Ln} 4, 1^{1+i};$$

$$20) \operatorname{Ln}(-\sqrt{3} + i), (-i)^{2+i}.$$

35. Найти  $\operatorname{Re} f(z)$  и  $\operatorname{Im} f(z)$  функции  $w = f(z)$  (в случае, если  $f(z)$  многозначна, считать, что  $f(z)$  — ее главная ветвь), если:

1) а)  $w = z^2 + 2z$ , б)  $w = \sin z$ , в)  $w = z^{-i}$ ;

2) а)  $w = \frac{z-i}{z+i}$ , б)  $w = \cos(-iz)$ , в)  $w = (-i)^z$ ;

3) а)  $w = z^3 + iz$ , б)  $w = \operatorname{ch} z$ , в)  $w = (-1)^{-z}$ ;

4) а)  $w = \frac{2z+i}{\bar{z}-2i}$ , б)  $w = \operatorname{ch}(iz)$ , в)  $w = (1+i)^{-iz}$ ;

5) а)  $w = z \operatorname{Im} z - z^2$ , б)  $w = \operatorname{th} z$ , в)  $w = (1-i)^{-z}$ ;

6) а)  $w = z^2 + 2z + 1$ , б)  $w = \operatorname{Ln}(iz)$ , в)  $w = (1+i)^z$ ;

7) а)  $w = \frac{1-z}{i+z}$ , б)  $w = \sin(-iz)$ , в)  $w = (-z)^{1+i}$ ;

8) а)  $w = \bar{z}^2 - z \operatorname{Re} z$ , б)  $w = \operatorname{ch}(-z)$ , в)  $w = (-z)^i$ ;

9) а)  $w = z \operatorname{Re} z^2 - \bar{z}^2$ , б)  $w = \sin(-z)$ , в)  $w = z^{1+i}$ ;

10) а)  $w = (z+i)^2 \cdot \operatorname{Im} z$ , б)  $w = \operatorname{ch}(-iz)$ , в)  $w = z^{1-i}$ ;

11) а)  $w = \frac{1-z}{1+iz}$ , б)  $w = \operatorname{sh}(-iz)$ , в)  $w = z^{-1-i}$ ;



$$12) \text{ а) } w = \frac{z-i}{1-iz} + z \operatorname{Im} \bar{z}, \text{ б) } w = \cos(-z), \text{ в) } w = \operatorname{Ln}(iz);$$

$$13) \text{ а) } w = z + \frac{1}{z} + \bar{z}^2, \text{ б) } w = \operatorname{Ln}(-z), \text{ в) } w = z^{2+3i};$$

$$14) \text{ а) } w = (z+i)^2, \text{ б) } w = \operatorname{Ln}(-iz), \text{ в) } w = 2^z;$$

$$15) \text{ а) } w = (z-i)^3, \text{ б) } w = \operatorname{Ln}((1+i)z), \text{ в) } w = e^{-z};$$

$$16) \text{ а) } w = \frac{z-i}{i+\bar{z}}, \text{ б) } w = \operatorname{Ln}(-z), \text{ в) } w = e^z;$$

$$17) \text{ а) } w = \bar{z}^2 + \operatorname{Im} z, \text{ б) } w = i \sin z + \cos z, \text{ в) } w = \arg z;$$

$$18) \text{ а) } w = \overline{2z + z^2}, \text{ б) } w = \operatorname{ch} z + \operatorname{sh} z, \text{ в) } w = (-1-i)^z;$$

$$19) \text{ а) } w = z \cdot \bar{z} + \bar{z}^2, \text{ б) } w = \operatorname{ch} z - \operatorname{sh} z, \text{ в) } w = (-1+i)^z;$$

$$20) \text{ а) } w = \frac{2z-i}{iz-2}, \text{ б) } w = \cos z - i \sin z, \text{ в) } w = \arg iz.$$

36. Доказать равенства:

$$1) \operatorname{Arsh} z = \operatorname{Ln} \left( z + \sqrt{z^2 + 1} \right);$$

$$2) \operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln} i \left( z + \sqrt{z^2 - 1} \right);$$

$$3) \cos 2z = \cos^2 z - \sin^2 z;$$

$$4) \sin iz = i \operatorname{sh} z;$$

$$5) \cos iz = \operatorname{ch} z;$$

$$6) \operatorname{Arcctg} z = \frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{z-i}{z+i};$$

$$7) \operatorname{Arch} z = \operatorname{Ln} \left( z + \sqrt{z^2 - 1} \right);$$



$$8) \operatorname{sh}(z_1 + z_2) = \operatorname{sh} z_1 \operatorname{ch} z_2 + \operatorname{ch} z_1 \operatorname{sh} z_2;$$

$$9) \sin z = \cos \left( \frac{\pi}{2} - z \right);$$

$$10) \operatorname{Arcth} z = \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \frac{z+1}{z-1};$$

$$11) \operatorname{Arsh} z = \operatorname{Ln} \left( z + \sqrt{z^2 + 1} \right);$$

$$12) \operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln} i \left( z + \sqrt{z^2 - 1} \right);$$

$$13) \cos 2z = \cos^2 z - \sin^2 z;$$

$$14) \sin iz = i \operatorname{sh} z;$$

$$15) \cos iz = \operatorname{ch} z;$$

$$16) \operatorname{Arcctg} z = \frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{z-i}{z+i};$$

$$17) \operatorname{Arch} z = \operatorname{Ln} \left( z + \sqrt{z^2 - 1} \right);$$

$$18) \operatorname{sh}(z_1 + z_2) = \operatorname{sh} z_1 \operatorname{ch} z_2 + \operatorname{ch} z_1 \operatorname{sh} z_2;$$

$$19) \sin z = \cos \left( \frac{\pi}{2} - z \right);$$

$$20) \operatorname{Arcth} z = \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \frac{z+1}{z-1}.$$

37. Найти все значения функций:

1)  $\operatorname{Arcsin} i$ ;

2)  $\operatorname{Arcsin} 2$ ;

3)  $\operatorname{Arsh}(-i)$ ;



4)  $\text{Arch}(-2)$ ;

5)  $\text{Arctg } 1$ ;

6)  $\text{Arcctg}(1 + i)$ ;

7)  $\text{Arth}(1 + i)$ ;

8)  $\text{Arcth}(1 - i)$ ;

9)  $\text{Arcsin } 2$ ;

10)  $\text{Arsh}(-2)$ ;

11)  $\text{Arcsin}(-i)$ ;

12)  $\text{Arccos } 2i$ ;

13)  $\text{Arsh } i$ ;

14)  $\text{Arch}(-i)$ ;

15)  $\text{Arctg}(-1)$ ;

16)  $\text{Arcctg}(1 - i)$ ;

17)  $\text{Arth}(-1 - i)$ ;

18)  $\text{Arcth}(1 + i)$ ;

19)  $\text{Arccos}(1 - i)$ ;

20)  $\text{Arch}(2i)$ .

38. Решить уравнение:

1)  $\sin z + \cos z = -2$ ;

2)  $\text{ch } z - \text{sh } z = -1$ ;



$$3) \operatorname{sh} z + \operatorname{ch} z = i;$$

$$4) \sin z + \cos z = 2i;$$

$$5) \operatorname{sh} z - \operatorname{ch} z = 2;$$

$$6) \operatorname{sh} z + 4 \operatorname{ch} z = i;$$

$$7) \cos z = \operatorname{ch} z;$$

$$8) \sin z - \cos z = -i;$$

$$9) \sin z + \cos z = i;$$

$$10) 2 \operatorname{ch} z + \operatorname{sh} z = -i;$$

$$11) \sin z - 2 \cos z = 4;$$

$$12) \operatorname{sh} z + 2 \operatorname{ch} z = i;$$

$$13) \sin z = i \operatorname{sh} z;$$

$$14) \cos z = i \operatorname{sh} 2z;$$

$$15) \operatorname{Arctg}(-1);$$

$$16) \operatorname{Arcctg}(1 - i);$$

$$17) \operatorname{Arth}(-1 - i);$$

$$18) \operatorname{Arcth}(1 + i);$$

$$19) \operatorname{Arccos}(1 - i);$$

$$20) \operatorname{Arch}(2i).$$



## 2.3. Задания для самостоятельной работы

39. Найти  $\operatorname{Re} f(z)$ ,  $\operatorname{Im} f(z)$  и  $|f(z)|$  функции  $w = f(z)$ , если:

1)  $w = \operatorname{tg} z$ ;

2)  $w = \operatorname{th} z$ ;

3)  $w = \operatorname{cth} z$ ;

4)  $w = 2^z$ ;

5)  $w = i^z$ ;

6)  $w = \operatorname{tg} iz$ ;

7)  $w = \operatorname{th} iz$ ;

8)  $w = \operatorname{cth}(-iz)$ ;

9)  $w = e^z$ ;

10)  $w = z^i$ .

40. Для функции  $w = f(z)$  найти множество точек  $z$ , где она принимает: 1) действительные значения, 2) чисто мнимые значения, если:

1)  $w = e^z$ ;

2)  $w = \cos z$ ;

3)  $w = \operatorname{sh} z$ ;

4)  $w = \operatorname{ctg} z$ ;

5)  $w = \operatorname{cth} z$ ;





6)  $w = \sin z$ ;

7)  $w = \operatorname{ch} z$ ;

8)  $w = \operatorname{tg} z$ ;

9)  $w = \operatorname{th} z$ ;

10)  $w = 2^z$ .

41. Решить уравнение:

1)  $\cos z = -\operatorname{ch} z$ ;

2)  $\cos z = -i \operatorname{sh} 2z$ ;

3)  $\sin z = i \operatorname{sh} z$ ;

4)  $\sin z = -i \operatorname{sh} z$ ;

5)  $\sin iz = \operatorname{ch} z$ ;

6)  $i \sin z = \operatorname{sh} z$ ;

7)  $i \operatorname{sh} z = \sin z$ ;

8)  $\cos z = \operatorname{ch} z$ ;

9)  $i \cos z = \operatorname{ch} z$ ;

10)  $\cos iz = i \operatorname{sh} z$ .

42. Начертить график функции:

1)  $y = |\sin ix|$ ;

2)  $y = |\cos ix|$ ;

3)  $y = |e^{ix}|$ ;



Меню

Часть II. Задачи

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

2.3. Задания для самостоятельной работы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$4) y = |\operatorname{th} ix|;$$

$$5) y = \operatorname{Re}(\operatorname{Ln} ix);$$

$$6) y = |\operatorname{sh} ix|.$$



## 2.4. Задания творческого характера

43. Доказать, что для любого значения  $\text{Arccos } z$  можно подобрать такое значение  $\text{Arcsin } z$ , чтобы сумма этих значений была равна  $\pi/2$ . Именно в таком смысле понимается равенство

$$\text{Arccos } z + \text{Arcsin } z = \frac{\pi}{2}.$$

44. Доказать, что (см. замечание к задаче 1)

$$\text{Arctg } z + \text{Arcctg } z = \frac{\pi}{2}.$$

45. При каких  $z$  все значения функции  $w = f(z)$  действительны, если:

1)  $w = \text{Arccos } z$ ;

2)  $w = \text{Arcsin } z$ ;

3)  $w = \text{Arctg } z$ ;

4)  $w = i \text{Arsh } z$ .

46. Доказать, что

$$\text{Ln}(z_1 \cdot z_2) = \text{Ln } z_1 + \text{Ln } z_2,$$

$$\text{Ln} \frac{z_1}{z_2} = \text{Ln } z_1 - \text{Ln } z_2,$$

где под суммой и разностью двух логарифмов понимается сумма двух множеств. Например,

$$\text{Ln } z_1 + \text{Ln } z_2 = \{w = w_1 + w_2 : w_1 \in \text{Ln } z_1, w_2 \in \text{Ln } z_2\}.$$



47. Найти ошибку в рассуждениях, приводящих к парадоксу И. Бернулли.

$$1) (-z)^2 = z^2 \Rightarrow 2) 2 \operatorname{Ln}(-z) = 2 \operatorname{Ln} z \Rightarrow 3) \operatorname{Ln}(-z) = \operatorname{Ln} z.$$

48. Около 400 лет назад голландский ученый Меркатор предложил следующий способ построения географических карт. Земную сферу отображают на плоскость с помощью стереографической проекции, а затем плоскость подвергают отображению  $w = i \ln z$ . Такие карты нашли широкое распространение в навигации благодаря тому, что они получены конформными отображениями и локсодромии (пути на поверхности Земли, вдоль которых стрелка компаса сохраняет неизменное направление на них изображаются прямыми линиями).

Какие линии на карте Меркатора параллели и меридианы, в частности экватор и нулевой меридиан? Какая область будет изображена частью земной поверхности, находящаяся между  $30^\circ$  и  $60^\circ$  восточной долготы и между  $40^\circ$  и  $60^\circ$  северной широты?

49. Вычислить:

1)  $\operatorname{Log}_{-2}(-8)$ ;

2)  $\operatorname{Log}_{-10} 10$ ;

3)  $\operatorname{Log}_{-3} 9$ ;

4)  $\operatorname{Log}_i i$ .

50. Пусть  $z_1, z_2, z_3$  — произвольные комплексные числа. Справедливы ли следующие равенства:

1)  $z_1^{z_2} \cdot z_1^{z_3} = z_1^{z_2+z_3}$ ;

2)  $(z_1^{z_2})^{z_3} = z_1^{z_2 \cdot z_3}$ ;

3)  $(z_1^{z_2})^{z_3} = (z_1^{z_3})^{z_2}$ ?



Меню

Часть II. Задачи

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

2.4. Задания творческого характера



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

В частности, верны ли равенства:

$$1) z_1^{2z_2} = (z_1^{z_2})^2;$$

$$2) z_1^{2z_2} = (z_1^2)^{z_2};$$

$$3) (z_1^{z_2})^2 = (z_1^2)^{z_2}?$$



Меню

Часть II. Задачи

Глава 3. Функции комплексного переменного



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 3

# Функции комплексного переменного. Предел, непрерывность, дифференцируемость

- 3.1. Задания для аудиторной работы
- 3.2. Базовые индивидуальные задания
- 3.3. Задания для самостоятельной работы
- 3.4. Задания творческого характера



## 3.1. Задания для аудиторной работы

51. Имеет ли функция  $w = f(z)$  предел в точке  $z_0$ ? Если этот предел существует, найти его:

1)  $w = \frac{\operatorname{Re} z}{z}, z_0 = 0;$

[Решение] [Ответ]

2)  $w = \frac{\operatorname{Im} z}{z}, z_0 = 0;$

[Ответ]

3)  $w = \frac{|z|}{z}, z_0 = 0;$

[Ответ]

4)  $w = \frac{z \operatorname{Re} z}{|z|}, z_0 = 0;$

[Ответ]

5)  $w = \frac{\operatorname{Re} z}{\operatorname{Im} z}, z_0 = 0;$

[Ответ]

6)  $w = \frac{z \operatorname{Im} z}{|z|}, z_0 = 0.$

[Решение] [Ответ]

52. Доказать непрерывность функции  $w = f(z)$  в каждой точке  $z$  комплексной плоскости:

1)  $w = \bar{z}^2 \cdot z;$

[Решение]

2)  $w = \sin z;$

[Решение]

3)  $w = |z|\bar{z};$

4)  $w = e^z;$

5)  $w = \frac{|z|^2}{\bar{z}};$

6)  $w = \operatorname{ch} z.$



53. Для функции  $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ,  $z = x + iy$ , найти:

- точки дифференцируемости;
- точки аналитичности;
- производную в точках дифференцируемости.

1)  $w = xy + i(x^2 - y^2)$ ;

[Решение] [Ответ]

2)  $w = x^2 + iy^2$ ;

[Ответ]

3)  $w = x^3 + xy^2 + i(y^3 + x^2y)$ ;

[Ответ]

4)  $w = x^3 - 3xy^2 - i(y^3 - 2x^2y)$ ;

[Ответ]

5)  $w = x^2 - y^2 + i(x + y)^2$ ;

[Ответ]

6)  $w = y^2 - x^2 + x + i(xy + y)$ .

[Ответ]

54. При каких действительных значениях  $a$ ,  $b$ ,  $c$  функция  $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ,  $z = x + iy$ , будет аналитической в  $\mathbb{C}$ ?

1)  $w = x + ay + i(bx + cy)$ ;

[Решение] [Ответ]

2)  $w = ax^2 + by^2 + icxy$ ;

[Ответ]

3)  $w = axy + i(cx^2 - by^2)$ ;

[Ответ]

4)  $w = x^2 + ax + by^2 + i(2xy + cy)$ ;

[Ответ]

5)  $w = cxy + i(ax^2 + by^2)$ ;

[Ответ]

6)  $w = ax + by - i(x + cy)$ .

[Ответ]

55. Для функции  $w = f(z)$  проверить выполнение условий Коши – Римана для любых  $z = x + iy \in \mathbb{C}$  и доказать справедливость в  $\mathbb{C}$  соответствующего равенства:

1)  $w = e^z$ ,  $(e^z)' = e^z$ ;

[Решение]

2)  $w = \cos z$ ,  $(\cos z)' = -\sin z$ ;





$$3) w = \sin z, (\sin z)' = \cos z;$$

$$4) w = \operatorname{ch} z, (\operatorname{ch} z)' = \operatorname{sh} z;$$

$$5) w = \operatorname{sh} z, (\operatorname{sh} z)' = \operatorname{ch} z;$$

$$6) w = z^3, (z^3)' = 3z^2.$$

56. Проверить, является ли функция  $u(x, y)$  гармонической в области определения:

$$1) u(x, y) = x^2 + y^2 + xy;$$

[Решение] [Ответ]

$$2) u(x, y) = \operatorname{sh} x \cos y;$$

[Ответ]

$$3) u(x, y) = \ln(x^2 + y^2);$$

[Ответ]

$$4) u(x, y) = xy + x - y;$$

[Ответ]

$$5) u(x, y) = \sin x \operatorname{sh} y;$$

[Ответ]

$$6) u(x, y) = xy + x^2 - y^2.$$

[Ответ]

57. Восстановить аналитическую функцию  $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ,  $z = x + iy$ , по известной действительной  $u(x, y)$  или мнимой  $v(x, y)$  части и значению  $f(z_0)$ :

$$1) u(x, y) = e^{-y} \cos x, f(-i) = e;$$

[Решение] [Ответ]

$$2) u(x, y) = -e^{-y} \sin x, f(0) = i;$$

[Ответ]

$$3) v(x, y) = x^2 - y^2 - x, f(1) = 0;$$

[Ответ]

$$4) u(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}, f(1) = i;$$

[Ответ]

$$5) v(x, y) = \cos x \operatorname{sh} y, f(0) = 0;$$

[Ответ]

$$6) u(x, y) = \operatorname{ch} x \cos y, f(0) = 1.$$

[Ответ]



## 3.2. Базовые индивидуальные задания

58. Имеет ли функция  $w = f(z)$  предел в точке  $z_0$ ? Если этот предел существует, найти его:

$$1) w = \frac{(\operatorname{Im} z)^2}{\operatorname{Re} z}, z_0 = 0;$$

$$2) w = \frac{\operatorname{Re}(z^2)}{|z^2|}, z_0 = 0;$$

$$3) w = \frac{\bar{z}}{z}, z_0 = 0;$$

$$4) w = \frac{\operatorname{Im}(z^2)}{|z^2|}, z_0 = 0;$$

$$5) w = \frac{\operatorname{Im} z}{z}, z_0 = 0;$$

$$6) w = \frac{\operatorname{Re}(z^2)}{z}, z_0 = 0;$$

$$7) w = \frac{\bar{z}^2}{z}, z_0 = 0;$$

$$8) w = \frac{|z|}{z}, z_0 = 0;$$

$$9) w = \frac{\bar{z}}{\operatorname{Re} z}, z_0 = 0;$$

$$10) w = \frac{\bar{z} + i}{|z - i|}, z_0 = i;$$

$$11) w = \frac{z}{z - i}, z_0 = \infty;$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$12) w = \frac{(z+i)^2}{|z+i|^2}, z_0 = -i;$$

$$13) w = \frac{\sin z}{z}, z_0 = 0;$$

$$14) w = \frac{\operatorname{Im}(z^2)}{\operatorname{Re} z}, z_0 = 0;$$

$$15) w = \frac{z+i}{z-i}, z_0 = \infty;$$

$$16) w = \frac{\operatorname{Re} z + \operatorname{Im} z}{z}, z_0 = 0;$$

$$17) w = \frac{\operatorname{Re} z - \operatorname{Im} z}{z}, z_0 = 0;$$

$$18) w = \frac{\sin z}{z}, z_0 = \infty;$$

$$19) w = \frac{\operatorname{Re} \bar{z} + \operatorname{Im} \bar{z}}{\bar{z}}, z_0 = 0;$$

$$20) w = \frac{\operatorname{Re} \bar{z}}{\operatorname{Im} \bar{z}}, z_0 = 0.$$

59. Доказать непрерывность функции  $w = f(z)$  в каждой точке области определения:

1)  $w = \operatorname{sh} z;$

2)  $w = \cos z;$

3)  $w = |\bar{z}|^2 + z;$

4)  $w = ze^z;$

5)  $w = \bar{z}^2;$

6)  $w = \operatorname{th} z;$



$$7) w = \operatorname{ch} z;$$

$$8) w = \operatorname{th} \bar{z};$$

$$9) w = \frac{|z| + 1}{\bar{z} + 1};$$

$$10) w = \operatorname{cth} z;$$

$$11) w = z^2 + \bar{z}^2;$$

$$12) w = z \cdot \bar{z} + z + \bar{z};$$

$$13) w = \bar{z} \operatorname{sh} z;$$

$$14) w = \bar{z} e^z;$$

$$15) w = \bar{z} \cdot z^2;$$

$$16) w = \frac{\bar{z}^2}{z^2};$$

$$17) w = \frac{\bar{z} + 1}{\bar{z} - 1};$$

$$18) w = e^{\bar{z}};$$

$$19) w = \sin \bar{z};$$

$$20) w = \operatorname{ch} \bar{z}.$$

60. Для функции  $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ,  $z = x + iy$ , найти:

- точки дифференцируемости;
- точки аналитичности;
- производную в точках дифференцируемости.

$$1) w = x^2 - iy^2;$$

$$2) w = xy + i\frac{x}{y};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

3)  $w = x^2 - y^2 - i2xy;$

4)  $w = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3);$

5)  $w = e^x \cos y + ie^x \sin y;$

6)  $w = z \cdot \bar{z}^2;$

7)  $w = z^2 \cdot \bar{z};$

8)  $w = x^2 + y^2 + i2xy;$

9)  $w = x^2 + ixy;$

10)  $w = xy - iy^2;$

11)  $w = x + 2y + i(x - y);$

12)  $w = \bar{z}^2 + z;$

13)  $w = z^2 + \bar{z};$

14)  $w = e^{x-iy};$

15)  $w = \operatorname{sh}(x - iy);$

16)  $w = \cos \bar{z};$

17)  $w = z + 2\bar{z};$

18)  $w = e^{-y+ix};$

19)  $w = z \operatorname{Re} z + iz \operatorname{Im} z;$

20)  $w = \bar{z} + \operatorname{Im} z^2.$



61. При каких действительных значениях  $a$ ,  $b$ ,  $c$  функция  $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ,  $z = x + iy$ , будет дифференцируемой в области определения?

1)  $w = ax + y + i(cx + by)$ ;

2)  $w = ax^2 + cy^2 + ibxy$ ;

3)  $w = ax + x^2 - y^2 + i(by + cxy)$ ;

4)  $w = x^3 + axy^2 + i(bx^2y + cx - y^3)$ ;

5)  $w = a(x^2 - y^2) + x + i(by + cxy)$ ;

6)  $w = ax + \frac{cx}{x^2 + y^2} + i\left(y + \frac{by}{x^2 + y^2}\right)$ ;

7)  $w = ax^2 + bx + y^2 + i(2y + cxy)$ ;

8)  $w = ae^x \cos y + i(be^x \sin y + y) + cx$ ;

9)  $w = a \cos x \operatorname{ch} y + ib \sin x \operatorname{sh} y$ ;

10)  $w = c \sin x \operatorname{ch} y + bx + i(a \cos x \operatorname{sh} y + y)$ ;

11)  $w = az + b\bar{z}$ ;

12)  $w = a \ln(x^2 + y^2) + ib \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$ ;

13)  $w = a \operatorname{arctg} \frac{y}{x} + cx + i(b \ln(x^2 + y^2) + y)$ ;

14)  $w = a\bar{z}^2 + cx + ay + iy$ ;

15)  $w = axy + cx + by + i(x^2 - y^2 + y)$ ;

16)  $w = az^2 + c\bar{z} + b\bar{z}^2$ ;

17)  $w = x^3 + bxy^2 + 2y + i(ax^2y - y^3 + x)$ ;

18)  $w = axy + i(cx^2 + by^2)$ ;



$$19) w = ax + cx^2 - y^2 + i(bxy + 2y);$$

$$20) w = e^{az+b\bar{z}}.$$

62. Для функции  $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ,  $z = x + iy$ , в области ее определения проверить выполнение условий Коши – Римана и доказать справедливость соответствующего равенства:

$$1) w = z^2, (z^2)' = 2z;$$

$$2) w = e^{iz}, (e^{iz})' = ie^{iz};$$

$$3) w = \operatorname{sh} iz, (\operatorname{sh} iz)' = i \operatorname{ch} iz;$$

$$4) w = \ln z, (\ln z)' = \frac{1}{z} \quad (\ln z \text{ — главная ветвь логарифма});$$

$$5) w = \cos az, (\cos az)' = -a \sin az;$$

$$6) w = \ln iz, (\ln iz)' = \frac{1}{z};$$

$$7) w = \operatorname{ch} iz, (\operatorname{ch} iz)' = i \operatorname{sh} iz;$$

$$8) w = z^4, (z^4)' = 4z^3;$$

$$9) w = \sin az, (\sin az)' = a \cos az;$$

$$10) w = \frac{1}{z}, \left(\frac{1}{z}\right)' = -\frac{1}{z^2};$$

$$11) w = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + i \operatorname{arctg} \frac{y}{x}, w' = \frac{1}{z};$$

$$12) w = \ln az, (\ln az)' = \frac{1}{z};$$

$$13) w = -\operatorname{arctg} \frac{y}{x} + i \ln \sqrt{x^2 + y^2}, w' = \frac{i}{z};$$

$$14) w = \cos az, (\cos az)' = -a \sin az;$$



$$15) w = e^{az}, (e^{az})' = ae^{az};$$

$$16) w = z^4 + z, (z^4 + z)' = 4z^3 + 1;$$

$$17) w = (az)^2, ((az)^2)' = 2az;$$

$$18) w = az^3, (az^3)' = 3az^2;$$

$$19) w = \frac{1}{z^2}, \left(\frac{1}{z^2}\right)' = -\frac{2}{z^3};$$

$$20) w = \frac{z+1}{z}, \left(\frac{z+1}{z}\right)' = -\frac{1}{z^2}.$$

63. Проверить, является ли функция  $u(x, y)$  гармонической в области определения:

$$1) u = \operatorname{arctg} \frac{y}{x};$$

$$2) u = x^3 + 3x^2y;$$

$$3) u = e^{-y} \sin x;$$

$$4) u = \ln \sqrt{x^2 + y^2};$$

$$5) u = \sin x \operatorname{ch} y;$$

$$6) u = y^3 - 3xy^2;$$

$$7) u = \cos x \operatorname{sh} y;$$

$$8) u = \operatorname{sh} x \cos y;$$

$$9) u = \frac{x}{x^2 + y^2};$$

$$10) u = \frac{y}{x^2 + y^2};$$

$$11) u = x^3 - y^3;$$





$$12) u = \operatorname{ch} x \cos y;$$

$$13) u = x + 2y + \ln(x^2 + y^2);$$

$$14) u = e^{-y} \sin x + x;$$

$$15) u = \sin x \operatorname{sh} y;$$

$$16) u = \sin x \cos y;$$

$$17) u = x^3 - 3xy;$$

$$18) u = \operatorname{ch} x - \sin y - xy;$$

$$19) u = \operatorname{ch} x \sin y;$$

$$20) u = \operatorname{sh} x \sin y.$$

64. Восстановить аналитическую функцию  $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ,  $z = x + iy$ , по известной действительной  $u(x, y)$  или мнимой  $v(x, y)$  части и значению  $f(z_0)$ :

$$1) v(x, y) = y + \ln(x^2 + y^2), f(1) = 1;$$

$$2) u(x, y) = x + \operatorname{arctg} \frac{y}{x}, f(1) = 1;$$

$$3) u(x, y) = 2xy + y, f(0) = 0;$$

$$4) u(x, y) = x^2 - y^2 + x^3 - 3xy^2, f(0) = 0;$$

$$5) u(x, y) = \sin x \operatorname{ch} y, f(0) = 0;$$

$$6) v(x, y) = \sin x \operatorname{sh} y, f(0) = -1;$$

$$7) u(x, y) = 4x - \frac{y}{x^2 + y^2}, f(1) = 4 - i;$$

$$8) v(x, y) = \ln(x^2 + y^2), f(1) = 2i;$$

$$9) u(x, y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y, f(0) = 0;$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$10) u(x, y) = x^3 - 3xy^2 + 2x, f(0) = 0;$$

$$11) v(x, y) = e^{-x} \sin y, f(0) = 1;$$

$$12) v(x, y) = \operatorname{sh} x \sin y, f(0) = 1;$$

$$13) v(x, y) = 3x^2y - y^3 + 3y, f(0) = 0;$$

$$14) v(x, y) = \operatorname{ch} x \sin y, f(0) = 0;$$

$$15) v(x, y) = 2y - \frac{y}{x^2 + y^2}, f(1) = 3;$$

$$16) v(x, y) = 2x + \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y, f(0) = 0;$$

$$17) v(x, y) = 2x + e^{-x} \sin y, f(0) = 1;$$

$$18) v(x, y) = xy + \operatorname{ch} x \sin y, f(0) = 0;$$

$$19) v(x, y) = x^2 - y^2 - \frac{y}{x^2 + y^2}, f(1) = 1 + i;$$

$$20) u(x, y) = 2xy + \operatorname{arctg} \frac{y}{x}, f(1) = i.$$



### 3.3. Задания для самостоятельной работы

65. Установить, будет ли функция  $w = f(z)$  в области  $D$ :

- а) непрерывной,
- б) равномерно непрерывной?

1)  $w = \frac{1}{1-z}$ ,  $D = \{z : |z| < 1\}$ ;

2)  $w = e^{\frac{1}{z}}$ ,  $D = \{z : 0 < |z| < 1\}$ ;

3)  $w = \frac{1}{1+z^2}$ ,  $D = \{z : |z| < 1\}$ ;

4)  $w = e^{-\frac{1}{z^2}}$ ,  $D = \left\{z : 0 < |z| \leq 1, |\arg z| \leq \frac{\pi}{6}\right\}$ ;

5)  $w = e^{-\frac{1}{z}}$ ,  $D = \left\{z : 0 < |z| < 1, |\arg z| \leq \frac{\pi}{2}\right\}$ .

66. Пусть  $\varphi(x)$  — дважды непрерывно дифференцируемая функция на всей действительной прямой  $\mathbb{R}$ , отличная от постоянной. Выяснить, существуют ли гармонические функции указанного вида (в случае существования найти их):

1)  $u = \varphi(xy)$ ;

[Решение] [Ответ]

2)  $u = \varphi(ax + by)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ ;

[Ответ]

3)  $u = \varphi(x^2 + y)$ ;

[Ответ]

4)  $u = \varphi\left(\frac{x}{y}\right)$ ;

[Ответ]

5)  $u = \varphi(x^2 + y^2)$ ;

[Ответ]

6)  $u = \varphi\left(\frac{x^2 + y^2}{x}\right)$ .

[Ответ]



67. Доказать следующие утверждения.

- 1) Если  $f'(z) = 0$  в области  $G$ , то  $f(z) \equiv \text{const}$  в  $G$ .
- 2) Если  $w = f(z)$  дифференцируема в области  $G$  и в этой области  $\text{Im } f(z) = (\text{Re } f(z))^2$ , то  $f(z) \equiv \text{const}$  в  $G$ .
- 3) Пусть  $w = f(z) = u(x) + iv(x)$ . Если  $f(z)$  дифференцируема в области  $G$ , то  $f(z) = az + b$ , причем  $a \in \mathbb{R}$ .
- 4) Если функции  $f(z)$  и  $\overline{f(z)}$  одновременно аналитичны в области  $G$ , то  $f(z) \equiv \text{const}$  в  $G$ .
- 5) Если  $\text{Re } f(z) = \text{Im } f(z)$  в области  $G$  и функция  $w = f(z)$  является дифференцируемой в этой области, то  $f'(z) \equiv 0$  в  $G$ .
- 6) Пусть функция  $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = |f(z)|e^{i \arg f(z)}$  аналитична в области  $G$ . Если одна из функций  $u(x, y)$ ,  $v(x, y)$ ,  $|f(z)|$ ,  $\arg f(z)$  тождественно равна постоянной в  $G$ , то  $f(z) \equiv \text{const}$  в  $G$ .

68. Доказать следующие утверждения.

- 1) Если функция  $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  является аналитической в области  $G$ , то  $u(x, y)$  и  $v(x, y)$  являются сопряженными гармоническими функциями в  $G$ .
- 2) Частные производные гармонической функции в области  $G$  являются гармоническими в этой области.
- 3) Если функция  $u(x, y) \not\equiv \text{const}$  является гармонической в области  $G$ , то функция  $u^2(x, y)$  не является гармонической в этой области.
- 4) Если функции  $u(x, y)$  и  $f(u(x, y))$  являются гармоническими в области  $G$ , то  $f(u) = au + b$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .
- 5) Пусть функция  $w = f(z) \not\equiv \text{const}$  является аналитической в области  $G$ . Тогда
  - 1) функция  $|f(z)|$  не является гармонической в  $G$ ;
  - 2) функция  $\arg f(z)$  является гармонической в  $G$ ;
  - 3) функция  $\ln |f(z)|$  является гармонической в  $G$ , если  $f(z) \neq 0$  в  $G$ .



69. Пусть  $\varphi(x)$  — дважды непрерывно дифференцируемая функция на всей действительной прямой  $\mathbb{R}$ , отличная от постоянной. Выяснить, существуют ли гармонические функции указанного вида (в случае существования найти их):

1)  $u = \varphi(x + y^2)$ ;

2)  $u = \varphi\left(x + \sqrt{x^2 + y^2}\right)$ ;

3)  $u = \varphi\left(y + \sqrt{x^2 + y^2}\right)$ ;

4)  $u = \varphi\left(\frac{x^2 + y^2}{y}\right)$ ;

5)  $u = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ ;

6)  $u = \varphi(y)$ ;

7)  $u = \varphi(x) + \varphi(y)$ .



## 3.4. Задания творческого характера

70. Функция  $w = f(z)$  определена в окрестности точки  $z_0$  и дифференцируема в точке  $z_0$ , причем  $f'(z_0) \neq 0$ . Доказать, что значения  $f(z)$  в окрестности  $z_0$  не могут лежать по одну сторону от прямой, проходящей через точку  $f(z_0)$ .

71. Доказать существование и найти аналитическую функцию  $w = f(z)$ , если:

1)  $|f(z)| = (x^2 + y^2)e^x$ ;

2)  $\arg f(z) = xy$ ;

3)  $|f(re^{i\varphi})| = e^{r^2 \cos 2\varphi}$ ;

4)  $\arg(f(re^{i\varphi})) = \varphi + r \sin \varphi$ .

72. Показать, что уравнение Лапласа

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

в полярных координатах

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

имеет вид

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0.$$



73. Пусть  $z = re^{i\varphi}$  и

$$\begin{aligned} w = f(z) &= u(r \cos \varphi, r \sin \varphi) + iv(r \cos \varphi, r \sin \varphi) = \\ &= u_1(r, \varphi) + iv_1(r, \varphi). \end{aligned}$$

Показать, что условия Коши – Римана в полярных координатах имеют вид

$$\begin{cases} r \frac{\partial u_1}{\partial r} = \frac{\partial v_1}{\partial \varphi}, \\ \frac{\partial u_1}{\partial \varphi} = -r \frac{\partial v_1}{\partial r}. \end{cases}$$

74. Пусть  $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ . Определим формальные производные по  $z$  и  $\bar{z}$  равенствами

$$f_z = \frac{\partial w}{\partial z}, \quad f_{\bar{z}} = \frac{\partial w}{\partial \bar{z}},$$

где

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

1) Доказать, что уравнения Коши – Римана эквивалентны уравнению

$$f_{\bar{z}} = 0.$$

2) Доказать, что уравнение Лапласа  $\Delta u = 0$  можно записать в виде

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}} = 0.$$



Меню

Часть II. Задачи

Глава 3. Функции комплексного переменного

3.4. Задания творческого характера



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

75. Пусть функция  $w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  аналитична в точке  $z_0 = x_0 + iy_0$  и  $f(z_0) = c_0$ . Доказать, что

$$1) f(z) = 2u\left(\frac{z + \bar{z}_0}{2}, \frac{z - \bar{z}_0}{2i}\right) - \bar{c}_0;$$

$$2) f(z) = 2iv\left(\frac{z + \bar{z}_0}{2}, \frac{z - \bar{z}_0}{2i}\right) + \bar{c}_0.$$





## Глава 4

# Геометрический смысл модуля и аргумента производной

- 4.1. Задания для аудиторной работы
- 4.2. Базовые индивидуальные задания
- 4.3. Задания для самостоятельной работы
- 4.4. Задания творческого характера



## 4.1. Задания для аудиторной работы

76. Отображение производится с помощью функции  $w = z^3$ . Найти коэффициент растяжения и угол поворота в точке  $z_0$ :

1)  $z_0 = 1$ ; [Решение] [Ответ]

2)  $z_0 = i$ ; [Ответ]

3)  $z_0 = 1 + i$ ; [Решение] [Ответ]

4)  $z_0 = 1 - i$ ; [Ответ]

5)  $z_0 = -1 + i$ ; [Ответ]

6)  $z_0 = -1 - i$ . [Ответ]

77. Отображение производится с помощью функции  $w = f(z)$ . Найти коэффициент растяжения и угол поворота в точке  $z_0$ :

1)  $w = z^2 + 1$ ,  $z_0 = 1 - i$ ; [Ответ]

2)  $w = e^{2z}$ ,  $z_0 = 0$ ; [Ответ]

3)  $w = \ln z$ ,  $z_0 = 1 + i$ ; [Ответ]

4)  $w = \frac{1 - iz}{1 + iz}$ ,  $z_0 = 1$ ; [Ответ]

5)  $w = \sin z$ ,  $z_0 = i$ ; [Ответ]

6)  $w = z^4$ ,  $z_0 = i$ . [Ответ]



78. Какая часть плоскости сжимается, а какая растягивается, если отображение осуществляется функцией  $w = f(z)$ ?

1)  $w = z^4$ ;

[Решение] [Ответ]

2)  $w = z^2 - z$ ;

[Решение] [Ответ]

3)  $w = \frac{1}{z}$ ;

[Ответ]

4)  $w = e^z$ ;

[Ответ]

5)  $w = \ln z$ ;

[Ответ]

6)  $w = \ln(z - 1)$ .

[Ответ]

79. Найти множество всех точек, в которых коэффициент растяжения равен 1, если отображение задано следующими функциями:

1)  $w = iz^2$ ;

[Ответ]

2)  $w = z^2 + 2z$ ;

[Ответ]

3)  $w = \frac{1}{z}$ ;

[Ответ]

4)  $w = \frac{z + i}{z - i}$ ;

[Ответ]

5)  $w = e^z$ ;

[Ответ]

6)  $w = z^2 - 6z$ .

[Ответ]

80. Найти множество всех точек, в которых угол поворота равен нулю, если отображение задано следующими функциями:

1)  $w = -z^2$ ;

[Ответ]

2)  $w = iz^3$ ;

[Ответ]



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

3)  $w = z^2 + iz$ ; [Ответ]

4)  $w = z^2 - 8z$ ; [Ответ]

5)  $w = e^z$ ; [Ответ]

6)  $w = z^4$ . [Ответ]

81. Найти угол между образами кривых  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  при отображении  $w = z^2$  в точке  $z_0$ :

1)  $\gamma_1 : z = t + it, t \in [-1, 1], \gamma_2 : z = t, t \in [-1, 1]$ ; [Решение] [Ответ]

2)  $\gamma_1 : z = t + it^2, t \in [-1, 2], \gamma_2 : z = it, t \in [-2, 1]$ ; [Ответ]

3)  $\gamma_1 : z = it, t \in [0, 1], \gamma_2 : z = t + it^3, t \in [0, 1]$ ; [Ответ]

4)  $\gamma_1 : z = t^2 + it, t \in [-1, 2], \gamma_2 : z = t + it, t \in [-1, 1]$ ; [Ответ]

5)  $\gamma_1 : z = t + i \sin t, t \in [0, 1], \gamma_2 : z = it, t \in [0, 1]$ ; [Ответ]

6)  $\gamma_1 : z = t + i \sin^2 t, t \in [-1, 1], \gamma_2 : z = t + it^2, t \in [-1, 1]$ . [Решение] [Ответ]



## 4.2. Базовые индивидуальные задания

82. Отображение производится с помощью функции  $w = f(z)$ . Найти коэффициент растяжения и угол поворота в точке  $z_0$ :

1)  $w = e^z$ ,  $z_0 = \ln 2 + i\frac{\pi}{4}$ ;

2)  $w = e^z$ ,  $z_0 = -2 + i\frac{\pi}{4}$ ;

3)  $w = z^3$ ,  $z_0 = \frac{4}{\sqrt{3}} + \frac{i}{\sqrt{3}}$ ;

4)  $w = \ln z$ ,  $z_0 = 1 + i$ ;

5)  $w = \ln z$ ,  $z_0 = 1 - i$ ;

6)  $w = \ln z$ ,  $z_0 = -1 + i$ ;

7)  $w = \ln z$ ,  $z_0 = -1 - i$ ;

8)  $w = \frac{1 - iz}{1 + iz}$ ,  $z_0 = 1$ ;

9)  $w = e^z$ ,  $z_0 = \ln 3 - i\frac{\pi}{2}$ ;

10)  $w = e^z$ ,  $z_0 = -3 - i\frac{\pi}{2}$ ;

11)  $w = z^3$ ,  $z_0 = \frac{5}{\sqrt{3}} + i\frac{2}{\sqrt{3}}$ ;

12)  $w = \ln z$ ,  $z_0 = \frac{1}{2} + i\frac{1}{2}$ ;



$$13) w = \ln z, z_0 = \frac{1}{2} - i\frac{1}{2};$$

$$14) w = \ln z, z_0 = -\frac{1}{2} + i\frac{1}{2};$$

$$15) w = \ln z, z_0 = -\frac{1}{2} - i\frac{1}{2};$$

$$16) w = \frac{2 - iz}{2 + iz}, z_0 = 2;$$

$$17) w = e^z, z_0 = \ln 4 + i\frac{\pi}{3};$$

$$18) w = e^z, z_0 = -4 + i\frac{\pi}{3};$$

$$19) w = z^3, z_0 = \frac{4}{\sqrt{3}} + i\sqrt{3};$$

$$20) w = \ln z, z_0 = 3 + 3i.$$

83. Какая часть плоскости сжимается, а какая растягивается, если отображение осуществляется функцией  $w = f(z)$ ?

$$1) w = 2e^{\frac{z}{5}};$$

$$2) w = 3iz^4;$$

$$3) w = 2iz^3;$$

$$4) w = 4iz^2;$$

$$5) w = \ln(z + 2);$$

$$6) w = \frac{1}{z + 1};$$

$$7) w = z^2 + 4z + 8;$$



$$8) w = 3e^{\frac{z}{3}};$$

$$9) w = 2iz^4;$$

$$10) w = 4iz^3;$$

$$11) w = 2iz^2;$$

$$12) w = \ln(z + 5);$$

$$13) w = \frac{1}{z + 3};$$

$$14) w = z^2 + 2z + 4;$$

$$15) w = 5e^{\frac{z}{5}};$$

$$16) w = 4iz^4;$$

$$17) w = 3iz^3;$$

$$18) w = 5iz^2;$$

$$19) w = \ln(z + 3);$$

$$20) w = \frac{1}{z + 2};$$

84. Найти множество всех точек, в которых коэффициент растяжения равен 1, если отображение задано следующими функциями:

$$1) w = 5iz^2;$$

$$2) w = z^2 - 6z;$$

$$3) w = \frac{1}{z + 4};$$

$$4) w = \frac{z + 3i}{z - 3i};$$



Меню

Часть II. Задачи

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

4.2. Базовые индивидуальные задания



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$5) w = 4e^{\frac{z}{4}};$$

$$6) w = 3iz^2;$$

$$7) w = z^2 - 10z;$$

$$8) w = \frac{1}{z+2};$$

$$9) w = \frac{z+7i}{z-7i};$$

$$10) w = 3e^{\frac{z}{3}};$$

$$11) w = 4iz^2;$$

$$12) w = z^2 - 14z;$$

$$13) w = \frac{1}{z+8};$$

$$14) w = \frac{z+9i}{z-9i};$$

$$15) w = 8e^{\frac{z}{8}};$$

$$16) w = 9iz^2;$$

$$17) w = z^2 - 8z;$$

$$18) w = \frac{1}{z+7};$$

$$19) w = \frac{z+7i}{z-7i};$$

$$20) w = 5e^{\frac{z}{5}}.$$





85. Найти множество всех точек, в которых угол поворота равен нулю, если отображение задано следующими функциями:

1)  $w = 6iz^4$ ;

2)  $w = 5z^4$ ;

3)  $w = z^2 - 6z$ ;

4)  $w = 4iz^3$ ;

5)  $w = -5z^3$ ;

6)  $w = 2iz^2$ ;

7)  $w = -6z^2$ ;

8)  $w = 5iz^4$ ;

9)  $w = 3z^4$ ;

10)  $w = z^2 - 14z$ ;

11)  $w = 2iz^3$ ;

12)  $w = -4z^3$ ;

13)  $w = 8iz^2$ ;

14)  $w = -3z^2$ ;

15)  $w = 8iz^4$ ;

16)  $w = 7z^4$ ;

17)  $w = z^2 - 10z$ ;

18)  $w = 9iz^3$ ;

19)  $w = -6z^3$ ;

20)  $w = 7iz^2$ .



## 4.3. Задания для самостоятельной работы

86. Найти угол между образами кривых  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  при отображении  $w = e^z$  в точке  $z_0$ :

1)  $\gamma_1 : z = t + i \sin^2 t, t \in [0, 1], \gamma_2 : z = \sin t + it, t \in [-1, 1];$

2)  $\gamma_1 : z = t^5 + it, t \in [-1, 1], \gamma_2 : z = \sin^3 t + it, t \in [-2, 1];$

3)  $\gamma_1 : z = t + it, t \in [-1, 1], \gamma_2 : z = t^2 + it, t \in [-2, 1];$

4)  $\gamma_1 : z = te^t + it, t \in [0, 1], \gamma_2 : z = t + i \sin t, t \in [-1, 1];$

5)  $\gamma_1 : z = t^2 + it, t \in [0, 1], \gamma_2 : z = t + it^4, t \in [0, 1];$

6)  $\gamma_1 : z = t \cos t + it, t \in [-1, 1], \gamma_2 : z = t + it^3, t \in [-1, 1].$

87. Найти площадь области, на которую функция  $w = e^z$  отображает прямоугольник:

$$D = \{z = x + iy : x_1 \leq x \leq x_2, y_1 \leq y \leq y_2\}.$$

1)  $x_1 = 1, x_2 = 2, y_1 = 0, y_2 = 2\pi;$

2)  $x_1 = -1, x_2 = 0, y_1 = \frac{\pi}{4}, y_2 = \frac{9\pi}{4};$

3)  $x_1 = 0, x_2 = 3, y_1 = -\pi, y_2 = \pi;$

4)  $x_1 = 2, x_2 = 3, y_1 = -2\pi, y_2 = 0;$

5)  $x_1 = \ln 2, x_2 = \ln 3, y_1 = \pi, y_2 = 3\pi.$

88. Найти длину спирали, на которую функция  $w = e^z$  отображает отрезок  $d$ :

1)  $d = \{z = x + iy : x = y, 0 \leq x \leq 2\pi\};$

2)  $d = \{z = x + iy : x = -y, 0 \leq x \leq 2\pi\};$



Меню

Часть II. Задачи

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

4.3. Задания для самостоятельной работы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

3)  $d = \{z = x + iy : y = 0, \pi \leq x \leq 3\pi\};$

4)  $d = \{z = x + iy : y = 1, 0 \leq x \leq 2\pi\};$

5)  $d = \{z = x + iy : x = y, -\pi \leq x \leq \pi\}.$



## 4.4. Задания творческого характера

89. Найти коэффициент растяжения и угол поворота лучей  $\gamma_1 = \{z : \arg z = 0\}$ ,  $\gamma_2 = \{z : \arg z = \pi/4\}$  в точке  $z_0 = 0$  при недифференцируемом отображении  $w = 2z + i\bar{z}$ .
90. В каких точках плоскости угол поворота отображения  $w = \frac{1+i\bar{z}}{1-iz}$  равен нулю? В каких точках коэффициент растяжения этого отображения равен 1?
91. Пусть функция  $w = f(z)$  является аналитической в замыкании области  $D$ , а  $G$  — образ области  $D$  при отображении  $f$ . Доказать, что если отображение  $f$  в области  $D$  однолистно, то для площади  $\mu(G)$  области  $G$  справедлива формула

$$\mu(G) = \iint_D |f'(z)|^2 dx dy.$$

92. Доказать, что если  $L$  — произвольная кусочно-гладкая кривая в области  $D$ , а  $\Gamma$  — ее образ при отображении  $f$ , то длина  $|\Gamma|$  кривой  $\Gamma$  вычисляется по формуле

$$|\Gamma| = \int_L |f'(s)| ds,$$

при этом функция  $f$  предполагается аналитической в области  $D$ , но не обязательно однолистной.

93. Применяя формулы из предыдущих задач [91](#) и [92](#) для отображения  $f(z) = z^3$ , области  $D = \{z : 1 < |z| < 2, |\arg z| < \frac{\pi}{4}\}$ ,  $L = \partial D$ , доказать, что для  $G = f(D)$  и  $\Gamma = f(L)$  справедливы равенства:

$$\mu(G) = \frac{189\pi}{4}, \quad |\Gamma| = 14 + \frac{27}{2}\pi.$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 5

# Линейная функция

- 5.1. Задания для аудиторной работы
- 5.2. Базовые индивидуальные задания
- 5.3. Задания для самостоятельной работы
- 5.4. Задания творческого характера



## 5.1. Задания для аудиторной работы

94. Представить линейное отображение  $w = az + b$  в виде композиции отображений растяжения, поворота и параллельного переноса:

1)  $w = iz + i$ ; [Ответ]

2)  $w = -iz - 1 + i$ ; [Ответ]

3)  $w = (1 + i)z + 1$ ; [Ответ]

4)  $w = (1 - i)z - i$ ; [Ответ]

5)  $w = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right)z - 1$ ; [Ответ]

6)  $w = (-1 - i)z + 1$ . [Решение] [Ответ]

95. Найти линейное отображение треугольника  $ABC$  в плоскости ( $z$ ) на подобный ему треугольник  $A_1B_1C_1$  плоскости ( $w$ ):

1)  $A = 8 + 2i, B = 12 + 2i, C = 10 + 4i, A_1 = 0, B_1 = -2i, C_1 = 1 - i$ ; [Ответ]

2)  $A = 0, B = 4, C = 4i, A_1 = 4 + 4i, B_1 = 0, C_1 = 8$ ; [Ответ]

3)  $A = 7 + 2i, B = 11 + 2i, C = 9 + 4i, A_1 = 0, B_1 = -2i, C_1 = 1 - i$ ; [Ответ]

4)  $A = 0, B = 6, C = 6i, A_1 = 6 + 6i, B_1 = 0, C_1 = 12$ ; [Ответ]

5)  $A = 5 + 2i, B = 9 + 2i, C = 7 + 4i, A_1 = 0, B_1 = -2i, C_1 = 1 - i$ ; [Ответ]

6)  $A = 0, B = 1, C = i, A_1 = 1 + i, B_1 = 0, C_1 = 2$ . [Решение] [Ответ]



96. Найти линейное отображение с неподвижной точкой  $z^*$ , переводящее точку  $z_1$  в точку  $w_1$ :

1)  $z^* = 2 + 4i$ ,  $z_1 = 2i$ ,  $w_1 = -2i$ ;

[Ответ]

2)  $z^* = 0$ ,  $z_1 = i$ ,  $w_1 = -i$ ;

[Ответ]

3)  $z^* = 1$ ,  $z_1 = 0$ ,  $w_1 = i$ ;

[Ответ]

4)  $z^* = i$ ,  $z_1 = -i$ ,  $w_1 = 0$ ;

[Ответ]

5)  $z^* = -i$ ,  $z_1 = 1$ ,  $w_1 = -1$ ;

[Ответ]

6)  $z^* = -1$ ,  $z_1 = i$ ,  $w_1 = -i$ .

[Решение] [Ответ]

97. Для линейного отображения  $w = az + b$  найти конечную неподвижную точку  $z^*$ . Если она существует, найти угол поворота  $\varphi$  вокруг  $z^*$  и коэффициент растяжения  $k$  в точке  $z^*$ :

1)  $w = 3z - 3 + i$ ;

[Ответ]

2)  $w = z - 2 + i$ ;

[Ответ]

3)  $w = 3iz + 1$ ;

[Решение] [Ответ]

4)  $w = 3z + 3i$ ;

[Ответ]

5)  $w = -3z + 3 + 2i$ ;

[Ответ]

6)  $w = z + 3 + 3i$ .

[Ответ]

98. Найти линейную функцию, которая:

1) отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 6 - 3i| < 3$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $\frac{\pi}{4}$ ;

[Ответ]

2) отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 6 - 3i| < 3$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $-\frac{\pi}{4}$ ;

[Ответ]



- 3) отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 6 - 3i| < 3$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $\frac{\pi}{3}$ ; [Ответ]
- 4) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 6 - 3i| < 3$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $-\frac{\pi}{3}$ ; [Ответ]
- 5) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 6 - 3i| < 3$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $\frac{\pi}{6}$ ; [Ответ]
- 6) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 6 - 3i| < 3$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $-\frac{\pi}{6}$ . [Решение] [Ответ]
99. Найти линейную функцию, которая:
- 1) отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 4$ ,  $x = 6$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(5) = \frac{1}{2} + i$ ,  $\operatorname{Im} w(5 + i) < 1$ ; [Ответ]
- 2) отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 4$ ,  $x = 8$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(6) = \frac{1}{2} + i$ ,  $\operatorname{Im} w(6 + i) < 1$ ; [Ответ]
- 3) отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 4$ ,  $x = 10$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(7) = \frac{1}{2} + i$ ,  $\operatorname{Im} w(7 + i) < 1$ ; [Ответ]
- 4) отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 5$ ,  $x = 7$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(6) = \frac{1}{2} + i$ ,  $\operatorname{Im} w(6 + i) < 1$ ; [Ответ]
- 5) отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 5$ ,  $x = 9$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(7) = \frac{1}{2} + i$ ,  $\operatorname{Im} w(7 + i) < 1$ ; [Ответ]
- 6) отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 5$ ,  $x = 11$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(8) = \frac{1}{2} + i\frac{1}{2}$ ,  $\operatorname{Im} w(8 + i) < 1$ . [Решение] [Ответ]





## 5.2. Базовые индивидуальные задания

100. Указать геометрический смысл (сдвиг, растяжение, поворот) следующих преобразований:

1)  $w = z + 5i$ ;

2)  $w = z + 7$ ;

3)  $w = -z + 3i$ ;

4)  $w = iz + 4$ ;

5)  $w = e^{i\frac{\pi}{3}}z$ ;

6)  $w = 6z$ ;

7)  $w = (-1)^4 \frac{1-i}{\sqrt{2}}z$ ;

8)  $w = z + 3i$ ;

9)  $w = z + 5$ ;

10)  $w = -z + 6i$ ;

11)  $w = iz + 5$ ;

12)  $w = e^{i\frac{\pi}{4}}z$ ;

13)  $w = 8z$ ;

14)  $w = (-1)^3 \frac{1-i}{\sqrt{2}}z$ ;

15)  $w = z + 8i$ ;

16)  $w = z + 9$ ;



17)  $w = -z + 7i$ ;

18)  $w = iz + 6$ ;

19)  $w = e^{i\frac{\pi}{6}} z$ ;

20)  $w = 4z$ .

101. Найти следующие линейные преобразования:

- 1) Преобразование с неподвижной точкой  $1 + 2i$ , переводящее точку  $-i$  в точку  $i$ ;
- 2) Преобразование с неподвижной точкой  $2 + i$ , переводящее точку  $i$  в точку  $-i$ ;
- 3) Преобразование с неподвижной точкой  $3 + i$ , переводящее точку  $2i$  в точку  $-2i$ ;
- 4) Преобразование с неподвижной точкой  $2 + 4i$ , переводящее точку  $-i$  в точку  $i$ ;
- 5) Преобразование с неподвижной точкой  $1 + 3i$ , переводящее точку  $i$  в точку  $-i$ ;
- 6) Преобразование с неподвижной точкой  $2 + 3i$ , переводящее точку  $-2i$  в точку  $2i$ ;
- 7) Преобразование с неподвижной точкой  $1 + 4i$ , переводящее точку  $2i$  в точку  $-2i$ ;
- 8) Преобразование с неподвижной точкой  $2 + 2i$ , переводящее точку  $-i$  в точку  $i$ ;
- 9) Преобразование с неподвижной точкой  $2 + i$ , переводящее точку  $-2i$  в точку  $2i$ ;
- 10) Преобразование с неподвижной точкой  $2 + 4i$ , переводящее точку  $2i$  в точку  $-2i$ ;
- 11) Преобразование, отображающее треугольник с вершинами в точках  $A = 0$ ,  $B = 5$ ,  $C = 5i$  плоскости  $z$  на подобный ему треугольник с вершинами  $A_1 = 5 + 5i$ ,  $B_1 = 0$ ,  $C_1 = 10$  плоскости  $w$ ;
- 12) Преобразование, отображающее треугольник с вершинами в точках  $A = 3 + 2i$ ,  $B = 7 + 2i$ ,  $C = 5 + 4i$  плоскости  $z$  на подобный ему треугольник с вершинами  $A_1 = 0$ ,  $B_1 = -2i$ ,  $C_1 = 1 - i$  плоскости  $w$ ;
- 13) Преобразование, отображающее треугольник с вершинами в точках  $A = 0$ ,  $B = 6$ ,  $C = 6i$  плоскости  $z$  на подобный ему треугольник с вершинами  $A_1 = 6 + 6i$ ,  $B_1 = 0$ ,  $C_1 = 12$  плоскости  $w$ ;



- 14) Преобразование, отображающее треугольник с вершинами в точках  $A = 8 + 2i$ ,  $B = 12 + 2i$ ,  $C = 10 + 4i$  плоскости  $z$  на подобный ему треугольник с вершинами  $A_1 = 0$ ,  $B_1 = -2i$ ,  $C_1 = 1 - i$  плоскости  $w$ ;
- 15) Преобразование, отображающее треугольник с вершинами в точках  $A = 0$ ,  $B = 4$ ,  $C = 4i$  плоскости  $z$  на подобный ему треугольник с вершинами  $A_1 = 4 + 4i$ ,  $B_1 = 0$ ,  $C_1 = 8$  плоскости  $w$ ;
- 16) Преобразование, отображающее треугольник с вершинами в точках  $A = 7 + 2i$ ,  $B = 11 + 2i$ ,  $C = 9 + 4i$  плоскости  $z$  на подобный ему треугольник с вершинами  $A_1 = 0$ ,  $B_1 = -2i$ ,  $C_1 = 1 - i$  плоскости  $w$ ;
- 17) Преобразование, отображающее треугольник с вершинами в точках  $A = 0$ ,  $B = 3$ ,  $C = 3i$  плоскости  $z$  на подобный ему треугольник с вершинами  $A_1 = 3 + 3i$ ,  $B_1 = 0$ ,  $C_1 = 6$  плоскости  $w$ ;
- 18) Преобразование, отображающее треугольник с вершинами в точках  $A = 1 + 2i$ ,  $B = 5 + 2i$ ,  $C = 3 + 4i$  плоскости  $z$  на подобный ему треугольник с вершинами  $A_1 = 0$ ,  $B_1 = -2i$ ,  $C_1 = 1 - i$  плоскости  $w$ ;
- 19) Преобразование, отображающее треугольник с вершинами в точках  $A = 0$ ,  $B = 8$ ,  $C = 8i$  плоскости  $z$  на подобный ему треугольник с вершинами  $A_1 = 8 + 8i$ ,  $B_1 = 0$ ,  $C_1 = 16$  плоскости  $w$ ;
- 20) Преобразование, отображающее треугольник с вершинами в точках  $A = 2 + 2i$ ,  $B = 6 + 2i$ ,  $C = 4 + 4i$  плоскости  $z$  на подобный ему треугольник с вершинами  $A_1 = 0$ ,  $B_1 = -2i$ ,  $C_1 = 1 - i$  плоскости  $w$ .
102. Для указанных преобразований найти конечную неподвижную точку  $z_0$  (если она существует), угол поворота  $\varphi$  вокруг нее и коэффициент растяжения  $k$ :
- 1)  $w = -3z + 2 + i$ ;
  - 2)  $w = z + 2 + i$ ;
  - 3)  $w = -2iz + 3$ ;
  - 4)  $w = 2z + 3i$ ;
  - 5)  $w = 2z + 3 + i$ ;
  - 6)  $w = z + 3 + 4i$ ;
  - 7)  $w = 2iz + 4$ ;



8)  $w = -3z + 2i$ ;

9)  $w = -2z - 3 + 2i$ ;

10)  $w = z - 2 + 3i$ ;

11)  $w = -3iz + 1$ ;

12)  $w = -2z + i$ ;

13)  $w = 3z + 2 + 2i$ ;

14)  $w = z - 3 + i$ ;

15)  $w = 3iz + 2$ ;

16)  $w = 3z + 4i$ ;

17)  $w = 2z + 2 + 3i$ ;

18)  $w = z + 2 + 4i$ ;

19)  $w = -3iz + 1$ ;

20)  $w = 2z + i$ .

103. Найти линейную функцию, обладающую следующими свойствами.

- 1) Отображает круг  $|z - 3i| < 6$  на круг  $|w - 6| < 12$ , так чтобы горизонтальный диаметр переходил бы в горизонтальный.
- 2) Отображает круг  $|z - 2i| < 4$  на круг  $|w - 4| < 8$ , так чтобы горизонтальный диаметр переходил бы в горизонтальный.
- 3) Отображает круг  $|z - 4i| < 8$  на круг  $|w - 8| < 16$ , так чтобы горизонтальный диаметр переходил бы в горизонтальный.
- 4) Отображает круг  $|z - 5i| < 10$  на круг  $|w - 10| < 20$ , так чтобы горизонтальный диаметр переходил бы в горизонтальный.



- 5) Отображает круг  $|z - i| < 2$  на круг  $|w - 2| < 4$ , так чтобы горизонтальный диаметр переходил бы в горизонтальный.
- 6) Отображает круг  $|z - bi| < 12$  на круг  $|w - 12| < 24$ , так чтобы горизонтальный диаметр переходил бы в горизонтальный.
- 7) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 2 - i| < 1$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $\frac{\pi}{2}$ .
- 8) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 2 - i| < 1$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $-\frac{\pi}{2}$ .
- 9) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 2 - i| < 1$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $\frac{\pi}{4}$ .
- 10) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 2 - i| < 1$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $-\frac{\pi}{4}$ .
- 11) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 2 - i| < 1$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $\frac{\pi}{3}$ .
- 12) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 2 - i| < 1$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $-\frac{\pi}{3}$ .
- 13) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 2 - i| < 1$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $\frac{\pi}{6}$ .



- 14) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 2 - i| < 1$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $-\frac{\pi}{6}$ .
- 15) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 4 - 2i| < 2$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $\frac{\pi}{2}$ .
- 16) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 4 - 2i| < 2$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $-\frac{\pi}{2}$ .
- 17) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 4 - 2i| < 2$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $\frac{\pi}{4}$ .
- 18) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 4 - 2i| < 2$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $-\frac{\pi}{4}$ .
- 19) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 4 - 2i| < 2$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $\frac{\pi}{3}$ .
- 20) Отображает круг  $|z| < 1$  на круг  $|w - 4 - 2i| < 2$ , так чтобы центры кругов соответствовали бы друг другу и горизонтальный диаметр переходил бы в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $-\frac{\pi}{3}$ .
104. Найти линейную функцию, обладающую следующими свойствами.
- 1) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 1$ ,  $x = 3$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(1) = 0$ .
  - 2) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 1$ ,  $x = 5$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(1) = 0$ .
  - 3) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 1$ ,  $x = 7$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(1) = 0$ .



- 4) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 2$ ,  $x = 4$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(2) = 0$ .
- 5) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 2$ ,  $x = 6$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(2) = 0$ .
- 6) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 2$ ,  $x = 8$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(2) = 0$ .
- 7) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 3$ ,  $x = 5$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(3) = 0$ .
- 8) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 3$ ,  $x = 7$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(3) = 0$ .
- 9) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 3$ ,  $x = 9$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(3) = 0$ .
- 10) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 4$ ,  $x = 6$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(4) = 0$ .
- 11) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 4$ ,  $x = 8$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(4) = 0$ .
- 12) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 4$ ,  $x = 10$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(4) = 0$ .
- 13) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 5$ ,  $x = 7$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(5) = 0$ .
- 14) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 5$ ,  $x = 9$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(5) = 0$ .
- 15) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 5$ ,  $x = 11$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(5) = 0$ .
- 16) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 1$ ,  $x = 3$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(2) = \frac{1}{2} + i$ ,  $\operatorname{Im}(2 + i) < 1$ .
- 17) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 1$ ,  $x = 5$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(3) = \frac{1}{2} + i$ ,  $\operatorname{Im}(3 + i) < 1$ .
- 18) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 1$ ,  $x = 7$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(4) = \frac{1}{2} + i$ ,  $\operatorname{Im}(4 + i) < 1$ .
- 19) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 2$ ,  $x = 4$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(3) = \frac{1}{2} + i$ ,  $\operatorname{Im}(3 + i) < 1$ .
- 20) Отображает полосу, заключенную между прямыми  $x = 2$ ,  $x = 6$  на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ , если  $w(4) = \frac{1}{2} + i$ ,  $\operatorname{Im}(4 + i) < 1$ .



## 5.3. Задания для самостоятельной работы

105. Найти общую форму целого линейного преобразования, переводящегоо

- 1) полосу  $-8 < y < 4$  на себя; [Ответ]
- 2) полосу  $0 < x < 3$  на себя; [Ответ]
- 3) правую полуплоскость на себя; [Ответ]
- 4) верхнюю полуплоскость на правую; [Ответ]
- 5) левую полуплоскость на себя; [Ответ]
- 6) верхнюю полуплоскость на левую; [Ответ]
- 7) верхнюю полуплоскость на нижнюю; [Ответ]
- 8) верхнюю полуплоскость на себя. [Ответ]

106. Найти линейную функцию  $w = az + b$ , отображающую полосу, заключенную между данными прямыми, на полосу  $0 < \operatorname{Re} w < 1$  при указанной нормировке:

- 1)  $x = 1, x = 4, w(1) = 0$ ;
- 2)  $y = x, y = x + 2, w(0) = 0$ ;
- 3)  $y = -2x, y = -2x + 2, w(0) = 0$ ;
- 4)  $y = 4x + 3, y = 4x + 6, w(3i) = 0$ ;
- 5)  $y = -3x + 1, y = -3x + 5, w(i) = 0$ ;
- 6)  $x = a, x = a + h, w\left(a + \frac{h}{2}\right) = \frac{1}{2} + i, \operatorname{Im} w\left(a + \frac{h}{2} + i\right) < 1$ ;
- 7)  $y = kx, y = kx + b, w(0) = 0$ ;
- 8)  $y = kx + b_1, y = kx + b_2, w(ib_1) = 0$ .





107. Квадрат с центром в начале координат, имеющий стороны, параллельные осям координат, подвергается линейному отображению  $w = iz - 3$ . В какую фигуру он преобразуется? [Ответ]
108. Найти общий вид линейной функции, отображающей полосу, ограниченную прямыми  $y = x+1$ ,  $y = x-1$  на себя. [Ответ]
109. Найти линейную функцию, отображающую круг  $|z - i| < 2$  на круг  $|w - 1| < 1$  так, чтобы центры кругов соответствовали друг другу и горизонтальный диаметр переходил в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $\frac{\pi}{4}$ .
110. Найти линейную функцию, отображающую полосу, заключенную между прямыми  $y = kx + b_1$ ,  $y = kx + b_2$ , на полосу  $0 < \text{Im } w < 1$  при условии, что  $w(ib_1) = 0$ .
111. Найти линейную функцию, отображающую полукруг

$$D_1 = \left\{ z : |z - i| < \frac{1}{2}, \text{Re } z > 0 \right\}$$

на полукруг

$$D_2 = \{ z : |w - 2| < 1, \text{Im } w > 0 \}.$$

[Ответ]

112. При линейном отображении

$$w = \frac{\sqrt{5}}{3} e^{-i(\frac{\pi}{2} + \arctg 2)} z$$

найти образ полосы, заключенной между прямыми  $y = 2x$ ,  $y = 2x + 3$ .

[Ответ]



## 5.4. Задания творческого характера

113. Найти угол между двумя параллельными прямыми в бесконечно удаленной точке.
114. Доказать, что два треугольника в  $\mathbb{C}$  подобны между собой тогда и только тогда, когда их можно преобразовать друг в друга с помощью суперпозиции линейного преобразования и ?????? относительно действительной оси.
115. Найти образ полосы, заключенной между прямыми  $y = kx$ ,  $y = kx + b$ , при линейном отображении

$$w = \frac{\sqrt{1+k^2}}{b} e^{-i(\frac{\pi}{2} + \arctg k)} z,$$

где  $k, b \in \mathbb{R}$ .

[Ответ]

116. Доказать, что дробно-линейное преобразование превращается в линейное тогда и только тогда, когда бесконечно удаленная точка является для него неподвижной.
117. Найти группу линейных преобразований, соответствующих при стереографической проекции вращению сферы вокруг вертикального диаметра.

[Ответ]



Меню

Часть II. Задачи

Глава 6. Дробно-линейная функция



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 6

# Дробно-линейная функция

- 6.1. Задания для аудиторной работы
- 6.2. Базовые индивидуальные задания
- 6.3. Задания для самостоятельной работы
- 6.4. Задания творческого характера



## 6.1. Задания для аудиторной работы

118. Найти образ множества  $G$  при отображении  $w = 1/z$ , если:

1)  $G = \left\{ z : \operatorname{Im} z = \frac{1}{5} \right\};$

[Решение] [Ответ]

2)  $G = \left\{ z : \arg z = \frac{\pi}{7} \right\};$

[Ответ]

3)  $G = \{ z : 0 < \operatorname{Re} z < 6 \};$

[Ответ]

4)  $G = \left\{ z : |z - i| = \frac{1}{4} \right\};$

[Ответ]

5)  $G = \left\{ z : \operatorname{Im} z = \frac{1}{6} \operatorname{Re} z \right\};$

[Ответ]

6)  $G = \{ z : |z| = 4, 0 < \arg z < \pi \}.$

[Ответ]

119. Найти **дробно-линейную функцию**  $w = w(z)$ , переводящую три различные точки  $z_1, z_2$  и  $z_3$  соответственно в три различные точки  $w_1, w_2$  и  $w_3$ , если:

1)  $z_1 = -1, z_2 = \infty, z_3 = i, w_1 = 0, w_2 = \infty, w_3 = 1;$

[Ответ]

2)  $z_1 = -1, z_2 = \infty, z_3 = i, w_1 = i, w_2 = 1, w_3 = 1 + i;$

[Ответ]

3)  $z_1 = -3, z_2 = \infty, z_3 = 3i, w_1 = \infty, w_2 = 3i, w_3 = 3;$

[Ответ]

4)  $z_1 = -1, z_2 = i, z_3 = 1 + i, w_1 = i, w_2 = \infty, w_3 = 1;$

[Ответ]

5)  $z_1 = -1, z_2 = \infty, z_3 = i, w_1 = \infty, w_2 = i, w_3 = 1;$

[Решение] [Ответ]

6)  $z_1 = 0, z_2 = \infty, z_3 = 1, w_1 = -1, w_2 = \infty, w_3 = i.$

[Ответ]



120. Найти образ области  $G$  при заданном дробно-линейном отображении  $w = w(z)$ :

1)  $G = \{z : \operatorname{Re} z < 0\}$ ,  $w = \frac{z+4}{z-4}$ ; [Решение] [Ответ]

2)  $G = \{z : |z| > 3\}$ ,  $w = \frac{z+3i}{z-3i}$ ; [Ответ]

3)  $G = \{z : \operatorname{Re} z < 0\}$ ,  $w = \frac{z+1}{z-1}$ ; [Ответ]

4)  $G = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ ,  $w = \frac{z-i}{z+i}$ ; [Ответ]

5)  $G = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$ ,  $w = \frac{z-1}{z+1}$ ; [Ответ]

6)  $G = \{z : |z| < 1\}$ ,  $w = \frac{2z-1}{z-2}$ . [Ответ]

121. Найти образ области  $G$  при дробно-линейном отображении  $w = w(z)$ , если:

1)  $G = \{z = x + iy : x > 0, y > 0\}$ ,  $w = \frac{z-i}{z+i}$ ; [Решение] [Ответ]

2)  $G = \{z = x + iy : x < 0, y > 0\}$ ,  $w = i \frac{z-i}{z+i}$ ; [Ответ]

3)  $G = \{z = x + iy : 0 < x < 1\}$ ,  $w = \frac{z-1}{z-2}$ ; [Ответ]

4)  $G = \{z = x + iy : 0 < x < 1\}$ ,  $w = \frac{z-1}{z}$ ; [Ответ]

5)  $G = \left\{z : 0 < \arg z < \frac{\pi}{4}\right\}$ ,  $w = \frac{z}{z-1}$ ; [Ответ]

6)  $G = \{z : 1 < |z| < 2\}$ ,  $w = \frac{z}{z-1}$ . [Ответ]



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

122. Найти множества, симметричные следующим **кривым** относительно окружности  $\{z : |z| = 1\}$ :

1)  $\left\{z : |z| = \frac{1}{2}\right\};$  [Ответ]

2)  $\{z : |z - 1| = 1\};$  [Ответ]

3)  $\{z : |z + i| = 1\};$  [Ответ]

4)  $\left\{z : |z - 2| = \sqrt{3}\right\};$  [Ответ]

5)  $\{z : \operatorname{Im} z = 2\};$  [Ответ]

6)  $\{z : \operatorname{Re} z = 2\}.$  [Решение] [Ответ]



## 6.2. Базовые индивидуальные задания

123. Найти **дробно-линейную функцию**  $w = w(z)$ , переводящую три различные точки  $z_1$ ,  $z_2$  и  $z_3$  соответственно в три различные точки  $w_1$ ,  $w_2$  и  $w_3$ . Установить во что эта функция переводит **область**  $G$ , если:

- 1)  $z_1 = 3$ ,  $z_2 = \infty$ ,  $z_3 = -3$ ,  $w_1 = 0$ ,  $w_2 = 3i$ ,  $w_3 = 3 + 3i$ ;  $G = \{z : \operatorname{Re} z > 0\}$ ;
- 2)  $z_1 = 3$ ,  $z_2 = -3$ ,  $z_3 = 3i$ ,  $w_1 = 3$ ,  $w_2 = -3$ ,  $w_3 = 0$ ;  $G = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ ;
- 3)  $z_1 = 0$ ,  $z_2 = 1$ ,  $z_3 = \infty$ ,  $w_1 = -i$ ,  $w_2 = 0$ ,  $w_3 = 1$ ;  $G = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$ ;
- 4)  $z_1 = 0$ ,  $z_2 = 2$ ,  $z_3 = \infty$ ,  $w_1 = -2$ ,  $w_2 = 0$ ,  $w_3 = 2$ ;  $G = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ ;
- 5)  $z_1 = 0$ ,  $z_2 = \infty$ ,  $z_3 = i$ ,  $w_1 = 0$ ,  $w_2 = 1 + i$ ,  $w_3 = \infty$ ;  $G = \{z : \operatorname{Re} z < 0\}$ ;
- 6)  $z_1 = 4$ ,  $z_2 = 4i$ ,  $z_3 = -4$ ,  $w_1 = 0$ ,  $w_2 = i$ ,  $w_3 = 1 + i$ ;  $G = \{z : |z| < 4\}$ ;
- 7)  $z_1 = 4$ ,  $z_2 = -4$ ,  $z_3 = 4i$ ,  $w_1 = 4$ ,  $w_2 = -4$ ,  $w_3 = 0$ ;  $G = \{z : |z| < 4\}$ ;
- 8)  $z_1 = 1$ ,  $z_2 = i$ ,  $z_3 = -1$ ,  $w_1 = 1$ ,  $w_2 = 0$ ,  $w_3 = -1$ ;  $G = \{z : |z| < 1\}$ ;
- 9)  $z_1 = 0$ ,  $z_2 = -1 - i$ ,  $z_3 = 1 + i$ ,  $w_1 = -1$ ,  $w_2 = i$ ,  $w_3 = 1$ ;  $G = \{z : \operatorname{Re} z > \operatorname{Im} z\}$ ;
- 10)  $z_1 = 0$ ,  $z_2 = 1$ ,  $z_3 = \infty$ ,  $w_1 = -2$ ,  $w_2 = 2i$ ,  $w_3 = 2$ ;  $G = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$ ;
- 11)  $z_1 = \infty$ ,  $z_2 = i$ ,  $z_3 = 1 + i$ ,  $w_1 = 2$ ,  $w_2 = 1 + 2i$ ,  $w_3 = 0$ ;  $G = \{z : \operatorname{Im} z > 1\}$ ;
- 12)  $z_1 = -1$ ,  $z_2 = i$ ,  $z_3 = 1$ ,  $w_1 = 0$ ,  $w_2 = 1$ ,  $w_3 = \infty$ ;  $G = \{z : |z| < 1\}$ ;
- 13)  $z_1 = 0$ ,  $z_2 = 5$ ,  $z_3 = \infty$ ,  $w_1 = -5$ ,  $w_2 = 0$ ,  $w_3 = 5$ ;  $G = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$ ;
- 14)  $z_1 = 0$ ,  $z_2 = 1$ ,  $z_3 = \infty$ ,  $w_1 = -1$ ,  $w_2 = 0$ ,  $w_3 = 1$ ;  $G = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$ ;
- 15)  $z_1 = 1$ ,  $z_2 = \infty$ ,  $z_3 = -1$ ,  $w_1 = i$ ,  $w_2 = 1 + i$ ,  $w_3 = 2 + i$ ;  $G = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ ;
- 16)  $z_1 = 1$ ,  $z_2 = \infty$ ,  $z_3 = -1$ ,  $w_1 = 0$ ,  $w_2 = i$ ,  $w_3 = 1 + i$ ;  $G = \{z : \operatorname{Re} z < 0\}$ ;



$$17) z_1 = 2, z_2 = -2, z_3 = 2i, w_1 = -2, w_2 = 2, w_3 = 0; G = \{z : |z| > 2\};$$

$$18) z_1 = -1, z_2 = 0, z_3 = 1, w_1 = 1, w_2 = i, w_3 = -1; G = \{z : \operatorname{Im} z > 0\};$$

$$19) z_1 = 1, z_2 = -i, z_3 = i, w_1 = 0, w_2 = 1 + i, w_3 = \infty; G = \{z : |z| > 1\};$$

$$20) z_1 = 1, z_2 = 1 + i, z_3 = 1 - i, w_1 = 0, w_2 = i, w_3 = \infty; G = \{z : \operatorname{Re} z > 1\}.$$

124. Найти **дробно-линейное отображение**  $w = w(z)$  **области**  $G_1$  на область  $G_2$ , для которого  $w(z_1) = w_1$ ,  $\arg w'(z_1) = \alpha$ , где  $z_1 \in G_1$ , если:

$$1) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = \frac{1}{6}, w_1 = 0, \alpha = 0;$$

$$2) G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = 3i, w_1 = 0, \alpha = -\frac{\pi}{2};$$

$$3) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = \frac{1}{9}, w_1 = 0, \alpha = 0;$$

$$4) G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = 5i, w_1 = 0, \alpha = 0;$$

$$5) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\}, z_1 = 0, w_1 = 0, \alpha = \frac{\pi}{2};$$

$$6) G_1 = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = -9i, w_1 = 0, \alpha = -\frac{\pi}{2};$$

$$7) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = \frac{1}{7}, w_1 = 0, \alpha = 0;$$

$$8) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = \frac{1}{2}, w_1 = 0, \alpha = \frac{\pi}{2};$$

$$9) G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = 5i, w_1 = 1, \alpha = -\frac{\pi}{2};$$

$$10) G_1 = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = 2i, w_1 = 1, \alpha = 0.$$

$$11) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = \frac{1}{6}, w_1 = 0, \alpha = 0;$$





$$12) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = \frac{1}{6}, w_1 = 0, \alpha = 0;$$

$$13) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = \frac{1}{6}, w_1 = 0, \alpha = 0;$$

$$14) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = \frac{1}{6}, w_1 = 0, \alpha = 0;$$

$$15) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = \frac{1}{6}, w_1 = 0, \alpha = 0;$$

$$16) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = \frac{1}{6}, w_1 = 0, \alpha = 0;$$

$$17) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = \frac{1}{6}, w_1 = 0, \alpha = 0;$$

$$18) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = \frac{1}{6}, w_1 = 0, \alpha = 0;$$

$$19) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = \frac{1}{6}, w_1 = 0, \alpha = 0;$$

$$20) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, z_1 = \frac{1}{6}, w_1 = 0, \alpha = 0.$$

125. Найти **дробно-линейное отображение**  $w = w(z)$  верхней полуплоскости на полуплоскость  $G$  при указанной нормировке:

$$1) G = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}, w(0) = 1, w(1) = 2, w(2) = \infty;$$

$$2) G = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}, w(1) = 1, w(2) = 2, w(3) = \infty;$$

$$3) G = \{z : \operatorname{Re} z > 0\}, w(0) = 0, w(1) = i, w(2) = \infty;$$

$$4) G = \{z : \operatorname{Re} z < 0\}, w(-1) = -i, w(0) = 0, w(1) = i;$$

$$5) G = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}, w(0) = 1, w(i) = 2i;$$

$$6) G = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}, w(0) = 1, w(i) = -i;$$



7)  $G = \{z : \operatorname{Re} z > 0\}$ ,  $w(1) = 1$ ,  $w(\infty) = i$ ,  $w(-1) = -i$ ;

8)  $G = \{z : \operatorname{Re} z < 0\}$ ,  $w(0) = \infty$ ,  $w(1) = 1$ ,  $w(2) = 2$ ;

9)  $G = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ ,  $w(0) = 2$ ,  $w(1) = 1$ ,  $w(2) = \infty$ ;

10)  $G = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$ ,  $w(0) = 1$ ,  $w(i) = -2i$ .

11)  $G_1 = \{z : |z| < 1\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ,  $z_1 = \frac{1}{6}$ ,  $w_1 = 0$ ,  $\alpha = 0$ ;

12)  $G_1 = \{z : |z| < 1\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ,  $z_1 = \frac{1}{6}$ ,  $w_1 = 0$ ,  $\alpha = 0$ ;

13)  $G_1 = \{z : |z| < 1\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ,  $z_1 = \frac{1}{6}$ ,  $w_1 = 0$ ,  $\alpha = 0$ ;

14)  $G_1 = \{z : |z| < 1\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ,  $z_1 = \frac{1}{6}$ ,  $w_1 = 0$ ,  $\alpha = 0$ ;

15)  $G_1 = \{z : |z| < 1\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ,  $z_1 = \frac{1}{6}$ ,  $w_1 = 0$ ,  $\alpha = 0$ ;

16)  $G_1 = \{z : |z| < 1\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ,  $z_1 = \frac{1}{6}$ ,  $w_1 = 0$ ,  $\alpha = 0$ ;

17)  $G_1 = \{z : |z| < 1\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ,  $z_1 = \frac{1}{6}$ ,  $w_1 = 0$ ,  $\alpha = 0$ ;

18)  $G_1 = \{z : |z| < 1\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ,  $z_1 = \frac{1}{6}$ ,  $w_1 = 0$ ,  $\alpha = 0$ ;

19)  $G_1 = \{z : |z| < 1\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ,  $z_1 = \frac{1}{6}$ ,  $w_1 = 0$ ,  $\alpha = 0$ ;

20)  $G_1 = \{z : |z| < 1\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ,  $z_1 = \frac{1}{6}$ ,  $w_1 = 0$ ,  $\alpha = 0$ .



126. Выяснить, во что преобразуется область  $G$  при дробно-линейном отображении  $w = w(z)$ :

$$1) G = \{z : \operatorname{Im} z < 0, \operatorname{Re} z > 0\}, w = \frac{z - i}{z + i};$$

$$2) G = \{z : \operatorname{Im} z < 0, \operatorname{Re} z < 0\}, w = \frac{z - i}{z + i};$$

$$3) G = \{z : \operatorname{Im} z > 0, \operatorname{Re} z < 0\}, w = \frac{z - i}{z + i};$$

$$4) G = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z < 0\}, w = \frac{2z - i}{iz + 2};$$

$$5) G = \left\{z : 0 \arg z < \frac{\pi}{4}\right\}, w = \frac{z}{z + 1};$$

$$6) G = \left\{z : 0 \arg z < \frac{\pi}{4}\right\}, w = \frac{iz}{z - 1};$$

$$7) G = \{z : \operatorname{Re} z > 1\}, w = \frac{z - 1}{z};$$

$$8) G = \{z : \operatorname{Re} z > 1\}, w = \frac{z - 1}{z - 2};$$

$$9) G = \{z : \operatorname{Re} z < 0\}, w = \frac{z - 1}{z};$$

$$10) G = \{z : \operatorname{Re} z < 0\}, w = \frac{z - 1}{z - 2};$$

$$11) G = \{z : |z| < 1\}, w = \frac{z}{z - 1};$$

$$12) G = \{z : |z| > 2\}, w = \frac{z}{z - 1};$$

$$13) G = \{z : \operatorname{Re} z < 0\}, w = \frac{z + 3}{z - 3};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$14) G = \{z : |z| > 8\}, w = \frac{z + 8i}{z - 8i};$$

$$15) G = \{z : \operatorname{Re} z > 0\}, w = \frac{z + 6}{z - 6};$$

$$16) G = \{z : |z| < 7\}, w = \frac{z - 7}{z + 7i};$$

$$17) G = \{z : |z| > 5\}, w = \frac{z + 5i}{z - 5i};$$

$$18) G = \{z : 1 < |z| < 2\}, w = \frac{z}{z + 1};$$

$$19) G = \{z : 1 < |z| < 2\}, w = \frac{iz}{iz - 1};$$

$$20) G = \{z : \operatorname{Im} z < 0, \operatorname{Re} z < 0\}, w = \frac{z + i}{z - i}.$$



## 6.3. Задания для самостоятельной работы

127. Найти общий вид **дробно-линейного отображения**  $w = w(z)$ , переводящего **область**  $G_1$  в область  $G_2$ :

1)  $G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ ,  $G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\}$ ;

2)  $G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ ,  $G_2 = \{w : \operatorname{Im} w < 0\}$ ;

3)  $G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ ,  $G_2 = \{w : \operatorname{Re} w > 0\}$ ;

4)  $G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ ,  $G_2 = \{w : \operatorname{Re} w < 0\}$ ;

5)  $G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ;

6)  $G_1 = \{z : |z| < 1\}$ ,  $G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\}$ ;

7)  $G_1 = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ;

8)  $G_1 = \{z : \operatorname{Re} z > 0\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ;

9)  $G_1 = \{z : \operatorname{Re} z < 0\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ;

10)  $G_1 = \{z : |z| < 1\}$ ,  $G_2 = \{w : \operatorname{Re} w > 0\}$ .

128. Найти **дробно-линейное отображение**  $w = w(z)$  **области**  $G_1$  в область  $G_2$ , удовлетворяющее заданным условиям нормировки:

1)  $G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ,  $w(i) = 0$ ,  $w'(i) > 0$ ;

2)  $G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ ,  $G_2 = \{w : |w - i| < 2\}$ ,  $w(i) = 0$ ,  $w'(i) > 0$ ;

3)  $G_1 = \{z : \operatorname{Im} z < 0\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ,  $w(-i) = 0$ ,  $\arg w'(-i) = -\frac{\pi}{2}$ ;

4)  $G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ,  $w(2i) = 0$ ,  $\arg w'(2i) = 0$ ;



$$5) G_1 = \{z : |z| < 2\}, G_2 = \{w : \operatorname{Re} w > 0\}, w(0) = 1, \arg w'(0) = \frac{\pi}{2};$$

$$6) G_1 = \{z : |z - 4i| < 2\}, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > \operatorname{Re} w\}, w(4i) = -4, w(2i) = 0;$$

$$7) G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w < 0\}, w(i) = -i, \arg w'(i) = -\frac{\pi}{2};$$

$$8) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w| < 1\}, w\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \arg w'\left(\frac{1}{2}\right) = 0;$$

$$9) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \{w : |w - 1| < 1\}, w(0) = \frac{1}{2}, w(1) = 0;$$

$$10) G_1 = \{z : |z - 2| < 1\}, G_2 = \{w : |w - 2i| < 2\}, w(2) = i, \arg w'(2) = 0.$$

129. Отобразить круг  $G = \{z : |z| < 1\}$  в себя так, чтобы отрезок действительной оси

$$\{z : \operatorname{Im} z > 0, 0 < \operatorname{Re} z < a\}, \quad a < 1,$$

перешел в отрезок действительной оси, симметричный относительно начала координат.

130. Найти общий вид **дробно-линейного отображения**  $w = w(z)$ , отображающего круг  $\{z : |z| < R\}$  на себя, при следующих условиях:

1)  $w(a) = 0$ , где  $|a| < R$ ;

2)  $w(a) = b$ , где  $|a| < R$ ,  $|b| < R$ ;

3)  $w(R) = R$ .

131. Круг  $\{z : |z| < R\}$  отображается на себя так, что точка  $z_0 \neq 0$  переходит в центр круга. Доказать, что при этом единичная полуокружность отображается на полуокружность тогда и только тогда, когда ее концы лежат на диаметре, проходящем через точку  $z_0$ .



132. Построить **дробно-линейное отображение** круга  $\{z : |z| < 1\}$  на себя, при котором прообраз центра находится на действительной оси, а дуга

$$\left\{ z : 0 \leq \arg z \leq \frac{\pi}{2}, |z| = 1 \right\}$$

единичной окружности отображается в следующие дуги:

- 1)  $\left\{ z : 0 \leq \arg z \leq \frac{\pi}{2}, |z| = 1 \right\};$
- 2)  $\left\{ z : 0 \leq \arg z \leq \frac{\pi}{3}, |z| = 1 \right\};$
- 3)  $\left\{ z : \frac{\pi}{2} \leq \arg z \leq \frac{7\pi}{6}, |z| = 1 \right\}.$



## 6.4. Задания творческого характера

133. Показать, что **дробно-линейное преобразование** имеет одну неподвижную точку  $z_0$  (такое преобразование называется параболическим) тогда и только тогда, когда оно представимо в канонической форме

$$\frac{1}{w - z_0} = \frac{1}{z - z_0} + h, \quad z_0 \neq \infty$$

или

$$w = z + h, \quad z_0 = \infty.$$

134. **Дробно-линейное преобразование** с двумя различными неподвижными точками  $z_1$  и  $z_2$  в канонической форме имеет вид

$$\frac{w - z_1}{w - z_2} = k \frac{z - z_1}{z - z_2}, \quad z_1 \neq \infty, z_2 \neq \infty$$

$$w - z_1 = k(z - z_1), \quad z_2 = \infty.$$

Это преобразование называется гиперболическим, если  $k > 0$ , эллиптическим, если  $k = e^{i\alpha}$ ,  $\alpha \neq 0$ , и локсодромическим, если  $k = ae^{i\alpha}$ ,  $a \neq 1$ ,  $\alpha \neq 0$  ( $a, \alpha \in \mathbb{R}$  и  $a > 0$ ). Доказать следующие утверждения.

- 1) Общее дробно-линейное отображение

$$w = \frac{az + b}{cz + d}$$

можно привести к виду

$$w = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \quad \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} = 1.$$

- 2) Если  $\alpha + \delta$  — действительное число, то преобразование является эллиптическим, когда  $|\alpha + \delta| < 2$ , гиперболическим, когда  $|\alpha + \delta| > 2$ , и параболическим, когда  $|\alpha + \delta| = 2$ .





3) Если  $\operatorname{Im}(\alpha + \delta) \neq 0$ , то преобразование является локсодромическим.

4) Дробно-линейное преобразование

$$w = e^{i\lambda} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}, \quad a = |a|e^{i\alpha}, \quad |a| < 1,$$

переводящее круг  $\{z : |z| < 1\}$  в себя может быть только либо эллиптическим, либо параболическим, либо гиперболическим. Выяснить, при каких значениях  $a$  имеет место каждый из указанных случаев. Найти неподвижные точки этого преобразования и привести его к каноническому виду.

135. Доказать следующие свойства **гиперболического преобразования**.

- 1) Любая окружность, проходящая через две неподвижные точки, переходит сама в себя.
- 2) Любая окружность, ортогональная к окружности, проходящей через неподвижные точки, переходит в окружность, обладающую этим же свойством.

136. Доказать, что при **локсодромическом преобразовании**  $w = a e^{i\alpha} z$  логарифмическая спираль

$$r = A e^{\frac{\ln a}{\alpha} \varphi}, \quad A > 0,$$

переходит в себя.

137. Проверить, что множество всех дробно-линейных отображений, переводящих круг  $D = \{z : |z| < 1\}$  в себя, является подгруппой всех **дробно-линейное преобразований**  $\widehat{\mathbb{C}}$  на  $\widehat{\mathbb{C}}$ . Ее элементы представляются в виде

$$w = e^{i\theta} \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z}, \quad \operatorname{Im} \theta = 0, \quad |\alpha| < 1.$$

Присоединим к ним преобразования вида

$$\bar{w} = e^{-i\theta} \frac{z - \bar{\alpha}}{1 - \alpha\bar{z}}$$



и полученную таким образом совокупность обозначим через  $\Lambda$ . Проверить, что  $\Lambda$  также является группой.

А. Пуанкаре предложил рассматривать круг  $D$  как плоскость Лобачевского, а отображения группы  $\Lambda$  — как движение в плоскости Лобачевского. Для этой модели все аксиомы геометрии Лобачевского выполняются, если за модели прямых Лобачевского принять дуги окружностей и отрезки прямых (диаметры окружностей), содержащихся в  $D$  и ортогональных к единичной окружности. Угол между двумя прямыми в этой модели измеряется (по определению) тем же числом, что и угол в евклидовой геометрии. Это полностью согласуется со **свойством конформности** дробно-линейного отображения.

Доказать, что в геометрии Лобачевского сумма углов любого треугольника меньше  $\pi$ .

138. Пусть даны два произвольных треугольника на модели Пуанкаре геометрии Лобачевского с попарно равными углами. Доказать, что они конгруэнтны, т.е. их можно совместить посредством некоторого движения.



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 7

# Функция Жуковского

- 7.0. Некоторые предварительные замечания
- 7.1. Задания для аудиторной работы
- 7.2. Базовые индивидуальные задания
- 7.3. Задания для самостоятельной работы
- 7.4. Задания творческого характера



## 7.0. Некоторые предварительные замечания

Функция

$$w = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right)$$

называется *функцией Жуковского*.

При этом

$$w(0) = \infty, \quad w(\infty) = \infty.$$

Так как

$$w(z) = w\left(\frac{1}{z}\right),$$

то множества значений, принимаемые функцией Жуковского внутри и вне единичного круга, одинаковы.

Функция Жуковского взаимно однозначно отображает как внутренность, так и внешность круга  $|z| < 1$  на внешность отрезка  $-1 \leq u \leq 1$  действительной оси.

Окружности  $|z| = r$  отображаются на эллипсы с фокусами  $\pm 1$  и полуосями  $\frac{1}{2} \left( r \pm \frac{1}{r} \right)$ .

Пары диаметров, симметричных относительно координатных осей, составленных из радиусов  $z = \pm r e^{i\alpha}$ ,  $0 \leq r < 1$ , отображаются на гиперболы с фокусами  $\pm 1$  и полуосями  $|\cos \alpha|$ ,  $|\sin \alpha|$  с исключением вершин этих гипербол.

Отображение функцией Жуковского является **конформным** во всей расширенной комплексной плоскости за исключением точек  $\pm 1$ .



## 7.1. Задания для аудиторной работы

139. Найти образ множества  $E$  при отображении с помощью функции Жуковского, если:

1)  $E = \left\{ z : \arg z = \frac{\pi}{4} \right\};$  [Ответ]

2)  $E = \left\{ z : \arg z = \frac{\pi}{2} \right\};$  [Ответ]

3)  $E = \{ z : \arg z = \pi \};$  [Ответ]

4)  $E = \{ z : |z| = R < 1 \};$  [Ответ]

5)  $E = \{ z : |z| = R > 1 \};$  [Ответ]

6)  $E = \{ z : |z| = 1 \}.$  [Решение] [Ответ]

140. Найти область, на которую функция Жуковского отображает множество  $G$ :

1)  $G = \left\{ z : |z| < \frac{1}{2} \right\};$  [Ответ]

2)  $G = \{ z : |z| > 2 \};$  [Ответ]

3)  $G = \{ z : \operatorname{Im} z > 0 \};$  [Ответ]

4)  $G = \{ z : \operatorname{Im} z < 0 \};$  [Ответ]

5)  $G = \{ z : |z| < 1 \};$  [Ответ]

6)  $G = \{ z : |z| > 1 \}.$  [Решение] [Ответ]



141. Найти образ области  $G$  при отображении с помощью функции Жуковского, если:

1)  $G = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z < 0\};$  [Ответ]

2)  $G = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\};$  [Ответ]

3)  $G = \{z : |z| > 1, \operatorname{Im} z > 0\};$  [Ответ]

4)  $G = \{z : 1 < |z| < R, \operatorname{Im} z > 0\};$  [Ответ]

5)  $G = \{z : R < |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\};$  [Ответ]

6)  $G = \left\{z : \frac{\pi}{4} < \arg z < \frac{3\pi}{4}\right\}.$  [Решение] [Ответ]

142. Найти образ области  $G$  при отображении с помощью функции Жуковского, если:

1)  $G = \{z : |z| < 1\} \setminus \left[-\frac{1}{5}, 1\right];$  [Ответ]

2)  $G = \left\{z : \frac{1}{4} < |z| < 1\right\} \setminus \{z : \operatorname{Im} z > 0\};$  [Ответ]

3)  $G = \{z : 1 < |z| < 5\} \setminus \{z : \operatorname{Im} z > 0\};$  [Ответ]

4)  $G = \{z : 1 < |z| < 2\} \setminus \{z : \operatorname{Im} z < 0\};$  [Ответ]

5)  $G = \{z : |z| > 1\} \setminus \{z : z \in [-6, -1] \cup [1, +\infty)\};$  [Ответ]

6)  $G = \{z : |z| < 1\} \setminus \left[-\frac{1}{2}, 1\right].$  [Решение] [Ответ]

143. Используя свойства функции Жуковского отобразить область  $G_1$  на область  $G_2$ , если:

1)  $G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left\{[-1, 0] \cup \left[\frac{1}{4}, 1\right]\right\}, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$  [Ответ]

2)  $G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left[-1, -\frac{1}{4}\right], G_2 = \{w : |w| < 1\};$  [Ответ]



Меню

Часть II. Задачи

Глава 7. Функция Жуковского

7.1. Задания для аудиторной работы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

3)  $G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left\{ [-1, 0] \cup \left[ \frac{1}{3}, 1 \right] \right\}$ ,  $G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\}$ ; [Ответ]

4)  $G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left[ -\frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right]$ ,  $G_2 = \{w : \operatorname{Re} w > 0\}$ ; [Ответ]

5)  $G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left[ -1, -\frac{1}{10} \right]$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ; [Ответ]

6)  $G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left[ \frac{1}{3}, 1 \right]$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ . [Решение] [Ответ]



## 7.2. Базовые индивидуальные задания

144. Найти образ области  $G$  при отображении с помощью функции Жуковского, если:

$$1) G = \left\{ z : |z| < \frac{1}{5} \right\};$$

$$2) G = \left\{ z : |z| < \frac{1}{8} \right\};$$

$$3) G = \{z : |z| > 5\};$$

$$4) G = \{z : |z| > 6\};$$

$$5) G = \left\{ z : |z| < \frac{1}{4} \right\};$$

$$6) G = \{z : |z| > 9\};$$

$$7) G = \left\{ z : |z| < \frac{1}{6} \right\};$$

$$8) G = \{z : |z| > 3\};$$

$$9) G = \left\{ z : |z| < \frac{1}{6} \right\};$$

$$10) G = \{z : |z| > 6\};$$

$$11) G = \{z : |z| > 8\};$$

$$12) G = \{z : |z| > 2\};$$

$$13) G = \left\{ z : |z| < \frac{1}{9} \right\};$$





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$14) G = \{z : |z| > 7\};$$

$$15) G = \{z : |z| > 5\};$$

$$16) G = \{z : |z| > 4\};$$

$$17) G = \left\{z : |z| < \frac{1}{7}\right\};$$

$$18) G = \left\{z : |z| < \frac{1}{3}\right\};$$

$$19) G = \left\{z : |z| < \frac{1}{5}\right\};$$

$$20) G = \left\{z : |z| < \frac{1}{2}\right\}.$$

145. Найти образ множества  $E$  при отображении с помощью функции Жуковского, если:

$$1) E = \left\{z : \arg z = \frac{7\pi}{6}\right\};$$

$$2) E = \left\{z : \arg z = \frac{3\pi}{4}\right\};$$

$$3) E = \left\{z : \arg z = \frac{7\pi}{4}\right\};$$

$$4) E = \left\{z : \arg z = \frac{\pi}{3}\right\};$$

$$5) E = \left\{z : \arg z = \frac{\pi}{2}\right\};$$

$$6) E = \left\{z : \arg z = \frac{4\pi}{3}\right\};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$7) E = \left\{ z : \arg z = \frac{3\pi}{2} \right\};$$

$$8) E = \left\{ z : \arg z = \frac{5\pi}{6} \right\};$$

$$9) E = \left\{ z : \arg z = \frac{11\pi}{6} \right\};$$

$$10) E = \{ z : \arg z = 0 \};$$

$$11) E = \left\{ z : \arg z = \frac{\pi}{4} \right\};$$

$$12) E = \left\{ z : \arg z = \frac{2\pi}{3} \right\};$$

$$13) E = \left\{ z : \arg z = \frac{5\pi}{4} \right\};$$

$$14) E = \{ z : \arg z = \pi \};$$

$$15) E = \left\{ z : \arg z = \frac{\pi}{4} \right\};$$

$$16) E = \left\{ z : \arg z = \frac{5\pi}{3} \right\};$$

$$17) E = \left\{ z : \arg z = \frac{7\pi}{6} \right\};$$

$$18) E = \left\{ z : \arg z = \frac{3\pi}{4} \right\};$$

$$19) E = \left\{ z : \arg z = \frac{\pi}{2} \right\};$$

$$20) E = \{ z : \arg z = 0 \}.$$



146. Используя свойства функции Жуковского отобразить область  $G_1$  на область  $G_2$ , если:

$$1) G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left[ \frac{1}{3}, 1 \right], G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$$

$$2) G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left\{ [-1, 0] \cup \left[ \frac{1}{2}, 1 \right] \right\}, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$$

$$3) G_1 = \{z : |z| > 1\} \setminus \{[-4, -1] \cup [1, +\infty)\}, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$$

$$4) G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\} \setminus \left\{ z : |z| < \frac{1}{6} \right\}, G_2 = \{w : |w| < 1\};$$

$$5) G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left[ -1, -\frac{1}{5} \right], G_2 = \{w : |w| < 1\};$$

$$6) G_1 = \{z : |z| > 1\} \setminus \{[-8, -1] \cup [1, +\infty)\}, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$$

$$7) G_1 = \{z : |z| > 1\} \setminus [1, 2], G_2 = \{w : \operatorname{Im} w < 0\};$$

$$8) G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left\{ \left[ -1, -\frac{1}{2} \right] \cup \left[ \frac{1}{2}, 1 \right] \right\}, G_2 = \{w : |w| < 1\};$$

$$9) G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left\{ \left[ -1, -\frac{1}{3} \right] \cup \left[ \frac{1}{4}, 1 \right] \right\}, G_2 = \{w : |w| < 1\};$$

$$10) G_1 = \{z : |z| > 1\} \setminus [-4, -1], G_2 = \{w : \operatorname{Im} w < 0\};$$

$$11) G_1 = \mathbb{C} \setminus [-8, 8], G_2 = \{w : |w| > 1\};$$

$$12) G_1 = \{z : |z| > 1\} \setminus \{[-5, -1] \cup [1, +\infty)\}, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w < 0\};$$

$$13) G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left[ -1, -\frac{1}{8} \right], G_2 = \{w : |w| < 1\};$$

$$14) G_1 = \mathbb{C} \setminus [-4, 1], G_2 = \{w : |w| > 1\};$$

$$15) G_1 = \mathbb{C} \setminus [-5, 5], G_2 = \{w : |w| < 1\};$$



Меню

Часть II. Задачи

Глава 7. Функция Жуковского

7.2. Базовые индивидуальные задания



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$16) G_1 = \{z : |z| < 10\} \setminus \{[-10, 1] \cup [5, 10]\}, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$$

$$17) G_1 = \{z : |z| < 6\} \setminus \{[-6, 1] \cup [3, 6]\}, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w < 0\};$$

$$18) G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left[-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right], G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$$

$$19) G_1 = \{z : |z| < 20\} \setminus \{[-20, 1] \cup [10, 20]\}, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w < 0\};$$

$$20) G_1 = \{z : |z| > 1\} \setminus [-10, -1], G_2 = \{w : |w| > 1\}.$$



## 7.3. Задания для самостоятельной работы

147. Используя свойства функции Жуковского отобразить область  $G_1$  на область  $G_2$ , если:

$$1) G_1 = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\} \setminus \left[\frac{1}{2}i, i\right], G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$$

$$2) G_1 = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z < 0\} \setminus \left[-\frac{1}{3}i, i\right], G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$$

$$3) G_1 = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\} \setminus \left[\frac{1}{4}i, i\right], G_2 = \{w : \operatorname{Im} w < 0\};$$

$$4) G_1 = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\} \setminus \left[0, \frac{1}{2}i\right], G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$$

$$5) G_1 = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z < 0\} \setminus \left[0, -\frac{1}{3}i\right], G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$$

$$6) G_1 = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\} \setminus [0, \alpha i], 0 < \alpha < 1, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$$

$$7) G_1 = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\} \setminus [\alpha i, i], 0 < \alpha < 1, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w < 0\};$$

$$8) G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left[\frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{\pi}{4}}\right], G_2 = \{w : |w| < 1\};$$

$$9) G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \left[\frac{1}{4}e^{i\frac{\pi}{3}}, e^{i\frac{\pi}{3}}\right], G_2 = \{w : |w| < 1\};$$

$$10) G_1 = \{z : |z| > 1\} \setminus \left[e^{i\frac{\pi}{6}}, 4e^{i\frac{\pi}{6}}\right], G_2 = \{w : |w| > 1\};$$

$$11) G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus [(1-h)e^{i\alpha}, e^{i\alpha}], G_2 = \{w : |w| < 1\} (0 < h < 1);$$

$$12) G_1 = \{z : |z| > 1\} \setminus [e^{i\alpha}, h e^{i\alpha}], G_2 = \{w : |w| < 1\} (h > 1);$$



$$13) G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \{-1, -b\} \cup [a, 1\} \quad (0 < a < 1, 0 < b < 1), G_2 = \{w : |w| < 1\};$$

$$14) G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\} \setminus \left\{z = x + iy : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1, y > 0\right\}, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$$

$$15) G_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\} \setminus \left\{z = x + iy : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, y > 0\right\}, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$$

$$16) G_1 = \mathbb{C} \setminus [-c, c] \quad (c > 0), G_2 = \{w : |w| > 1\};$$

$$17) G_1 = \left\{z = x + iy : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} > 1\right\}, G_2 = \{w : |w| > 1\};$$

$$18) G_1 = \{z : |z| < 1\}, G_2 = \mathbb{C} \setminus \left\{\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)\right\};$$

$$19) G_1 = \{z : |z| > 1\} \setminus \{-a, -1\} \cup [1, +\infty) \quad (a > 1), G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\};$$

$$20) G_1 = \{z : |z| < 1\} \setminus \{-1, 0\} \cup [a, 1\} \quad (0 < a < 1), G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\}.$$



## 7.4. Задания творческого характера

### 148. Область

$$G = \{z : |z| < 1\} \setminus \{[-1, -b] \cup [a, 1]\} \quad (0 < a < 1, 0 < b < 1)$$

отобразить на круг  $\{w : |w| < 1\}$  так, чтобы  $w(0) = 0$ ,  $w'(0) > 0$ . Определить  $w'(0)$  и длины дуг, соответствующих разрезам.

### 149. Представив функцию Жуковского в виде

$$\frac{w-1}{w+1} = \left(\frac{z-1}{z+1}\right)^2,$$

найти:

- образ окружности  $\Gamma$ , проходящей через точки  $z = \pm 1$  и образующей угол  $\alpha$  ( $-\pi < \alpha < \pi$ ) с действительной осью в точке  $z = 1$ . Определить область, на которую отображается внешность такой окружности;
  - образ окружности  $\Gamma_1$ , проходящей через точку  $z = 1$  под углом  $\alpha$  ( $-\pi < \alpha < \pi$ ) к действительной оси и содержащей внутри точку  $-1$ . Определить область, на которую отображается внешность такой окружности.
150. Отобразить внешность единичного круга  $G_1 = \{z : |z| < 1\}$  на область

$$G_2 = \mathbb{C} \setminus \left\{ w : \arg \frac{w-1}{w+1} = \beta \right\} \quad (0 < |\beta| < \pi)$$

так, чтобы  $w(\infty) = \infty$ ,  $\arg w'(\infty) = \alpha$ .



151. Отобразить на верхнюю полуплоскость и на внешность единичного круга **область**

$$G = \mathbb{C} \setminus \{[-a, b] \cup [-ci, ci]\} \quad (a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0, a^2 + b^2 + c^2 \neq 0).$$

152. Отобразить на верхнюю полуплоскость внешность единичного круга с разрезами по отрезкам:  $[i, bi]$ ,  $[-bi, i]$ ,  $[1, a]$ ,  $[-a, -1]$  ( $a > 1$ ,  $b > 1$ ).

153. Отобразить на верхнюю полуплоскость внутренность правой ветви гиперболы

$$\frac{x^2}{\cos^2 \alpha} - \frac{y^2}{\sin^2 \alpha} = 1.$$

154. Отобразить на верхнюю полуплоскость внешность правой ветви гиперболы

$$\frac{x^2}{\cos^2 \alpha} - \frac{y^2}{\sin^2 \alpha} = 1.$$

155. Отобразить на верхнюю полуплоскость **область**, заключенную между ветвями гиперболы

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

156. Отобразить на верхнюю полуплоскость плоскость с разрезами по лучу  $[-a, +\infty)$  ( $a > 0$ ) и по отрезку  $[-ci, ci]$  ( $c > 0$ ).

157. Отобразить на верхнюю полуплоскость плоскость с разрезами по отрезку  $[-1, b]$  ( $b > -1$ ) и по дуге окружности с концами в точках  $e^{\pm i\alpha}$ , проходящей через точку  $z = -1$  (см. **рисунок 7.1**).





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран




Рис. 7.1



## Глава 8

# Отображение с помощью элементарных функций. Интеграл Кристоффеля – Шварца. Отображение полуплоскости на треугольник.

- 8.1. Задания для аудиторной работы
- 8.2. Базовые индивидуальные задания
- 8.3. Задания для самостоятельной работы
- 8.4. Задания творческого характера



## 8.1. Задания для аудиторной работы

158. Найти образы  $w_1(D_1)$ ,  $w_2(D_1)$ ,  $w_3(D_3)$ , если  $w_1 = z^2$ ,  $w_2 = z^3$ ,  $w_3 = z^4$ , а области  $D_i$ ,  $i = 1, 2, 3$ , определены следующими равенствами:

$$1) D_1 = \{z : 1 < |z| < 2, \operatorname{Im} z > 0\} \setminus \left[\frac{3}{2}i, 2i\right], D_2 = \left\{z : -\frac{\pi}{3} < \arg z < \frac{\pi}{3}, |z| < 4\right\}, \\ D_3 = \left\{z : -\frac{\pi}{4} < \arg z < \frac{\pi}{4}, |z| < 2\right\}; \quad \text{[Решение] [Ответ]}$$

$$2) D_1 = \{z : \operatorname{Re} z < 0\} \setminus [-6, -3], D_2 = \left\{z : 0 < \arg z < \frac{\pi}{15}, 5 < |z| < 10\right\}, D_3 = \left\{z : 0 < \arg z < \frac{\pi}{2}\right\}. \\ \text{[Ответ]}$$

159. Найти образы  $w_1(D_1)$ ,  $w_2(D_1)$ , если  $w_1 = e^z$ ,  $w_2 = \ln z$  (главная ветвь логарифма, т.е.  $\ln z = \ln |z| + i \arg z$ ,  $\arg z \in (-\pi, \pi]$ ), а области  $D_i$ ,  $i = 1, 2$ , определены следующими равенствами:

$$1) D_1 = \left\{z : 2 < \operatorname{Re} z < 4, \frac{\pi}{6} < \operatorname{Im} z < \frac{\pi}{3}\right\}, D_2 = \{z : 1 < |z| < e, 0 < \arg z < \pi\}; \quad \text{[Решение] [Ответ]}$$

$$2) D_1 = \left\{z : \ln 4 < \operatorname{Re} z < \ln 8, \frac{\pi}{12} < \operatorname{Im} z < \frac{\pi}{3}\right\}, D_2 = \left\{z : e < |z| < 6, 0 < \arg z < \frac{\pi}{2}\right\}; \quad \text{[Ответ]}$$

$$3) D_1 = \left\{z : 0 < \operatorname{Re} z < \ln 2, \frac{\pi}{6} < \operatorname{Im} z < \frac{\pi}{3}\right\}, D_2 = \left\{z : 1 \leq |z| \leq e, 0 \leq \arg z \leq \frac{\pi}{2}\right\}. \quad \text{[Ответ]}$$

160. Найти образ области  $D$  при отображении  $w = f(z)$ :

$$1) w = \cos z, D = \left\{z : -\frac{\pi}{2} < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{2}, \operatorname{Im} z > 0\right\}; \quad \text{[Решение] [Ответ]}$$

$$2) w = \cos z, D = \{z : 0 < \operatorname{Re} z < \pi, \operatorname{Im} z < 0\}; \quad \text{[Ответ]}$$

$$3) w = \operatorname{tg} z, D = \left\{z : -\frac{\pi}{4} < \arg z < \frac{\pi}{4}\right\}; \quad \text{[Ответ]}$$

$$4) w = \operatorname{ch} z, D = \{z : 0 < \operatorname{Im} z < \pi, \operatorname{Re} z > 0\}; \quad \text{[Ответ]}$$

$$5) w = \operatorname{sh} z, D = \left\{z : \operatorname{Re} z > 0, |\operatorname{Im} z| < \frac{\pi}{2}\right\}; \quad \text{[Ответ]}$$

$$6) w = \cos z, D = \{z : 0 < \operatorname{Im} z < \pi\}. \quad \text{[Ответ]}$$



161. Найти конформное и однолистное отображение области  $G_1$  на область  $G_2$ :

1)  $G_1 = \{z : 6 < \operatorname{Re} z < 12\}$ ,  $G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\}$ ; [Решение] [Ответ]

2)  $G_1 = \left\{z : 0 < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{6}\right\}$ ,  $G_2 = \left\{w : 0 < \arg w < \frac{\pi}{2}\right\}$ ; [Ответ]

3)  $G_1 = \left\{e^{i\frac{\pi}{4}}z : 0 < \operatorname{Im} z < 2\right\}$ ,  $G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\}$ ; [Ответ]

4)  $G_1 = \{z : |z| = 3\}$ ,  $G_2 = \left\{w = u + iv : \frac{u^2}{\left(\frac{5}{3}\right)^2} + \frac{v^2}{\left(\frac{4}{3}\right)^2} = 1\right\}$ ; [Ответ]

5)  $G_1 = \left\{z : 0 < \arg z < \frac{\pi}{4}\right\}$ ,  $G_2 = \{w : |w| < 1\}$ ; [Ответ]

6)  $G_1 = \{z : 1 < |z| < e, 0 < \arg z < e\}$ ,  $G_2 = \{w : 2 < \operatorname{Re} w < 3, 0 < \operatorname{Im} w < e\}$ . [Ответ]

162. Отобразить с помощью интеграла Кристоффеля – Шварца верхнюю полуплоскость на треугольник с вершинами в точках  $A$ ,  $B$  и  $C$ :

1)  $A(0, 0)$ ,  $B(1, 0)$ ,  $C\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ; [Ответ]

2)  $A(2, 0)$ ,  $B(3, 0)$ ,  $C\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ; [Ответ]

3)  $A(0, 0)$ ,  $B(0, 1)$ ,  $C(1, 0)$ ; [Ответ]

4)  $A(0, 0)$ ,  $B(1, 1)$ ,  $C(1, 0)$ ; [Ответ]

5)  $A(0, 1)$ ,  $B(1, 1)$ ,  $C\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ ; [Ответ]

6)  $A(1, 1)$ ,  $B(3, 3)$ ,  $C(-1, 3)$ . [Решение] [Ответ]



## 8.2. Базовые индивидуальные задания

163. Найти образ  $w(D)$  при отображении  $w = f(z)$  области  $D$ :

1)  $w = z^2$ ,  $D = \{z : |z| < 1, \operatorname{Re} z > 0\} \setminus \left[0, \frac{1}{2}\right]$ ;

2)  $w = z^3$ ,  $D = \left\{z : 0 < \arg z < \frac{\pi}{15}, 5 < |z| < 10\right\}$ ;

3)  $w = z^2$ ,  $D = \{z : \operatorname{Re} z > 0\} \setminus [3, 6]$ ;

4)  $w = z^4$ ,  $D = \left\{z : -\frac{\pi}{4} < \arg z < \frac{\pi}{4}, |z| < 4\right\}$ ;

5)  $w = z^2$ ,  $D = \{z : |z| < 4, \operatorname{Re} z > 0\} \setminus [0, 2]$ ;

6)  $w = z^5$ ,  $D = \left\{z : 0 < \arg z < \frac{\pi}{20}, 4 < |z| < 8\right\}$ ;

7)  $w = z^2$ ,  $D = \{z : \operatorname{Im} z > 0\} \setminus [0, 10i]$ ;

8)  $w = z^5$ ,  $D = \left\{z : 2 < \arg z < 2 + \frac{2\pi}{5}\right\}$ ;

9)  $w = z^2$ ,  $D = \{z : |z| < 2, \operatorname{Im} z > 0\} \setminus [i, 2i]$ ;

10)  $w = z^2$ ,  $D = \{z : |z| < 5, \operatorname{Re} z > 0\} \setminus \left[0, \frac{5}{2}\right]$ ;

11)  $w = z^4$ ,  $D = \left\{z : 0 < \arg z < \frac{\pi}{12}, 3 < |z| < 6\right\}$ ;

12)  $w = z^2$ ,  $D = \{z : \operatorname{Im} z > 0\} \setminus [0, 2i]$ ;

13)  $w = z^3$ ,  $D = \left\{z : 0 < \arg z < \frac{2\pi}{3}\right\}$ ;



$$14) w = z^2, D = \{z : 4 < |z| < 8, \operatorname{Im} z > 0\} \setminus [6i, 8i];$$

$$15) w = z^3, D = \left\{z : \frac{\pi}{3} < \arg z < \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right\};$$

$$16) w = z^3, D = \left\{z : \frac{\pi}{6} < \arg z < \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}\right\};$$

$$17) w = z^2, D = \{z : \operatorname{Re} z < 0\} \setminus [-10, -5];$$

$$18) w = z^4, D = \left\{z : 0 < \arg z < \frac{\pi}{8}, 2 < |z| < 4\right\};$$

$$19) w = z^4, D = \left\{z : -\frac{\pi}{4} < \arg z < \frac{\pi}{4}, |z| < 2\right\};$$

$$20) w = z^5, D = \left\{z : 0 < \arg z < \frac{\pi}{30}, 1 < |z| < 2\right\}.$$

164. Найти образ  $w(D)$  при отображении  $w = f(z)$  области  $D$  ( $\ln z = \ln |z| + i \arg z$ ,  $\arg z \in (-\pi, \pi]$ ):

$$1) w = \ln z, D = \{z : e^3 < |z| < e^4, 0 < \arg z < \pi\};$$

$$2) w = \ln z, D = \left\{z : 1 < |z| < e^2, 0 < \arg z < \frac{\pi}{2}\right\};$$

$$3) w = e^z, D = \{z : 1 < \operatorname{Re} z < 3, -1 < \operatorname{Im} z < 0\};$$

$$4) w = e^z, D = \left\{z : \frac{\pi}{3} < \operatorname{Im} z < \frac{\pi}{3} + \pi\right\};$$

$$5) w = i \ln z, D = \left\{z : 1 < |z| < e, 0 < \arg z < \frac{\pi}{4}\right\};$$

$$6) w = e^z, D = \left\{z : 0 < \operatorname{Re} z < 1, \frac{\pi}{3} < \operatorname{Im} z < \frac{\pi}{2}\right\};$$

$$7) w = e^z, D = \left\{z : \ln 2 < |z| < \ln 4, \frac{\pi}{3} < \operatorname{Im} z < \frac{\pi}{2}\right\};$$

$$8) w = \ln z, D = \{z : 0 < \arg z < \pi\};$$



$$9) w = \ln z, D = \left\{ z : |z| < 1, 0 < \arg z < \frac{\pi}{2} \right\};$$

$$10) w = e^z, D = \left\{ z : \frac{\pi}{3} < \operatorname{Im} z < \pi \right\};$$

$$11) w = e^z, D = \left\{ e^{i\frac{\pi}{4}} z : 0 < \operatorname{Im} z < 2\pi \right\};$$

$$12) w = \ln z, D = \left\{ z : |z| < 1, \frac{\pi}{4} < \arg z < \frac{\pi}{2} \right\};$$

$$13) w = \ln z, D = \{ z : 1 < |z| < 2 \} \setminus [1, 2];$$

$$14) w = e^z, D = \left\{ z : \operatorname{Re} z < 0, 0 < \operatorname{Im} z < \frac{\pi}{2} \right\};$$

$$15) w = e^z, D = \{ z : \operatorname{Re} z > 0, 0 < \operatorname{Im} z < \pi \};$$

$$16) w = \ln z, D = \{ z : 1 < |z| < e \} \setminus [1, e];$$

$$17) w = \ln z, D = \left\{ z : |z| = e, 0 < \arg z < \frac{\pi}{4} \right\};$$

$$18) w = e^{2z}, D = \left\{ z : \operatorname{Re} z < 0, 0 < \operatorname{Im} z < \frac{\pi}{4} \right\};$$

$$19) w = e^z, D = \{ z : \operatorname{Re} z > 1, 0 < \operatorname{Im} z < 2\pi \};$$

$$20) w = i \ln z, D = \left\{ z : 1 < |z| < e, 0 < \arg z < \frac{\pi}{3} \right\}.$$

165. Найти образ  $w(D)$  при отображении  $w = f(z)$  области  $D$ :

$$1) w = \cos z, D = \{ z : 0 < \operatorname{Re} z < \pi, \operatorname{Im} z < 0 \};$$

$$2) w = \cos z, D = \left\{ z : 0 < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{2}, \operatorname{Im} z > 0 \right\};$$

$$3) w = \cos z, D = \left\{ z : -\frac{\pi}{2} < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{2}, \operatorname{Im} z > 0 \right\};$$

$$4) w = \cos z, D = \{ z : 0 < \operatorname{Re} z < \pi \};$$



$$5) w = \cos z, D = \left\{ z : 0 < \operatorname{Re} z < \pi, -\frac{\pi}{4} < \operatorname{Im} z < \frac{\pi}{4} \right\};$$

$$6) w = \operatorname{ch} z, D = \{ z : 0 < \operatorname{Im} z < \pi \};$$

$$7) w = \operatorname{ch} z, D = \{ z : \operatorname{Re} z > 0, 0 < \operatorname{Im} z < \pi \};$$

$$8) w = \operatorname{ch} z, D = \{ z : \operatorname{Re} z < 0, 0 < \operatorname{Im} z < \pi \};$$

$$9) w = \sin z, D = \left\{ z : 0 < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{2} \right\};$$

$$10) w = \operatorname{tg} z, D = \{ z : \operatorname{Im} z = 5 \};$$

$$11) w = \operatorname{tg} z, D = \left\{ z : 0 < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{4} \right\};$$

$$12) w = \operatorname{th} z, D = \{ z : 0 < \operatorname{Re} z < \pi \};$$

$$13) w = \operatorname{tg} z, D = \{ z : \operatorname{Re} z = 4 \};$$

$$14) w = \operatorname{tg} z, D = \{ z : 0 < \operatorname{Re} z < \pi, \operatorname{Im} z > 0 \};$$

$$15) w = \operatorname{cth} z, D = \{ z : 0 < \operatorname{Im} z < \pi \};$$

$$16) w = \operatorname{cth} z, D = \{ z : \operatorname{Re} z > 0, 0 < \operatorname{Im} z < \pi \};$$

$$17) w = \sin z, D = \left\{ z : \operatorname{Re} z = \frac{\pi}{2} \right\};$$

$$18) w = \sin z, D = \{ z : \operatorname{Re} z = \pi \};$$

$$19) w = \sin z, D = \{ z : \operatorname{Im} z = 0 \};$$

$$20) w = \sin z, D = \left\{ z : \operatorname{Im} z = \frac{\pi}{2} \right\}.$$

166. Найти конформное и однолистное отображение области  $G_1$  на область  $G_2$ :

$$1) G_1 = \{ z : |z| > 1 \} \setminus [1, 10], G_2 = \{ w : \operatorname{Re} w > 0 \};$$

$$2) G_1 = \{ z : |z - 10i| < 10, |z - 5i| > 5 \}, G_2 = \{ w : \operatorname{Re} w > 0 \};$$





- 3)  $G_1 = \left\{ z : 0 < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{6} \right\}$ ,  $G_2 = \left\{ w : 0 < \arg w < \frac{\pi}{2} \right\}$ ;
- 4)  $G_1 = \{ z : |z - 2| < 2, |z - 1| > 1 \}$ ,  $G_2 = \{ w : 0 < \operatorname{Re} w < 1 \}$ ;
- 5)  $G_1 = \{ z : |z| > 1 \} \setminus \{ [-2, -1] \cup [1, +\infty) \}$ ,  $G_2 = \{ w : \operatorname{Im} w < 0 \}$ ;
- 6)  $G_1 = \{ z : |z - 2i| < 2, |z - 2| < 2 \}$ ,  $G_2 = \{ w : \operatorname{Im} w > 0 \}$ ;
- 7)  $G_1 = \left\{ z : |z| < 8, 0 < \arg z < \frac{\pi}{4} \right\}$ ,  $G_2 = \{ w : \operatorname{Re} w > 0 \}$ ;
- 8)  $G_1 = \left\{ z : 0 < \operatorname{Re} z < \frac{\pi}{3} \right\}$ ,  $G_2 = \left\{ w : -\frac{\pi}{2} < \arg w < 0 \right\}$ ;
- 9)  $G_1 = \{ z : |z - 4| < 4, |z - 2| > 2 \}$ ,  $G_2 = \{ w : 0 < \operatorname{Re} w < 1 \}$ ;
- 10)  $G_1 = \{ z : 1 < \operatorname{Re} z < 2 \}$ ,  $G_2 = \{ w : \operatorname{Re} w < 0 \}$ ;
- 11)  $G_1 = \{ z : |z| < 2, |z - 1| > 1 \}$ ,  $G_2 = \{ w : \operatorname{Im} w > 0 \}$ ;
- 12)  $G_1 = \{ z : |z| < 6 \} \setminus \{ [-6, 1] \cup [3, 6] \}$ ,  $G_2 = \{ w : \operatorname{Im} w > 0 \}$ ;
- 13)  $G_1 = \left\{ z : |z| < 2, 0 < \arg z < \frac{\pi}{4} \right\}$ ,  $G_2 = \{ w : \operatorname{Re} w > 0 \}$ ;
- 14)  $G_1 = \{ z : |z| < 2 \}$ ,  $G_2 = \mathbb{C} \setminus (0, +\infty)$ ;
- 15)  $G_1 = \{ z : \operatorname{Im} z > 0 \} \setminus [0, 3i]$ ,  $G_2 = \{ w : \operatorname{Im} w < 0 \}$ ;
- 16)  $G_1 = \{ z : |z| < 1 \} \setminus \left\{ [-1, 0] \cup \left[ \frac{1}{6}, 1 \right] \right\}$ ,  $G_2 = \{ w : \operatorname{Im} w > 0 \}$ ;
- 17)  $G_1 = \{ z : |z| < 3, \operatorname{Im} z > 0 \}$ ,  $G_2 = \{ w : \operatorname{Re} w > 0 \}$ ;
- 18)  $G_1 = \left\{ z : |z| < 2, 0 < \arg z < \frac{\pi}{3} \right\}$ ,  $G_2 = \{ w : \operatorname{Im} w > 0 \}$ ;
- 19)  $G_1 = \left\{ e^{i\frac{\pi}{4}} z : 0 < \operatorname{Im} z < 8 \right\}$ ,  $G_2 = \{ w : \operatorname{Re} w > 0 \}$ ;
- 20)  $G_1 = \{ z : \operatorname{Im} z > 0 \} \setminus \left\{ z : |z| < \frac{1}{7} \right\}$ ,  $G_2 = \{ w : |w| < 1 \}$ .



167. С помощью интеграла Кристоффеля – Шварца отобразить верхнюю полуплоскость на треугольник с вершинами в точках  $A$ ,  $B$  и  $C$ :

1)  $A(0, 1)$ ,  $B(0, 5)$ ,  $C(2, 3)$ ;

2)  $A(0, 0)$ ,  $B(0, 1)$ ,  $C(-3, 2)$ ;

3)  $A(2, 2)$ ,  $B(3, 3)$ ,  $C(2, 3)$ ;

4)  $A(2, 0)$ ,  $B(6, 0)$ ,  $C(2, 4)$ ;

5)  $A(-1, 0)$ ,  $B(-1, 1)$ ,  $C\left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ;

6)  $A(1, -1)$ ,  $B(2, 0)$ ,  $C(2, 1)$ ;

7)  $A(1, -1)$ ,  $B(3, -3)$ ,  $C(3, 1)$ ;

8)  $A(1, 1)$ ,  $B(2, 1)$ ,  $C\left(\frac{3}{2}, 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ;

9)  $A(0, -1)$ ,  $B(1, -1)$ ,  $C\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right)$ ;

10)  $A(0, -2)$ ,  $B(2, -2)$ ,  $C(3, -1)$ ;

11)  $A(1, -1)$ ,  $B(3, -1)$ ,  $C(4, 0)$ ;

12)  $A(-1, -1)$ ,  $B(-1, -3)$ ,  $C(0, -4)$ ;

13)  $A(1, 1)$ ,  $B(1, 3)$ ,  $C(0, 4)$ ;

14)  $A(-1, 1)$ ,  $B(0, 2)$ ,  $C(-1, 2)$ ;

15)  $A(0, 2)$ ,  $B(1, 3)$ ,  $C(0, 3)$ .



## 8.3. Задания для самостоятельной работы

168. Найти конформное и однолистное отображение области  $G$  на полуплоскость  $\{w : \operatorname{Im} w > 0\}$ . Сделать чертеж.

1)  $G = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ ; [Ответ]

2)  $G = \{z : \operatorname{Im} z > 0\} \setminus [0, ih], h > 0$ ; [Ответ]

3)  $G = \{z : 0 < \operatorname{Im} z < \pi\} \setminus \left\{z : \operatorname{Im} z = \frac{\pi}{2}, \operatorname{Re} z \leq 0\right\}$ ; [Ответ]

4)  $G = \{z : \operatorname{Im} z > 0\} \setminus \{z : |z| < 1\}$ ; [Ответ]

5)  $G = \left\{z : |z - i| < 1, \left|z - \frac{i}{2}\right| > \frac{1}{2}\right\}$ ; [Ответ]

6)  $G = \mathbb{C} \setminus [0, 1]$ ; [Ответ]

7)  $G = \mathbb{C} \setminus \left\{\{z : \operatorname{Re} z = 0\} \setminus [0, i]\right\}$ ; [Ответ]

8)  $G = \{z : \operatorname{Re} z > 0\} \setminus \{z : |z - 1| = 1\}$ ; [Ответ]

9)  $G = \{z : |z| < 2, \operatorname{Im} z > 1\}$ ; [Ответ]

10) Область  $G$  изображена на рисунке 8.1. Центры окружностей находятся в точках  $A(\sqrt{2} - 1, 0)$ ,  $B(1 - \sqrt{2}, 0)$ . [Ответ]

11)  $G = \mathbb{C} \setminus \{z : |z| = 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ ; [Ответ]

12)  $G = \mathbb{C} \setminus [-i, i]$ ; [Ответ]

13)  $G = \mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ ; [Ответ]

14)  $G = \mathbb{C} \setminus \left\{e^{i\frac{\pi}{4}}z + i : z \in [0, +\infty)\right\}$ ; [Ответ]



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран




Рис. 8.1




Рис. 8.2



Меню

Часть II. Задачи

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

8.3. Задания для самостоятельной работы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

15)  $G = \{z : \operatorname{Im} z > 0\} \setminus \{z : z = it, 0 < h \leq t < +\infty\};$

[[Ответ](#)]

16) Область  $G$  изображена на [рисунке 8.2](#).

[[Ответ](#)]

17)  $G = \{z : |z| < 1\} \setminus [0, 1];$

[[Ответ](#)]

18)  $G = \mathbb{C} \setminus \{(-\infty, -R] \cup [R, +\infty)\};$

[[Ответ](#)]

19)  $G = \{z : \operatorname{Im} z > 0\} \setminus \left\{z : |z| = 1, 0 \leq \arg z \leq \frac{\pi}{2}\right\};$

[[Ответ](#)]

20)  $G = \{z : |z| < 1\} \setminus \left\{[-1, 0] \cup \left[\frac{1}{2}, 1\right]\right\}.$

[[Ответ](#)]



## 8.4. Задания творческого характера

169. Найти образ  $w(G)$  области  $D$  при отображении  $w = f(z)$ :

$$1) w = \frac{z}{z^2 + 1}, G = \{z : |z| < 1\};$$

$$2) w = \frac{1}{z^2 + 1}, G = \{z : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\};$$

$$3) w = \frac{1}{2} \left( z^n + \frac{1}{z^n} \right), G = \left\{ z : 0 < \arg z < \frac{\pi}{n} \right\};$$

$$4) w = \frac{z}{(1 + z^n)^{\frac{2}{n}}}, w(1) > 0, G = \left\{ z : |z| < 1, -\frac{\pi}{n} < \arg z < \frac{\pi}{n} \right\}.$$

170. Отобразить конформно и однослистно область  $G_1$  на область  $G_2$ :

$$1) G_1 = \mathbb{C} \setminus \{[-1, 1] \cup [-i, i]\}, G_2 = \{w : |w| > 1\};$$

$$2) G_1 = \mathbb{C} \setminus \{(-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \cup \{z : \operatorname{Re} z = 0, \operatorname{Im} z \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)\}\}, G_2 = \{w : |w| > 1\};$$

$$3) G_1 = \mathbb{C} \setminus \{\{z : \operatorname{Re} z = 0, \operatorname{Im} z \leq 0\} \cup \{z : |z| = 1, \operatorname{Im} z \leq 0\}\}, G_2 = \{w : |w| > 1\};$$

$$4) G_1 = \mathbb{C} \setminus \{\{z : |z| = 1, \operatorname{Im} z \leq 0\} \cup [-2i, 0]\}, G_2 = \{w : \operatorname{Im} w > 0\}.$$

171. Отобразить конформно и однослистно на верхнюю полуплоскость  $\{w : \operatorname{Im} w > 0\}$  следующие области:

$$1) \text{внутренность правой ветви гиперболы } \frac{x^2}{\cos^2 \alpha} - \frac{y^2}{\sin^2 \alpha} = 1;$$

$$2) \text{внешность правой ветви гиперболы } \frac{x^2}{\cos^2 \alpha} - \frac{y^2}{\sin^2 \alpha} = 1;$$

$$3) \text{область, заключенную между ветвями гиперболы } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$



Меню

Часть II. Задачи

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 9

# Интегральная теорема и формула Коши

- 9.1. Задания для аудиторной работы
- 9.2. Базовые индивидуальные задания
- 9.3. Задания для самостоятельной работы
- 9.4. Задания творческого характера



## 9.1. Задания для аудиторной работы

172. С помощью формулы замены переменной вычислить **интеграл**

$$\int_{\Gamma} f(z) dz,$$

если

1)  $f(z) = z$ , а  $\Gamma$  является:

а) прямолинейным отрезком, соединяющим точки  $-1$  и  $1$ ;

б) нижней половиной окружности  $\{z : |z| = 1\}$

(начальная точка пути интегрирования  $z = -1$ );

[Ответ]

2)  $f(z) = \frac{1}{\sqrt{z}}$  (выбирается та ветвь  $\sqrt{z}$ , для которой  $\sqrt{1} = 1$ ), а  $\Gamma$  является:

а) верхней половиной окружности  $\{z : |z| = 1\}$ ;

б) нижней половиной окружности  $\{z : |z| = 1\}$

(начальная точка пути интегрирования  $z = 1$ );

[Ответ]

3)  $f(z) = \operatorname{Re} z + \operatorname{Im} z$ , а  $\Gamma$  является:

а) ломаной с вершинами в точках  $0, 1, 1 + 2i$ ;

б) отрезком с концами в точках  $0, 1 + 2i$

(начальная точка пути интегрирования  $z = 0$ );

[Ответ]

4)  $f(z) = z$ , а  $\Gamma$  является:

а) дугой параболы  $y = 1 - x^2$ , соединяющей точки  $-1$  и  $1$ ;

б) отрезком, соединяющим точки  $-1$  и  $1$

(начальная точка пути интегрирования  $z = -1$ );

[Ответ]





5)  $f(z) = \frac{1}{\sqrt{z}}$  (выбирается та ветвь  $\sqrt{z}$ , для которой  $\sqrt{-1} = i$ ), а  $\Gamma$  является:

- а) правой половиной единичной окружности  $\{z : |z| = 1\}$ ;
- б) ломаной, соединяющей точки  $i, 1, -i$   
(начальная точка пути интегрирования  $z = i$ );

[Ответ]

6)  $f(z) = \bar{z}$ , а  $\Gamma$  соединяет точки  $z_1 = 0, z_2 = 1 + i$  и является:

- а) параболой  $y = x^2$ ;
- б) ломаной, соединяющей точки  $z_1, z_3 = i$  и  $z_2$   
(начальная точка пути интегрирования  $z = 0$ ).

[Решение] [Ответ]

173. Используя **интегральную теорему Коши** и **интегральную формулу Коши**, вычислить **интеграл**

$$\int_{\gamma} f(z) dz$$

(здесь и далее  $\gamma$  — **спрямляемая жорданова** замкнутая кривая (**контур**)):

1)  $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$ , и

- а) точка  $i$  лежит внутри  $\gamma$ , а точка  $-i$  вне его;
- б) точка  $i$  лежит вне  $\gamma$ , а точка  $-i$  внутри его;
- в) точки  $\pm i$  лежат внутри  $\gamma$ ;
- г) точки  $\pm i$  лежат вне  $\gamma$ .

[Ответ]

2)  $f(z) = \frac{1}{z^2+9}$ , и

- а) точка  $3i$  лежит внутри  $\gamma$ , а точка  $-3i$  вне его;
- б) точка  $3i$  лежит вне  $\gamma$ , а точка  $-3i$  внутри его;
- в) точки  $\pm 3i$  лежат внутри  $\gamma$ ;
- г) точки  $\pm 3i$  лежат вне  $\gamma$ .

[Ответ]

3)  $f(z) = \frac{e^z}{z(z-1)}$ , и

- а) точка  $0$  лежит внутри  $\gamma$ , а точка  $1$  вне его;
- б) точка  $0$  лежит вне  $\gamma$ , а точка  $1$  внутри его;
- в) точки  $0$  и  $1$  лежат внутри  $\gamma$ ;
- г) точки  $0$  и  $1$  лежат вне  $\gamma$ .

[Решение] [Ответ]



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$4) f(z) = \frac{1}{z(z+3i)(z+5i)}, \text{ и}$$

$$\text{а) } \gamma - \text{окружность } \{z : |z| = \frac{5}{2}\};$$

$$\text{б) } \gamma - \text{окружность } \{z : |z| = 4\};$$

$$\text{в) } \gamma - \text{окружность } \{z : |z| = 6\};$$

$$\text{г) } \gamma - \text{окружность } \{z : |z - 2| = \frac{1}{2}\}.$$

[Ответ]

$$5) f(z) = \frac{1}{z(z+7)(z+9)}, \text{ и}$$

$$\text{а) } \gamma - \text{окружность } \{z : |z| = 5\};$$

$$\text{б) } \gamma - \text{окружность } \{z : |z| = 8\};$$

$$\text{в) } \gamma - \text{окружность } \{z : |z| = 10\};$$

$$\text{г) } \gamma - \text{окружность } \{z : |z - 2| = \frac{1}{2}\}.$$

[Ответ]

$$6) f(z) = \frac{1}{z(z+2i)(z+4i)}, \text{ и}$$

$$\text{а) } \gamma - \text{окружность } \{z : |z| = 1\};$$

$$\text{б) } \gamma - \text{окружность } \{z : |z| = 3\};$$

$$\text{в) } \gamma - \text{окружность } \{z : |z| = 5\};$$

$$\text{г) } \gamma - \text{окружность } \{z : |z - 6i| = 1\}.$$

[Ответ]

174. Используя **обобщенную интегральную формулу Коши**,

$$g^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{g(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}},$$

где точка  $z_0$  лежит внутри  $\gamma$ , а  $g(z)$  является аналитической в односвязной области, лежащей внутри **контур**  $\gamma$ , вычислить

$$\int_{\gamma} f(z) dz,$$

если:

$$1) f(z) = \frac{\sin z}{z(z-\pi)^3}, \text{ и}$$

а) точка 0 лежит внутри  $\gamma$ , а точка  $\pi$  вне его;



- б) точка 0 лежит вне  $\gamma$ , а точка  $\pi$  внутри его;  
в) точки 0 и  $\pi$  лежат внутри  $\gamma$ ;  
г) точки 0 и  $\pi$  лежат вне  $\gamma$ .

[Ответ]

2)  $f(z) = \frac{e^z}{z(1-z)^3}$ , и

- а) точка 0 лежит внутри  $\gamma$ , а точка 1 вне его;  
б) точка 0 лежит вне  $\gamma$ , а точка 1 внутри его;  
в) точки 0 и 1 лежат внутри  $\gamma$ ;  
г) точки 0 и 1 лежат вне  $\gamma$ .

[Ответ]

3)  $f(z) = \frac{z+1}{(z-1)z^3}$ , и

- а) точка 0 лежит внутри  $\gamma$ , а точка 1 вне его;  
б) точка 0 лежит вне  $\gamma$ , а точка 1 внутри его;  
в) точки 0 и 1 лежат внутри  $\gamma$ ;  
г) точки 0 и 1 лежат вне  $\gamma$ .

[Ответ]

4)  $f(z) = \frac{z}{(z^2+1)^2}$ , и

- а) точка  $i$  лежит внутри  $\gamma$ , а точка  $-i$  вне его;  
б) точка  $i$  лежит вне  $\gamma$ , а точка  $-i$  внутри его;  
в) точки  $\pm i$  лежат внутри  $\gamma$ ;  
г) точки  $\pm i$  лежат вне  $\gamma$ .

[Ответ]

5)  $f(z) = \frac{\sin z}{(z-1)^3(z+3)}$ , и

- а) точка 1 лежит внутри  $\gamma$ , а точка  $-3$  вне его;  
б) точка 1 лежит вне  $\gamma$ , а точка  $-3$  внутри его;  
в) точки 1 и  $-3$  лежат внутри  $\gamma$ ;  
г) точки 1 и  $-3$  лежат вне  $\gamma$ .

[Ответ]

6)  $f(z) = \frac{e^z}{z^2(z+1)^3}$ , и

- а) точка 0 лежит внутри  $\gamma$ , а точка  $-1$  вне его;  
б) точка 0 лежит вне  $\gamma$ , а точка  $-1$  внутри его;  
в) точки 0 и  $-1$  лежат внутри  $\gamma$ ;  
г) точки 0 и  $-1$  лежат вне  $\gamma$ .

[Решение] [Ответ]



Меню

Часть II. Задачи

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

9.1. Задания для аудиторной работы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

175. Вычислить все возможные значения **интеграла**

$$\int_{\gamma} f(z) dz,$$

при различных положениях **контура**  $\gamma$ , предполагая, что этот контур не проходит ни через одну из точек, в которых  $f(z)$  теряет **аналитичность**:

1)  $f(z) = \frac{1}{z(z^2 - 1)}$ ; [**Ответ**]

2)  $f(z) = \frac{1}{z(z^2 + 1)}$ ; [**Ответ**]

3)  $f(z) = \frac{z + 4}{z^2(z + 1)^2}$ ; [**Ответ**]

4)  $f(z) = \frac{e^z}{z^2 + 9}$ ; [**Ответ**]

5)  $f(z) = \frac{z + 1}{z(z^2 + 4)}$ ; [**Ответ**]

6)  $f(z) = \frac{1}{(z^2 + 4)(z - 1)}$ . [**Решение**] [**Ответ**]



## 9.2. Базовые индивидуальные задания

176. С помощью формулы замены переменной вычислить **интеграл**

$$\int_{\Gamma} f(z) dz,$$

если:

- 1)  $f(z) = z\bar{z}$ , а  $\Gamma$  — отрезок, соединяющий точки 0 и  $1 + 2i$ ;
- 2)  $f(z) = z - 3\bar{z}$ , а  $\Gamma$  — дуга параболы  $y = \frac{1}{2}x^2$ , пробегаемая от точки 0 до точки  $2 + 2i$ ;
- 3)  $f(z) = 3z + \bar{z} + 6$ , а  $\Gamma$  — дуга параболы  $y = \frac{1}{3}x^2$ , пробегаемая от точки 0 до точки  $-3 + 3i$ ;
- 4)  $f(z) = z \operatorname{Re} z$ , а  $\Gamma$  — дуга параболы  $y = \frac{1}{3}x^2$ , пробегаемая от точки 0 до точки  $-3 + 3i$ ;
- 5)  $f(z) = e^{\bar{z}}$ , а  $\Gamma$  — ломаная, соединяющая последовательно точки 0, 3 и  $3 + 4i$ ;
- 6)  $f(z) = z \operatorname{Im} z$ , а  $\Gamma$  — дуга параболы  $y = x^2$ , пробегаемая от точки  $1 + i$  до точки  $2 + 4i$ ;
- 7)  $f(z) = \bar{z} + 3z$ , а  $\Gamma$  — ломаная, соединяющая последовательно точки 0, 4 и  $4 + 4i$ ;
- 8)  $f(z) = 3 + 2i - 3\bar{z}$ , а  $\Gamma$  — ломаная, соединяющая последовательно точки 0, 3 и  $3 + 3i$ ;
- 9)  $f(z) = z$ , а  $\Gamma$  — замкнутый контур, образованный дугой параболы  $y = -x^2 + 1$  и отрезком оси абсцисс (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 10)  $f(z) = \operatorname{Re} z + \operatorname{Im} z$ , а  $\Gamma$  — ломаная, соединяющая последовательно точки 0, 1 и  $1 + 2i$ ;
- 11)  $f(z) = 3z + \bar{z} + 3$ , а  $\Gamma$  — дуга параболы  $y = \frac{1}{3}x^2$ , пробегаемая от точки 0 до точки  $-3 + 3i$ ;



- 12)  $f(z) = 2z + 2\bar{z} + 3$ , а  $\Gamma$  — ломаная, соединяющая последовательно точки  $0$ ,  $-2$  и  $-2 + 2i$ ;
- 13)  $f(z) = \frac{z}{\bar{z}}$ , а  $\Gamma$  — контур квадрата с вершинами в точках  $\pm 1$ ,  $\pm i$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 14)  $f(z) = 3 + 3i - 3\bar{z}$ , а  $\Gamma$  — дуга параболы  $y = \frac{1}{3}x^2$ , пробегаемая от точки  $0$  до точки  $3 + 3i$ ;
- 15)  $f(z) = 3z + 3\bar{z} + 6$ , а  $\Gamma$  — ломаная, соединяющая последовательно точки  $0$ ,  $-3$  и  $-3 + 3i$ ;
- 16)  $f(z) = 1 + 2i - 6\bar{z}$ , а  $\Gamma$  — дуга параболы  $y = x^2$ , пробегаемая от точки  $0$  до точки  $1 + i$ ;
- 17)  $f(z) = 4z + 3\bar{z} + 6$ , а  $\Gamma$  — ломаная, соединяющая последовательно точки  $0$ ,  $-4$  и  $-4 + 4i$ ;
- 18)  $f(z) = \frac{1}{z^2+4}$ , а  $\Gamma$  — прямоугольник с вершинами в точках  $1$ ,  $1 + 3i$ ,  $-1 + 3i$ ,  $-1$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 19)  $f(z) = \frac{\cos z}{z^2+4}$ , а  $\Gamma$  — треугольник с вершинами в точках  $4$ ,  $-4 + i$ ,  $-4 - i$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 20)  $f(z) = e^z$ , а  $\Gamma$  — дуга параболы  $y = x^2$ , пробегаемая от точки  $0$  до точки  $1 + i$ .

177. Вычислить:

$$1) \int_0^i (-2z - 3) \cos z \, dz;$$

$$2) \int_0^i (4z + 1) \sin z \, dz;$$

$$3) \int_0^i (-z - 3) \cos z \, dz;$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$4) \int_0^i (3z + 1) \cos z \, dz;$$

$$5) \int_0^i (5z - 3) \cos z \, dz;$$

$$6) \int_0^i (-3z + 3) \sin z \, dz;$$

$$7) \int_0^i (-2z + 1) \sin z \, dz;$$

$$8) \int_0^i (-z - 4) \sin z \, dz;$$

$$9) \int_0^i (-2z - 5) \sin z \, dz;$$

$$10) \int_0^i (-z - 1) \cos z \, dz;$$

$$11) \int_0^i (3z + 4) \cos z \, dz;$$

$$12) \int_0^i (-5z - 5) \cos z \, dz;$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$13) \int_0^i (-z - 4) \cos z \, dz;$$

$$14) \int_0^i (-3z + 2) \cos z \, dz;$$

$$15) \int_0^i (4z + 4) \cos z \, dz;$$

$$16) \int_0^i (5z - 4) \cos z \, dz;$$

$$17) \int_0^i (z - 3) \sin z \, dz;$$

$$18) \int_0^i (z + 1) \cos z \, dz;$$

$$19) \int_0^i (-z - 5) \sin z \, dz;$$

$$20) \int_0^i (2z - 4) \sin z \, dz.$$





178. С помощью формулы замены переменной вычислить **интеграл**

$$\int_{\Gamma} f(z) dz,$$

если:

- 1)  $f(z) = i\bar{z} + z^2$ , а  $\Gamma$  — дуга окружности  $|z| = 4$  при  $\pi/2 \leq \arg z \leq \pi$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 2)  $f(z) = z^2$ , а  $\Gamma$  — дуга окружности  $|z| = 10$  при  $\operatorname{Im} z < 0$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 3)  $f(z) = \bar{z} \operatorname{Re} z$ , а  $\Gamma$  — дуга окружности  $\{z : |z| = 2\}$ , пробегаемая против часовой стрелки от точки 2 до точки  $-2$ ;
- 4)  $f(z) = z^2 + z\bar{z}$ , а  $\Gamma$  — дуга окружности  $|z| = 3$  при  $0 \leq \arg z \leq \pi$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 5)  $f(z) = \bar{z}^2 |z|$ , а  $\Gamma$  — дуга окружности  $|z| = 6$  при  $\operatorname{Re} z > 0$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 6)  $f(z) = \frac{1+10z}{\bar{z}}$ , а  $\Gamma$  — дуга окружности  $|z| = 1$  при  $0 \leq \arg z \leq \pi/2$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 7)  $f(z) = \bar{z}$ , а  $\Gamma$  — окружность  $|z| = 8$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 8)  $f(z) = 2z + \bar{z} + \operatorname{Im} z$ , а  $\Gamma$  — окружность  $\{z : |z| = 1\}$ , пробегаемая против часовой стрелки;
- 9)  $f(z) = \frac{1+7z}{\bar{z}}$ , а  $\Gamma$  — дуга окружности  $|z| = 1$  при  $0 \leq \arg z \leq \pi/2$ , пробегаемая против часовой стрелки;
- 10)  $f(z) = \bar{z}^2 |z|$ , а  $\Gamma$  — дуга окружности  $|z| = 7$  при  $\operatorname{Re} z > 0$ , пробегаемая против часовой стрелки;
- 11)  $f(z) = z - |z|$ , а  $\Gamma$  — замкнутый контур, состоящий из правой половины окружности  $\{z : |z| = 1\}$  и вертикального диаметра (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 12)  $f(z) = \frac{\bar{z}}{z}$ , а  $\Gamma$  — контур, изображенный на **рисунке 9.1**;



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран




Рис. 9.1

- 13)  $f(z) = z^2$ , а  $\Gamma$  — дуга окружности  $|z| = 7$  при  $\text{Im } z < 0$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 14)  $f(z) = \bar{z}$ , а  $\Gamma$  — астроида, задаваемая параметрическим уравнением  $z = \cos^3 t + i \sin^3 t$ ,  $0 \leq t \leq 2\pi$ ;
- 15)  $f(z) = \bar{z}$ , а  $\Gamma$  — замкнутый контур, состоящий из одной арки синусоиды и отрезка оси абсцисс (контур  $\Gamma$  обходится по часовой стрелке);
- 16)  $f(z) = i\bar{z} + z^2$ , а  $\Gamma$  — дуга окружности  $|z| = 3$  при  $\pi/2 \leq \arg z \leq \pi$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 17)  $f(z) = \bar{z}$ , а  $\Gamma$  — окружность  $|z| = 8$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 18)  $f(z) = z^2 + z\bar{z}$ , а  $\Gamma$  — дуга окружности  $|z| = 4$  при  $0 \leq \arg z \leq \pi$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 19)  $f(z) = |z|\bar{z}$ , а  $\Gamma$  — дуга окружности  $|z| = 7$  при  $-\pi/2 \leq \arg z \leq \pi/2$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки);
- 20)  $f(z) = i\bar{z} + z^2$ , а  $\Gamma$  — дуга окружности  $|z| = 9$  при  $\pi/2 \leq \arg z \leq \pi$  (контур  $\Gamma$  обходится против часовой стрелки).
179. Используя **интегральную теорему Коши**, **интегральную формулу Коши** и **обобщенную интегральную формулу Коши**, вычислить интеграл

$$\int_{\gamma} f(z) dz$$



где  $\gamma$  — **спрямляемая жорданова** замкнутая кривая (**контур**), в случаях, когда:

- 1) точка  $z_1$  лежит внутри  $\gamma$ , а точка  $z_2$  — вне его;
- 2) точка  $z_2$  лежит внутри  $\gamma$ , а точка  $z_1$  — вне его;
- 3) точки  $z_1$  и  $z_2$  лежат внутри  $\gamma$ ;
- 4) точки  $z_1$  и  $z_2$  лежат вне  $\gamma$ .

$$1) f(z) = \frac{z+1}{z^3(z+1)}; z_1 = 0, z_2 = -1;$$

$$2) f(z) = \frac{\sin z}{z(z-\pi)^3}; z_1 = 0, z_2 = \pi;$$

$$3) f(z) = \frac{e^z}{z(z+1)^3}; z_1 = 0, z_2 = -1;$$

$$4) f(z) = \frac{z}{(z^2+1)^2}; z_1 = i, z_2 = -i;$$

$$5) f(z) = \frac{\cos z}{(z+\pi)z^2}; z_1 = -\pi, z_2 = 0;$$

$$6) f(z) = \frac{z^2+1}{(z-1)^2z^3}; z_1 = 1, z_2 = 0;$$

$$7) f(z) = \frac{z-1}{(z+1)^3(z+i)}; z_1 = -1, z_2 = -i;$$

$$8) f(z) = \frac{\cos z}{z(z-\pi)^3}; z_1 = 0, z_2 = \pi;$$

$$9) f(z) = \frac{e^{iz}}{(z^2+1)^2}; z_1 = i, z_2 = -i;$$

$$10) f(z) = \frac{1}{(z^2+9)^2}; z_1 = 3i, z_2 = -3i;$$

$$11) f(z) = \frac{z^2}{(z-5)^3(z+1)}; z_1 = 5, z_2 = -1;$$



$$12) f(z) = \frac{z^2}{(z^2 + 25)^2}; z_1 = 5i, z_2 = -5i;$$

$$13) f(z) = \frac{z}{(z+i)^3(z+4)}; z_1 = -i, z_2 = -4;$$

$$14) f(z) = \frac{\operatorname{ch} iz}{(z^2 + 1)^2}; z_1 = -i, z_2 = i;$$

$$15) f(z) = \frac{\operatorname{sh} iz}{z^3(z-i)}; z_1 = 0, z_2 = i;$$

$$16) f(z) = \frac{e^{iz}}{(z+\pi)^2(z-i\pi)}; z_1 = -\pi, z_2 = i\pi;$$

$$17) f(z) = \frac{z^2}{(z+1)^3(z-1)}; z_1 = -1, z_2 = 1;$$

$$18) f(z) = \frac{1}{(z^2+9)^4}; z_1 = -3i, z_2 = 3i;$$

$$19) f(z) = \frac{1}{z^5(z+1)}; z_1 = 0, z_2 = -1;$$

$$20) f(z) = \frac{z}{(z-2)^3(z+1)}; z_1 = 2, z_2 = -1.$$

180. Вычислить все возможные значения **интеграла**

$$\int_{\gamma} f(z) dz,$$

при различных положениях **контура**  $\gamma$ , предполагая, что этот контур не проходит ни через одну из точек, в которых  $f(z)$  теряет **аналитичность**, если:

$$1) f(z) = \frac{z}{(z-1)^2(z+1)};$$



$$2) f(z) = \frac{z}{(z^2 + 1)^2};$$

$$3) f(z) = \frac{e^{iz}}{z^3(z + i)};$$

$$4) f(z) = \frac{z + 2}{(z^2 + 9)(z + 1)^2};$$

$$5) f(z) = \frac{\sin z}{z^2 + \pi^2};$$

$$6) f(z) = \frac{1}{z^2(z^2 + 1)};$$

$$7) f(z) = \frac{\cos z}{z^2 - \pi^2};$$

$$8) f(z) = \frac{1}{z(z^2 - 1)};$$

$$9) f(z) = \frac{1}{z^2(z^2 + 4)};$$

$$10) f(z) = \frac{z^2}{(z - 2)(z + i)};$$

$$11) f(z) = \frac{\operatorname{sh} z}{z(z + \frac{\pi}{4}i)};$$

$$12) f(z) = \frac{e^z}{z(z - 1)^2};$$

$$13) f(z) = \frac{e^z}{z^2 - 1};$$

$$14) f(z) = \frac{e^z}{z(z - 1)^3};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$15) f(z) = \frac{1}{z^3 - 1};$$

$$16) f(z) = \frac{e^z}{z^2 + 9};$$

$$17) f(z) = \frac{1}{z(z^2 + 1)};$$

$$18) f(z) = \frac{1}{(z - 1)^2(z + i)^2};$$

$$19) f(z) = \frac{e^{iz}}{(z^2 + 1)^2};$$

$$20) f(z) = \frac{\cos z}{z^2 + \pi^2}.$$



## 9.3. Задания для самостоятельной работы

181. Вычислить **интеграл**

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{\sqrt{z}},$$

если **контур**  $\gamma$ :

- 1) полуокружность  $\{z : |z| = 1\}$ ,  $\operatorname{Im} z \geq 0$ ;  $\sqrt{1} = 1$ ;
- 2) полуокружность  $\{z : |z| = 1\}$ ,  $\operatorname{Im} z \geq 0$ ;  $\sqrt{1} = -1$ ;
- 3) полуокружность  $\{z : |z| = 1\}$ ,  $\operatorname{Im} z \leq 0$ ;  $\sqrt{1} = 1$ ;
- 4) окружность  $\{z : |z| = 1\}$ ;  $\sqrt{1} = 1$ ;
- 5) окружность  $\{z : |z| = 1\}$ ;  $\sqrt{-1} = i$ .

182. Вычислить **интеграл**

$$\int_{\gamma} \operatorname{Ln} z \, dz,$$

где:

- 1)  $\gamma = \{z : |z| = 1\}$ ;  $\operatorname{Ln} 1 = 0$ ;
- 2)  $\gamma = \{z : |z| = 1\}$ ;  $\operatorname{Ln} i = \frac{\pi i}{2}$ ;
- 3)  $\gamma = \{z : |z| = R\}$ ;  $\operatorname{Ln} R = \ln R$ ;
- 4)  $\gamma = \{z : |z| = R\}$ ;  $\operatorname{Ln} R = \ln R + 2\pi i$ ;
- 5)  $\gamma = \{z : |z| = 1\}$ ;  $\operatorname{Ln} 1 = -2\pi i$ .



183. Применяя **интегральную теорему Коши**, доказать равенства:

$$1) \int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos 2x \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2e};$$

$$2) \int_0^{\infty} \cos x^2 \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}};$$

$$3) \int_0^{\infty} \sin x^2 \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}};$$

$$4) \int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos 2bx \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-b^2};$$

$$5) \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx = \frac{\pi}{2};$$

$$6) \int_0^{\infty} x^{s-1} \cos x \, dx = \Gamma(s) \cos \frac{\pi s}{2}, \text{ где } \Gamma(s) \text{ — гамма-функция Эйлера};$$

$$7) \int_0^{\infty} x^{s-1} \sin x \, dx = \Gamma(s) \sin \frac{\pi s}{2}, \text{ где } \Gamma(s) \text{ — гамма-функция Эйлера}.$$

184. Вычислить **интеграл**

$$\int_{\gamma} f(z) \, dz,$$





если:

- 1)  $f(z) = z e^{z^2}$ , а  $\gamma$  — произвольный **контур**, соединяющий точки  $-i$  и  $i$  (точка  $-i$  — начало пути интегрирования);
- 2)  $f(z) = (z - i)e^{-z}$ , а  $\gamma$  — произвольный **контур**, соединяющий точки  $0$  и  $i$  (точка  $0$  — начало пути интегрирования);
- 3)  $f(z) = \frac{\ln z}{z}$ , а  $\gamma$  — отрезок, соединяющий точки  $i$  и  $e i$  (точка  $i$  — начало пути интегрирования). Здесь  $\ln z = \ln |z| + i \arg_0 z$ ,  $\arg_0 z \in (-\pi, \pi]$ ;
- 4)  $f(z) = \frac{1}{\sqrt{z}}$  (через  $\sqrt{z}$  обозначена однозначная ветвь, для которой  $\sqrt{1} = 1$ ), а  $\gamma$  — полуокружность  $\{z : |z| = 4, \operatorname{Im} z \geq 0\}$ , пробегаемая от точки  $-4$  до точки  $4$ ;
- 5)  $f(z) = z \sin z$ , а  $\gamma$  — отрезок, соединяющий точки  $1$  и  $i$  (точка  $1$  — начало пути интегрирования);
- 6)  $f(z) = z^2 \ln \frac{z+1}{z-1}$ , где  $\ln z = \ln |z| + i \arg_0 z$ ,  $\arg_0 z \in (-\pi, \pi]$ , а  $\gamma$  — окружность  $\{z : |z| = 2\}$ .

185. Вычислить **интеграл**

$$\int_{|z|=1} \frac{dz}{(z-a)^n(z-b)^n} \quad (n \in \mathbb{N}, |a| < |b|),$$

если:

- 1)  $|a| < |b| < 1$ ;
- 2)  $|a| < 1 < |b|$ ;
- 3)  $1 < |a| < |b|$ .

186. Согласно **теореме Лиувилля** функция, **аналитическая** и ограниченная во всей плоскости  $\mathbb{C}$ , является постоянной. Доказать эту теорему, вычислив **интеграл**

$$\int_{|z|=R} \frac{f(z) dz}{(z-a)(z-b)} \quad (|a| < R, |b| < R).$$



187. Доказать равенство

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=1} \frac{d\xi}{\xi(\xi-2)(\xi-z)} = \begin{cases} \frac{1}{z-2}, & |z| < 1, \\ \frac{1}{z}, & |z| > 1. \end{cases}$$

188. Вычислив **интеграл**

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{(z-a)(z-\frac{1}{a})},$$

доказать, что при  $0 < a < 1$

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{1+a^2-2a\cos\theta} = \frac{2\pi}{1-a^2}.$$

189. Вычислив соответствующие **интегралы**, доказать равенства:

$$1) \int_{\gamma} \frac{\operatorname{sh}(z+1) dz}{z^2+1} = 2\pi i \cdot \sin 1 \cdot \operatorname{ch} 1, \text{ где } \gamma = \{z = x + iy : x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 3^{\frac{2}{3}}\};$$

$$2) \int_{|z|=2} \frac{\sin z \sin(z-1)}{z^2-z} dz = 0;$$

$$3) \int_{\gamma} \frac{\sin \frac{\pi z}{4} dz}{z^2-1} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} i, \text{ где } \gamma = \{z = x + iy : x^2 + y^2 - 2x = 0\};$$

$$4) \int_{\gamma} \frac{e^{\pi z} dz}{(z^2+1)^2} = \frac{\pi}{2}(\pi i - 1), \text{ где } \gamma = \{z = x + iy : 4x^2 + y^2 - 2y = 0\}.$$



## 9.4. Задания творческого характера

190. Пусть  $G$  — **односвязная область** и функции  $f$  и  $g$  **аналитичны** в  $G$ . Доказать аналог **формулы Ньютона — Лейбница**:

$$\int_{z_0}^z f(\xi) d\xi = \Phi(z) - \Phi(z_0)$$

и формулы интегрирования по частям

$$\int_{z_0}^z f(\xi)g'(\xi) d\xi = (f(z)g(z))\Big|_{z_0}^z - \int_{z_0}^z g(\xi)f'(\xi) d\xi,$$

где  $z_0, z \in G$ ,  $\Phi(z)$  — некоторая функция, являющаяся в  $G$  **первообразной** для  $f(z)$ , т.е.  $\Phi'(z) = f(z)$  для любого  $z \in G$ . Показать, что указанные интегралы зависят только от начальной и конечной точки пути интегрирования.

191. Пусть  $\Gamma$  — **спрямляемая жорданова кривая** (замкнутая или незамкнутая), а  $f(z)$  — функция определенная и непрерывная на  $\Gamma$ . Тогда функцию

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z}, \quad \xi \in \Gamma,$$

называют **интегралом типа Коши**. Доказать, что  $F(z)$  является **аналитической** функцией во всякой области  $G$ , не содержащей точек кривой  $\Gamma$ , и

$$F^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z)^{n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$



192. Пусть  $A_k, a_k, 1 \leq k \leq n$  — действительные числа, причем  $\sum_{k=1}^n A_k = 0$ , а  $a_k > 0$  при  $1 \leq k \leq n$ . Доказать равенства

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sum_{k=1}^n A_k \cos a_k x}{x} dx = - \sum_{k=1}^n A_k \ln a_k,$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sum_{k=1}^n A_k \sin a_k x}{x} dx = 0.$$

193. Пусть  $\Gamma$  — **спрямляемая** замкнутая **жорданова кривая**,  $D^+$  — ее внутренность, а  $D^-$  — внешность, функция  $f(z)$  является **аналитической** в  $D^-$ , непрерывной в  $\overline{D^-}$  и существует конечный предел

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = A.$$

Доказать формулу Коши для бесконечной области

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z} = \begin{cases} A - f(z), & z \in D^-, \\ A, & z \in D^+. \end{cases}$$

194. Пусть функция  $f(z)$  является **аналитической** в круге  $\{z : |z| \leq R\}$ . Доказать интегральную формулу Пуассона:

$$\operatorname{Re} F(r e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} F(r e^{i\varphi}) \frac{(R^2 - r^2) d\varphi}{R^2 - 2Rr \cos(\varphi - \theta) + r^2},$$

где  $r < R$  и  $\theta \in [0, 2\pi]$ .



195. Пусть функция  $f(z)$  является **аналитической** в области, ограниченной **контуром**  $\Gamma$ , а  $z_1, z_2, \dots, z_n$  — произвольные различные точки внутри  $\Gamma$  и

$$\omega_n(z) = (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n).$$

Показать, что функция

$$P(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\xi)}{\omega_n(\xi)} \cdot \frac{\omega_n(\xi) - \omega_n(z)}{\xi - z} dz$$

есть многочлен степени  $(n - 1)$ , который интерполирует функцию  $f(z)$  в точках  $\{z_k\}_{k=1}^n$ , т.е.

$$f(z_k) = P(z_k), \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Многочлен  $P(z)$  называется интерполяционным многочленом Лагранжа.



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 10

# Степенные ряды

- 10.1. Задания для аудиторной работы
- 10.2. Базовые индивидуальные задания
- 10.3. Задания для самостоятельной работы
- 10.4. Задания творческого характера



## 10.1. Задания для аудиторной работы

196. Определить **радиус сходимости**  $R$  и **круг сходимости**  $D = \{z : |z - z_0| < R\}$  следующих **степенных рядов**:

1)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{n \cdot 2^n}$ ; [Ответ]

2)  $\sum_{n=1}^{\infty} (2 + (-1)^n)^n \frac{(z+1)^n}{n}$ ; [Ответ]

3)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n^3} (z-1-i)^n$ ; [Ответ]

4)  $\sum_{n=1}^{\infty} z^{3^n}$ ; [Ответ]

5)  $\sum_{n=0}^{\infty} \sin in \cdot (z+i)^n$ ; [Ответ]

6)  $\sum_{n=1}^{\infty} (3 + (-1)^n)^n n^2 (z-i)^n$ . [Решение] [Ответ]

197. **Радиус сходимости**

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

равен  $R$  ( $0 < R < \infty$ ). Определить радиус сходимости следующих **степенных рядов**:

1)  $\sum_{n=0}^{\infty} 3^n c_n z^n$ ; [Ответ]



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$2) \sum_{n=0}^{\infty} n^5 c_n z^n;$$

[Ответ]

$$3) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n!} z^n;$$

[Ответ]

$$4) \sum_{n=0}^{\infty} c_n^4 z^n;$$

[Ответ]

$$5) \sum_{n=0}^{\infty} n^n c_n z^n;$$

[Ответ]

$$6) \sum_{n=0}^{\infty} (1 + z_0)^n c_n z^n.$$

[Решение] [Ответ]

198. Исследовать поведение степенного ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

на границе круга сходимости:

$$1) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n;$$

[Ответ]

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n};$$

[Ответ]

$$3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2};$$

[Ответ]

$$4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-1}{n}\right)^n z^n;$$

[Ответ]





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$5) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^n}{n \ln n};$$

[Ответ]

$$6) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^n}{n \ln^2 n}.$$

[Решение] [Ответ]

199. В **круге сходимости** степенного ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

найти его сумму:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} n z^n;$$

[Ответ]

$$2) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) z^n;$$

[Ответ]

$$3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n};$$

[Ответ]

$$4) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(n+2) z^n;$$

[Ответ]

$$5) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n};$$

[Ответ]

$$6) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) z^{2n}.$$

[Решение] [Ответ]



## 10.2. Базовые индивидуальные задания

200. Определить **радиус сходимости**  $R$  и **круг сходимости**  $D = \{z : |z - z_0| < R\}$  следующих **степенных рядов**:

$$1) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} n^3(z+1)^n, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{2n}}{2^n + 3^n};$$

$$2) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} n^n(z-i)^n, \quad \text{б) } \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \cdot z^{n!};$$

$$3) \text{ а) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{4^n} z^n, \quad \text{б) } \sum_{n=0}^{\infty} z^{n!};$$

$$4) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{n}, \quad \text{б) } \sum_{n=0}^{\infty} \cos in(z-2)^n;$$

$$5) \text{ а) } \sum_{n=0}^{\infty} (4 + (-1)^n)^{2n} z^n, \quad \text{б) } \sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n};$$

$$6) \text{ а) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1+i)^n}{2^n + n}, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} (z+1)^n;$$

$$7) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{10^n} z^n, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n^2} z^n;$$

$$8) \text{ а) } \sum_{n=0}^{\infty} (1+i)^n z^n, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-\sqrt{n}} z^n;$$



$$9) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} e^{in} \cdot z^n, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^{3n}} z^{2n-1};$$

$$10) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{z}{1-i} \right)^n, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} 2^n z^{n!};$$

$$11) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} (n+2^n)(z+1)^n, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{2n}}{3^n+4^n};$$

$$12) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} (2+(-1)^n)^n z^n, \quad \text{б) } \sum_{n=0}^{\infty} \cos in \cdot z^n;$$

$$13) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} z^n, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} (z-1)^{3^n};$$

$$14) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{4^n} z^n, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{ch} n \cdot z^n;$$

$$15) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} n^n \cdot z^n, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sh} n \cdot z^n;$$

$$16) \text{ а) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{n!}, \quad \text{б) } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^n}{n \ln^2 n};$$

$$17) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n} (z+i)^n, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} e^{i \frac{\pi}{n}} \cdot z^n;$$

$$18) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{z}{i n} \right)^n, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} 3^n z^{n^3};$$

$$19) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} i^n \cdot z^n, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} n^3 z^{3^n};$$



$$20) \text{ а) } \sum_{n=0}^{\infty} (n+i) z^n, \quad \text{б) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{1+in}.$$

### 201. Радиус сходимости

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

равен  $R$  ( $0 < R < \infty$ ). Определить радиус сходимости следующих **степенных рядов**:

$$1) \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{n} c_n z^n;$$

$$2) \sum_{n=0}^{\infty} (3^n + 1) c_n z^n;$$

$$3) \sum_{n=0}^{\infty} (1 + 2^{\sqrt{n}}) c_n z^n;$$

$$4) \sum_{n=0}^{\infty} (3 + 4^n) c_n z^n;$$

$$5) \sum_{n=0}^{\infty} c_n^4 z^n;$$

$$6) \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^{2n};$$

$$7) \sum_{n=1}^{\infty} n^n c_n z^n;$$

$$8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n!} z^n;$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$9) \sum_{n=0}^{\infty} c_{3n} z^{3n};$$

$$10) \sum_{n=0}^{\infty} 2^{2^n} c_n z^n;$$

$$11) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n^n} z^n;$$

$$12) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{4^n} z^n;$$

$$13) \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^{3n};$$

$$14) \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^{2n};$$

$$15) \sum_{n=1}^{\infty} \ln^2 n c_n z^n;$$

$$16) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{c_n}{\ln^2 n} z^n;$$

$$17) \sum_{n=1}^{\infty} c_{2^n} z^{2^n};$$

$$18) \sum_{n=1}^{\infty} n! c_n z^n;$$

$$19) \sum_{n=1}^{\infty} (2 + (-1)^n)^n c_n z^n;$$



$$20) \sum_{n=1}^{\infty} (3 + (-1)^n)^n c_n z^n.$$

202. Исследовать поведение степенного ряда на границе круга сходимости:

$$1) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{n^2(5+5i)^n}, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+i)^n}{n};$$

$$2) \text{ а) } \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(z+9-10i)^n}{n \ln^9 n}, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3+1} z^n;$$

$$3) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n (z+9i)^n}{\sqrt{n^3+729}}, \quad \text{б) } \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{n \ln n};$$

$$4) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-10+10i)^n}{10^n \cdot n!}, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (z+i)^n;$$

$$5) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{5n+6} \right)^n (z+7-8i)^n, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{n \ln^3 n};$$

$$6) \text{ а) } \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(z+6-7i)^n}{n \ln n}, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^2 n}{n^2} (z+1)^n;$$

$$7) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+i)^n}{n^2(4+4i)^n}, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(z+8-9i)^n}{n \ln^8 n};$$

$$8) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n (z+4i)^n}{\sqrt{n^3+64}}, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+i)^n}{n^2(3+4i)^n};$$

$$9) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-8+8i)^n}{8^n \cdot n!}, \quad \text{б) } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n} z^n;$$



$$10) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-9i)^n}{9^n \cdot n^9}, \quad \text{б) } \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(z+i)^n}{n \ln^2 n};$$

$$11) \text{ а) } \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(z+i)^n}{n \sqrt{\ln n}}, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+i)^n}{n^4};$$

$$12) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-i)^n}{n^2(6-8i)^n}, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+3i)^n}{2^n \cdot n^2};$$

$$13) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(z+2i)^n}{5^n n \sqrt{n^2+1}}, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+2i)^n}{3^n \cdot n!};$$

$$14) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{3n+1} \right)^n (z+2-i)^n, \quad \text{б) } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(z-3+2i)^n}{n \ln n};$$

$$15) \text{ а) } \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(z+4-i)^n}{n \ln n}, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-3+4i)^n}{n^2(4-3i)^n};$$

$$16) \text{ а) } \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(z+2-3i)^n}{n \ln^3 n}, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-2+4i)^n}{5^n \cdot n^5};$$

$$17) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-2+i)^n}{n^3(2+3i)^n}, \quad \text{б) } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(z-1+2i)^n}{n \ln^4 n};$$

$$18) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} (8-6i)^n z^n, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{5n-2} \right)^n (z-3+2i)^n;$$

$$19) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z+4+i)^n}{3^n \cdot n^3}, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-2+3i)^n}{2^n n \sqrt{n^2+4}};$$

$$20) \text{ а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n (z+5i)^n}{\sqrt{n^3+2}}, \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (3+4i)^n z^n.$$



203. Просуммировать в **круге сходимости** следующие **степенные ряды**:

$$1) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n;$$

$$2) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+2)z^n;$$

$$3) \sum_{n=1}^{\infty} n(z+1)^{n+1};$$

$$4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (n+1)(z+i)^n;$$

$$5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^{n+1}}{n};$$

$$6) \sum_{n=1}^{\infty} (-i)^{n+1} \frac{(z-i)^n}{n};$$

$$7) \sum_{n=1}^{\infty} (-i)^{n+1} \frac{(z-2)^n}{n};$$

$$8) \sum_{n=1}^{\infty} (n+2)(z+1)^n;$$

$$9) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(z+i)^{2n};$$

$$10) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z+1)^{2n};$$





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$11) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(z+1)^{n+1}}{n};$$

$$12) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(z-1)^{2n+1};$$

$$13) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(n+2)(z+1)^{n+1};$$

$$14) \sum_{n=1}^{\infty} i^n n z^n;$$

$$15) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n} (z+1)^n;$$

$$16) \sum_{n=0}^{\infty} (-i)^n (n+1) z^{n+1};$$

$$17) \sum_{n=0}^{\infty} (-i)^{n+1} (n+1)(n+2) z^n;$$

$$18) \sum_{n=1}^{\infty} (-i)^n \frac{z^n}{n};$$

$$19) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n n(n-1) z^{n-2};$$

$$20) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^{2n}}{n}.$$



## 10.3. Задания для самостоятельной работы

204. Найти **радиус сходимости** и **круг сходимости** следующих **степенных рядов**:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n\alpha} (z+i)^n, \alpha \in \mathbb{R};$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2n}}{(n!)^2} z^n;$$

$$3) \sum_{n=0}^{\infty} (n!)^2 e^{-n^2} (z+1)^n;$$

$$4) \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{th} n \cdot (z+i)^n;$$

$$5) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n z^{n!};$$

$$6) \sum_{n=1}^{\infty} z^{n^n}.$$

205. Пользуясь второй теоремой Абеля (см. **задания творческого характера** из этой работы) и решением **задач 199**, доказать следующие равенства:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\varphi}{n} = -\ln \left| 2 \sin \frac{\varphi}{2} \right|, 0 < |\varphi| \leq \pi;$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\varphi}{n} = \frac{\pi - \varphi}{2}, 0 < \varphi < 2\pi;$$



$$3) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)\varphi}{2n+1} = \frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2} \right|, \quad 0 < |\varphi| < \pi;$$

$$4) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)\varphi}{2n+1} = \frac{\pi}{4}, \quad 0 < \varphi < \pi;$$

$$5) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\cos n\varphi}{n} = \ln \left( 2 \cos \frac{\varphi}{2} \right), \quad -\pi < \varphi < \pi;$$

$$6) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin n\varphi}{n} = \frac{\varphi}{2}, \quad -\pi < \varphi < \pi.$$

206. Используя известные представления элементарных функций в виде **степенного ряда** доказать равенства:

$$1) \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - \cos z}{z^2} = \frac{1}{2};$$

$$2) \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} = 1;$$

$$3) \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1;$$

$$4) \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\ln(1+z)}{z} = 1;$$

$$5) \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} z}{z} = 1;$$

$$6) \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} z - 1}{z^2} = \frac{1}{2}.$$

207. Доказать, что в круге  $\{z : |z| < 1\}$  справедливы тождества:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 z^n = \frac{z(z+1)}{(1-z)^3};$$



$$2) \sum_{n=1}^{\infty} n^3 z^n = \frac{z(1+4z+z^2)}{(1-z)^4};$$

$$3) \sum_{n=1}^{\infty} n^4 z^n = \frac{z(z^3+6z^2-z-2)}{(1-z)^5};$$

$$4) \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)z^n = \frac{2z}{(1-z)^3};$$

$$5) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^2 z^n = \frac{1+z}{(1-z)^3};$$

$$6) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)\dots(n+k-1)z^n = \frac{(k-1)!}{(1-z)^k};$$

$$7) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n+m}}{n+m} = \ln(1-z) - \sum_{n=0}^{m-1} \frac{z^n}{n};$$

$$8) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+m)!}{n!} z^n = \frac{m!}{(1-z)^{m+1}}.$$

208. Доказать, что при любых  $z \in \mathbb{C}$  справедливы равенства:

$$1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+1)} z^{n+1} = e^z - 1;$$

$$2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+2)} z^{n+2} = (z-1)e^z + 1;$$

$$3) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{4n+1}}{(4n+1)!} = \frac{1}{2}(\operatorname{sh} z + \sin z);$$



Меню

Часть II. Задачи

Глава 10. Степенные ряды

10.3. Задания для самостоятельной работы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$4) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{4n+3}}{(4n+3)!} = \frac{1}{2}(\operatorname{sh} z - \sin z);$$

$$5) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{4n+2}}{(4n+2)!} = \frac{1}{2}(\operatorname{ch} z - \cos z);$$

$$6) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{4n}}{(4n)!} = \frac{1}{2}(\operatorname{ch} z + \cos z);$$

$$7) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(4n+2)!} z^{4n+2} = \sin \frac{z}{\sqrt{2}} \cdot \operatorname{sh} \frac{z}{\sqrt{2}}.$$



## 10.4. Задания творческого характера

209. Доказать вторую теорему Абеля: если ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n$$

сходится, то:

$$\lim_{r \rightarrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} c_n r^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n, \quad 0 < r < 1.$$

210. Показать, что теорема, обратная второй теореме Абеля, не имеет места, т.е. привести пример расходящегося ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n,$$

для которого существует предел

$$\lim_{r \rightarrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} c_n r^n.$$

211. Пусть все числа  $a_n$  положительны и

$$a_0 > a_1 > a_2 > \dots; \quad a_n \rightarrow 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Доказать, что **степенной ряд**

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

сходится во всех точках окружности  $\{z : |z| = 1\}$ , исключая, быть может, точку  $z = 1$ .



212. Исследовать ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]} z^n}{n}$$

на сходимость во всех точках границы **круга сходимости**.

213. Доказать, что для всех  $z \in \mathbb{C}$

$$\cos z \cdot e^{z \operatorname{ctg} \alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\alpha}{\sin^n \alpha} \frac{z^n}{n!}, \quad \alpha \neq 0, \pm\pi, \pm 2\pi.$$

214. Найти **радиус сходимости степенного ряда**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\alpha)_n \cdot (\beta)_n}{(\gamma)_n \cdot n!} z^n,$$

где  $(a)_n = a(a+1)(a+2)\dots(a+n-1)$  — символ Похгаммера.

215. Доказать, что в круге  $\{z : |z| < 1\}$  справедливо тождество:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n+m}}{n(n+m)} = \frac{1}{m} (1-z^m) \ln(1-z) + \frac{1}{m} \sum_{n=1}^m \frac{z^n}{n}.$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 11

# Ряды Тейлора

- 11.1. Задания для аудиторной работы
- 11.2. Базовые индивидуальные задания
- 11.3. Задания для самостоятельной работы
- 11.4. Задания творческого характера





## 11.1. Задания для аудиторной работы

216. Разложить функцию  $f(z)$  в ряд Тейлора по степеням  $z - z_0$  и найти круг сходимости  $D = \{z : |z - z_0| < R\}$  полученного степенного ряда:

1)  $f(z) = \frac{1}{z+4}$ ,  $z_0 = 0$ ; [Ответ]

2)  $f(z) = \frac{1}{z^2+4}$ ,  $z_0 = 0$ ; [Ответ]

3)  $f(z) = \frac{1}{z+1}$ ,  $z_0 = i$ ; [Ответ]

4)  $f(z) = \frac{2}{z-1}$ ,  $z_0 = i$ ; [Ответ]

5)  $f(z) = \frac{z}{z+2}$ ,  $z_0 = 1$ ; [Ответ]

6)  $f(z) = \frac{6z}{z-1}(z-3)$ ,  $z_0 = 2$ . [Решение] [Ответ]

217. Разложить в ряд Тейлора по степеням  $z - z_0$  функцию  $f(z)$  и найти круг сходимости полученного степенного ряда:

1)  $f(z) = e^z$ ,  $z_0 = -1$ ; [Ответ]

2)  $f(z) = e^{z+3}$ ,  $z_0 = -1$ ; [Ответ]

3)  $f(z) = \sin z \cos z$ ,  $z_0 = 0$ ; [Ответ]

4)  $f(z) = \operatorname{ch}^2 z$ ,  $z_0 = 0$ ; [Ответ]

5)  $f(z) = \cos z$ ,  $z_0 = \frac{\pi}{4}$ ; [Ответ]

6)  $f(z) = \cos(3z - i)$ ,  $z_0 = 0$ . [Решение] [Ответ]



218. Используя известные разложения и применяя почленное дифференцирование и интегрирование степенного ряда, разложить функцию  $f(z)$  в ряд Тейлора по степеням  $z$ . Определить круг сходимости полученного степенного ряда:

1)  $f(z) = \frac{1}{(1-z)^2}$ ; [Ответ]

2)  $f(z) = \ln \frac{1+z}{1-z}$ ; [Ответ]

3)  $f(z) = \frac{2}{(1-z)^3}$ ; [Ответ]

4)  $f(z) = \frac{z^2}{(1-z^3)^2}$ ; [Ответ]

5)  $f(z) = (z+1) \ln(z+1) - z$ ; [Ответ]

6)  $f(z) = \frac{1}{(1+z^2)^2}$ . [Решение] [Ответ]

219. Найти три первых отличных от нуля члена разложения функции  $f(z)$  в ряд Тейлора по степеням  $z$ , а также круг сходимости полученного ряда:

1)  $f(z) = \frac{z}{\cos z}$ ; [Ответ]

2)  $f(z) = \frac{\ln(1-z)}{1-z}$ ; [Ответ]

3)  $f(z) = \frac{z}{\ln(1-z)}$ ; [Ответ]

4)  $f(z) = \sqrt{1-4z}$  ( $f(0) = 1$ ); [Ответ]

5)  $f(z) = e^{z \sin z}$ ; [Ответ]

6)  $f(z) = \operatorname{tg} z$ . [Решение] [Ответ]



## 11.2. Базовые индивидуальные задания

220. Разложить функцию  $f(z)$  в ряд Тейлора по степеням  $z - z_0$  и найти круг сходимости  $D = \{z : |z - z_0| < R\}$  полученного степенного ряда:

1) а)  $f(z) = \frac{1}{z}$ ,  $z_0 = 7i$ ,      б)  $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z-2)}$ ,  $z_0 = 0$ ;

2) а)  $f(z) = \frac{1}{4z+5}$ ,  $z_0 = 0$ ,      б)  $f(z) = \frac{2z+1}{z^2+1}$ ,  $z_0 = 0$ ;

3) а)  $f(z) = \frac{1}{z+4}$ ,  $z_0 = 4i$ ,      б)  $f(z) = \frac{6z+5}{(z+3)(z+5)}$ ,  $z_0 = -3$ ;

4) а)  $f(z) = \frac{1}{z+2}$ ,  $z_0 = 2i$ ,      б)  $f(z) = \frac{z+1}{z^2+9}$ ,  $z_0 = 3i$ ;

5) а)  $f(z) = \frac{1}{z+6}$ ,  $z_0 = 6i$ ,      б)  $f(z) = \frac{2z}{(z+2)(z+3)}$ ,  $z_0 = 1$ ;

6) а)  $f(z) = \frac{1}{z}$ ,  $z_0 = -4i$ ,      б)  $f(z) = \frac{2z^2}{z^2+4}$ ,  $z_0 = -i$ ;

7) а)  $f(z) = \frac{1}{7z+8}$ ,  $z_0 = 0$ ,      б)  $f(z) = \frac{1}{z^2-9}$ ,  $z_0 = 4$ ;

8) а)  $f(z) = \frac{1}{3z+4}$ ,  $z_0 = 0$ ,      б)  $f(z) = \frac{2z+6}{(z-1)(z+4)}$ ,  $z_0 = 0$ ;

9) а)  $f(z) = \frac{1}{2z+3}$ ,  $z_0 = 0$ ,      б)  $f(z) = \frac{z}{z^2-4z+13}$ ,  $z_0 = 0$ ;

10) а)  $f(z) = \frac{1}{z}$ ,  $z_0 = -5i$ ,      б)  $f(z) = \frac{z}{z^2+6z+10}$ ,  $z_0 = 0$ ;



- 11) а)  $f(z) = \frac{1}{5z+6}$ ,  $z_0 = 0$ ,      б)  $f(z) = \frac{z}{z^2 - 2z + 5}$ ,  $z_0 = 1$ ;
- 12) а)  $f(z) = \frac{1}{8z+9}$ ,  $z_0 = 0$ ,      б)  $f(z) = \frac{z+1}{z^2 - 6z + 12}$ ,  $z_0 = 3$ ;
- 13) а)  $f(z) = \frac{1}{z+5}$ ,  $z_0 = 5i$ ,      б)  $f(z) = \frac{2z-5}{z^2 - 5z + 6}$ ,  $z_0 = 0$ ;
- 14) а)  $f(z) = \frac{1}{z}$ ,  $z_0 = -8i$ ,      б)  $f(z) = \frac{z+1}{z^2 + 4z - 5}$ ,  $z_0 = 0$ ;
- 15) а)  $f(z) = \frac{1}{z}$ ,  $z_0 = -9i$ ,      б)  $f(z) = \frac{z}{z^2 - 2z - 3}$ ,  $z_0 = 0$ ;
- 16) а)  $f(z) = \frac{1}{9z+10}$ ,  $z_0 = 0$ ,      б)  $f(z) = \frac{3-z^2}{(1+z)(2+z)}$ ,  $z_0 = 0$ ;
- 17) а)  $f(z) = \frac{1}{10z+3}$ ,  $z_0 = 0$ ,      б)  $f(z) = \frac{5-2z-z^2}{(1+z)(2-z)}$ ,  $z_0 = 1$ ;
- 18) а)  $f(z) = \frac{1}{z}$ ,  $z_0 = 3i$ ,      б)  $f(z) = \frac{3-z}{(1-2z)(2+z)}$ ,  $z_0 = 0$ ;
- 19) а)  $f(z) = \frac{1}{z}$ ,  $z_0 = 4$ ,      б)  $f(z) = \frac{z+8}{(z-2)(z+3)}$ ,  $z_0 = 1$ ;
- 20) а)  $f(z) = \frac{1}{z+2}$ ,  $z_0 = -3i$ ,      б)  $f(z) = \frac{z}{(z-3)(z-4)}$ ,  $z_0 = 1$ .

221. Разложить функцию  $f(z)$  в ряд Тейлора по степеням  $z - z_0$  и найти круг сходимости  $D = \{z : |z - z_0| < R\}$  полученного степенного ряда:

1)  $f(z) = z^2 e^{2z}$ ,  $z_0 = 1$ ;

2)  $f(z) = z \cdot e^{4z}$ ,  $z_0 = 2$ ;

3)  $f(z) = (z^2 + 2z - 8)e^z$ ,  $z_0 = -1$ ;



$$4) f(z) = \sin(2z - z^2), z_0 = 1;$$

$$5) f(z) = \int_0^z \frac{\sin \xi}{\xi} d\xi, z_0 = 0;$$

$$6) f(z) = \int_0^z e^{-\xi^2} d\xi, z_0 = 0;$$

$$7) f(z) = e^z \sin z, z_0 = 0;$$

$$8) f(z) = e^z \cos z, z_0 = 0;$$

$$9) f(z) = e^{2z} \sin 2z, z_0 = 0;$$

$$10) f(z) = \sin 2z \cos 4z, z_0 = 0;$$

$$11) f(z) = \cos z \cos 3z, z_0 = 0;$$

$$12) f(z) = \operatorname{ch} 2z \cdot \operatorname{sh} 4z, z_0 = 0;$$

$$13) f(z) = \int_0^z \frac{1 - \cos \xi}{\xi} d\xi, z_0 = 0;$$

$$14) f(z) = \sin^2 z, z_0 = 0;$$

$$15) f(z) = \sin^4 z + \cos^4 z, z_0 = 0;$$

$$16) f(z) = \cos 2z e^{2z}, z_0 = 0;$$

$$17) f(z) = \sin 3z \cdot 3z, z_0 = 0;$$

$$18) f(z) = \sin(2z + 1), z_0 = -1;$$

$$19) f(z) = \cos(4z + z^2), z_0 = -2;$$

$$20) f(z) = \operatorname{ch}^2 z, z_0 = 0.$$



222. Найти три первых отличных от нуля члена разложения функции  $f(z)$  в ряд Тейлора по степеням  $z - z_0$ , а также **круг сходимости** полученного ряда:

$$1) f(z) = \frac{z}{\sin z}, z_0 = 0;$$

$$2) f(z) = \frac{z}{\ln(1+z)}, z_0 = 0;$$

$$3) f(z) = \frac{z}{(1-z^2)\sin z}, z_0 = 0;$$

$$4) f(z) = \sqrt{\cos z} (f(0) = 1), z_0 = 0;$$

$$5) f(z) = e^{z \ln(1+z)}, z_0 = 0;$$

$$6) f(z) = e^{e^z}, z_0 = 0;$$

$$7) f(z) = e^z \ln(1+z), z_0 = 0;$$

$$8) f(z) = \ln(1+e^z), z_0 = 0;$$

$$9) f(z) = \sin^2 z, z_0 = \frac{\pi}{4};$$

$$10) f(z) = e^{z^2}, z_0 = 1;$$

$$11) f(z) = \int_0^z \frac{\sin \xi}{\xi} d\xi, z_0 = 0;$$

$$12) f(z) = \operatorname{ch} z \cos z, z_0 = 0;$$

$$13) f(z) = z \operatorname{Ln} z (f(1) = 2\pi i), z_0 = 1;$$

$$14) f(z) = \sin(z^2 - 2z), z_0 = 1;$$

$$15) f(z) = \frac{1}{2} \left( \ln \frac{1}{1-z} \right)^2, z_0 = 0;$$



$$16) f(z) = \arcsin z, z_0 = 0;$$

$$17) f(z) = \sqrt{z+3} (f(1) = -2), z_0 = 1;$$

$$18) f(z) = \ln \frac{z+1}{1-z}, z_0 = 0;$$

$$19) f(z) = (z+2) \sin 2z, z_0 = 1;$$

$$20) f(z) = \cos^2 z, z_0 = \frac{\pi}{4}.$$

223. Найти разложение в ряд Тейлора по степеням  $z$  аналитической в окрестности точки  $z_0 = 0$  функции  $f(z)$ , удовлетворяющей условию:

$$1) zf''(z) + (1+z)f'(z) = -e^{-z}, f(0) = -1;$$

$$2) (1+z^2)f'(z) = 1, f(0) = 0;$$

$$3) f''(z) + \lambda^2 f(z) = 0, f(0) = 0, f'(0) = \lambda;$$

$$4) f''(z) + zf(z) = 0, f(0) = 1, f'(0) = 0;$$

$$5) zf''(z) + (1+4z)f(z) = \sin 2z, f(0) = 0, f'(0) = 2;$$

$$6) (1+z)^2 f''(z) - (1+z)f'(z) = 2, f(0) = 0, f'(0) = 1.$$



## 11.3. Задания для самостоятельной работы

224. Разложить функцию  $f(z)$  в **ряд Тейлора** по степеням  $z - z_0$  и найти **круг сходимости**  $D = \{z : |z - z_0| < R\}$  полученного **степенного ряда**:

1)  $f(z) = \operatorname{ch} z \cdot \cos z, z_0 = 0;$

2)  $f(z) = \frac{2z - 1}{4z^2 - 2z + 1}, z_0 = 0;$

3)  $f(z) = \sqrt[3]{z} (\sqrt[3]{1} = 1), z_0 = i;$

4)  $f(z) = \ln z, z_0 = i;$

5)  $f(z) = e^{\frac{z}{1-z}}, z_0 = 0;$

6)  $f(z) = \ln^2(1 - z), z = 0.$

225. Найти разложение в **ряд Тейлора** по степеням  $z$  функции  $f(z)$ , **аналитической** в окрестности точки  $z_0 = 0$  и удовлетворяющей условию:

1)  $(1 + z^2)f'(z) = 1, f(0) = 0;$

2)  $f''(z) + zf(z) = 0, f(0) = 1, f'(0) = 0;$

3)  $(1 - z^2)f''(z) - 5zf(z) - 4f(z) = 0, f(0) = 1, f'(0) = 0;$

4)  $(1 - z^2)f''(z) - 4zf(z) - 2f(z) = 0, f(0) = 0, f'(0) = 1;$

5)  $zf'(z) + (1 - z)f(z) = e^z, f(0) = 1;$

6)  $zf''(z) + (1 + z)f(z) = \cos z, f(0) = 1, f'(0) = 0.$





226. Найти пять первых членов разложения функции  $f(z)$  в ряд Тейлора по степеням  $z$ :

1)  $f(z) = \operatorname{Ln}^2(1 - z)$  ( $f(1) = 2\pi i$ );

2)  $f(z) = \operatorname{Arctg}^2 z$  ( $f(0) = 0$ );

3)  $f(z) = \operatorname{Arctg} z \cdot \ln(1 + z^2)$  ( $\operatorname{Arctg} 0 = 0$ );

4)  $f(z) = \ln \cos z$ ;

5)  $f(z) = \ln \frac{\sin z}{z}$ ;

6)  $f(z) = \operatorname{tg}^2 z$ .

227. Разложить в ряд Тейлора указанные ветви многозначной функции  $f(z)$  по степеням  $z - z_0$ , если:

1)  $f(z) = \sqrt[3]{z}$  ( $f(i) = -i$ ),  $z_0 = i$ ;

2)  $f(z) = \operatorname{Ln} z$  ( $f(i) = \pi/2$ ),  $z_0 = i$ ;

3)  $f(z) = \operatorname{Arcsin} z$  ( $f(0) = 4\pi$ ),  $z_0 = 0$ ;

4)  $f(z) = \sqrt{1 + z^3}$  ( $f(0) = 1$ ),  $z_0 = 0$ ;

5)  $f(z) = \operatorname{Ln} \frac{1+z}{1-z}$  ( $f(0) = 2\pi ni$ ),  $z_0 = 0$ .



## 11.4. Задания творческого характера

228. Доказать, что только одна ветвь функции

$$f(z) = \frac{1}{z} \operatorname{Ln} \frac{1}{1-z}$$

доопределяется в точке  $z_0 = 0$  так, что становится **аналитической** в окрестности этой точки. Найти разложение полученной функции в **ряд Тейлора** по степеням  $z$ .

229. Доказать, что функция

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2-z}+1}$$

допускает в окрестности точки  $z_0 = 0$  выделение двух однозначных **аналитических** ветвей, разлагающихся в **степенные ряды** по степеням  $z$ . Найти эти ряды и показать, что их **радиусы сходимости**  $R = 1$  и  $R = 2$ .

230. Доказать, что функция

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-z)^2}$$

является **аналитической** в области  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{N}$ . Разложить эту функцию в **ряд Тейлора** по степеням  $z$ .

231. Доказать, что функция

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n-z}$$

является **аналитической** в области  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{N}$ . Разложить эту функцию в **ряд Тейлора** по степеням  $z$ .



232. Если в круге  $\{\xi \in \mathbb{C} : |\xi| < R\}$  имеет место равенство

$$F(\xi, z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z) \xi^n,$$

то функцию  $F(\xi, z)$  называют производящей функцией для последовательности  $\{f_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$ .

Доказать, что функция

$$F(\xi, z) = \frac{4 - \xi^2}{4 - 4\xi z + \xi^2}$$

является производящей функцией для полиномов Чебышёва:

$$T_n(z) = \frac{1}{2^{n-1}} \cos(n \arccos z).$$

Пользуясь **интегральными формулами для коэффициентов ряда Тейлора**, показать, что

$$4T_{n+1}(z) - 4zT_n(z) + T_{n-1}(z) = 0 \quad \text{при } n \geq 2.$$

233. Функция

$$F(\xi, z) = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\xi z + \xi^2}}$$

является производящей для полиномов Лежандра  $P_n(z)$ :

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2\xi z + \xi^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(z) \xi^n.$$

Дифференцируя производящую функцию по  $\xi$  и по  $z$ , доказать тождества:

1)  $(n+1)P_{n+1}(z) - (2n+1)zP_n(z) + nP_{n-1}(z) = 0;$

[[Ответ](#)]

2)  $(2n+1)P_n(z) = P'_{n+1}(z) - P'_{n-1}(z);$

[[Ответ](#)]

3)  $P_n(z) = P'_{n+1}(z) - 2zP'_n(z) + P'_{n-1}(z).$

[[Ответ](#)]



234. Разложить в ряд Тейлора по степеням  $z$  функцию

$$f(z) = \cos(m \arcsin z) \quad (\arcsin 0 = 0),$$

составив дифференциальное уравнение, одним из решений которого оно является.

235. Дифференциальное уравнение

$$z(1-z)f''(z) + (c - (a+b+1)z)f'(z) - abf(z) = 0$$

называется гипергеометрическим. Найти **аналитическое** в точке  $z_0 = 0$  решение  $f(z)$  гипергеометрического уравнения, удовлетворяющее условию  $f(0) = 1$ , предполагая, что  $c \notin \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ . Показать, что искомая функция представима в виде **ряда Тейлора**

$$f(z) = f(a, b, c, z) = 1 + \frac{ab}{1 \cdot c}z + \frac{a(a+1)b(b+1)}{2!c(c+1)}z^2 + \dots + \\ + \frac{a(a+1) \dots (a+n-1)b(b+1) \dots (b+n-1)}{n!c(c+1) \dots (c+n-1)}z^n + \dots,$$

**радиус сходимости** которого  $R = 1$ .



Меню

Часть II. Задачи

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 12

# Нули аналитической функции. Теорема единственности

12.1. Задания для аудиторной работы

12.2. Базовые индивидуальные задания

12.3. Задания для самостоятельной работы

12.4. Задания творческого характера



## 12.1. Задания для аудиторной работы

236. Найти все нули  $z_k$  аналитической функции  $w = f(z)$ :

1)  $w = \frac{z^2 + 9}{z^3}$ ; [Ответ]

2)  $w = (z^2 + 4)^3$ ; [Ответ]

3)  $w = z \sin z$ ; [Решение] [Ответ]

4)  $w = \sin^2 z$ ; [Ответ]

5)  $w = 1 - \cos z$ ; [Ответ]

6)  $w = \cos z^3$ . [Ответ]

237. Найти порядок  $n$  нуля  $z_0$  функции  $w = f(z)$ , аналитической в точке  $z_0$ , представив ее в окрестности  $z_0$  в виде

$$f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z),$$

где функция  $\varphi(z)$  аналитична в точке  $z_0$  и отлична от нуля в некоторой окрестности  $z_0$ :

1)  $w = \sin z^3$ ,  $z_0 = 0$ ; [Ответ]

2)  $w = 1 - \cos z^2$ ,  $z_0 = 0$ ; [Ответ]

3)  $w = z^2(e^{z^2} - 1)$ ,  $z_0 = 0$ ; [Решение] [Ответ]

4)  $w = (z - 1) \sin^2(z - 1)$ ,  $z_0 = 1$ ; [Ответ]

5)  $w = 1 - \cos(z + 1)$ ,  $z_0 = -1$ ; [Ответ]

6)  $w = (z - 1)(e^{z-1} - 1)$ ,  $z_0 = 1$ . [Ответ]



238. Найти все нули  $z_k$  аналитической функции  $w = f(z)$ . Для каждого нуля найти его порядок  $n_k$ :

1)  $w = (z^4 - 1)(z - 1)$ ; [Решение] [Ответ]

2)  $w = (1 - e^{-z})(z^2 + 4)^3$ . [Ответ]

3)  $w = \frac{\sin^3 z}{z}$ ; [Ответ]

4)  $w = \frac{(z^2 - \pi^2)^2 \sin z}{z}$ ; [Ответ]

5)  $w = (z^4 + 1)(z^3 - 1)$ ; [Ответ]

6)  $w = (\sqrt{z} - 2)^3$ . [Ответ]

239. Существует ли функция  $w = f(z)$ , аналитическая в круге  $D = \{z : |z| < 2\}$ , для которой выполняются следующие условия?

1)  $f\left(\frac{1}{n}\right) = \begin{cases} 0, & n = 2k + 1, \\ 1, & n = 2k, k \in \mathbb{N}; \end{cases}$  [Решение] [Ответ]

2)  $f\left(\frac{1}{n}\right) = \begin{cases} 0, & n = 2k + 1, \\ \frac{1}{n}, & n = 2k, k \in \mathbb{N}; \end{cases}$  [Ответ]

3)  $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n}{n+1}, n \in \mathbb{N}$ ; [Ответ]

4)  $f\left(\frac{1}{n}\right) = \begin{cases} 0, & n = 1, \\ \frac{1}{n^2}, & n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}. \end{cases}$  [Ответ]

5)  $f\left(\pm \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^2}, n \in \mathbb{N}$ ; [Ответ]



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$6) f\left(\pm\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^3}, n \in \mathbb{N}.$$

[\[Ответ\]](#)

240. Существует ли функция  $w = f(z)$ , аналитическая в круге  $D = \{z : |z| < 2\}$ , для которой выполняются следующие условия?

$$1) f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n + \cos^2 \frac{n\pi}{2}}, n \in \mathbb{N};$$

[\[Решение\]](#) [\[Ответ\]](#)

$$2) f\left(\frac{1}{n}\right) = \sin^2 \frac{n\pi}{2}, n \in \mathbb{N};$$

[\[Ответ\]](#)

$$3) f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \cos n\pi, n \in \mathbb{N};$$

[\[Ответ\]](#)

$$4) f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2n} \cos^2 \frac{n\pi}{2}, n \in \mathbb{N};$$

[\[Ответ\]](#)

$$5) f\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{2n}\right), n \in \mathbb{N};$$

[\[Ответ\]](#)

$$6) f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \cos^2 \frac{n\pi}{2}, n \in \mathbb{N}.$$

[\[Ответ\]](#)





## 12.2. Базовые индивидуальные задания

241. Используя критерий

$$\begin{cases} f(z_k) = f'(z_k) = \dots = f^{(n-1)}(z_k) = 0, \\ f^{(n)}(z_k) \neq 0, \end{cases}$$

найти порядок  $n$  нуля  $z_0$  аналитической функции  $w = f(z)$ .

1)  $w = (z^2 + 1)^2$ ,  $z_0 = i$ ;

2)  $w = (1 - \cos z)^2$ ,  $z_0 = 0$ ;

3)  $w = (1 + \cos z)^2$ ,  $z_0 = \pi$ ;

4)  $w = (e^z - 1)^2$ ,  $z_0 = 0$ ;

5)  $w = z - \sin z$ ,  $z_0 = 0$ ;

6)  $w = \cos z - \cos 2z$ ,  $z_0 = 0$ ;

7)  $w = \sin z - \sin 2z$ ,  $z_0 = 0$ ;

8)  $w = z^2 \cos\left(z + \frac{\pi}{2}\right)$ ,  $z_0 = 0$ ;

9)  $w = (z^2 - 1) \sin \pi z$ ,  $z_0 = 0$ ;

10)  $w = (1 + \cos \pi z)^2$ ,  $z_0 = 1$ ;

11)  $w = (z^2 + \pi^2)^2$ ,  $z_0 = i\pi$ ;

12)  $w = (z^2 - \pi^2) \sin z$ ,  $z_0 = \pi$ ;

13)  $w = \cos z - \cos^2 z$ ,  $z_0 = 0$ ;



$$14) w = \sin z \cos \left( z + \frac{\pi}{2} \right), z_0 = 0;$$

$$15) w = (z^2 - 1) \sin \pi z, z_0 = 1;$$

$$16) w = \sin \pi z \cos \frac{\pi}{2} z, z_0 = 1;$$

$$17) w = z(e^z - 1), z_0 = 1;$$

$$18) w = (z^2 + 1)^8, z_0 = i;$$

$$19) w = (z^4 - 1)^2, z_0 = 1;$$

$$20) w = z \sin z \cos \left( z + \frac{\pi}{2} \right), z_0 = 0.$$

242. Найти порядок  $n$  нуля  $z_0$  функции  $w = f(z)$ , аналитической в точке  $z_0$ , представив ее в окрестности  $z_0$  в виде

$$f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z),$$

где функция  $\varphi(z)$  аналитична в точке  $z_0$  и отлична от нуля в некоторой окрестности  $z_0$ :

$$1) w = z \sin z^2, z_0 = 0;$$

$$2) w = \sin z^2 - z^2, z_0 = 0;$$

$$3) w = 1 - \cos z^3, z_0 = 1;$$

$$4) w = z^2(1 - \cos z^2), z_0 = 0;$$

$$5) w = (z - \pi)^2(1 - \cos 2z), z_0 = \pi;$$

$$6) w = (e^{z^3} - 1)z, z_0 = 0;$$

$$7) w = e^{z^2} - e^z, z_0 = 0;$$

$$8) w = 1 - \cos^2 \pi z, z_0 = 1;$$

$$9) w = e^{z^4} - e^{z^2}, z_0 = 0;$$



$$10) w = z^4(e^{z^2} - e^z), z_0 = 0;$$

$$11) w = z^2(\sin z^2 - \sin z), z_0 = 0;$$

$$12) w = z^3(\cos z^2 - \cos z^3), z_0 = 0;$$

$$13) w = (e^{z^2} - 1)z^5, z_0 = 0;$$

$$14) w = z^2 \cos\left(\frac{\pi}{2} + z^2\right), z_0 = 0;$$

$$15) w = z(z - \sin z), z_0 = 0;$$

$$16) w = z^2 \left(1 - \frac{z^2}{2} - \cos z\right), z_0 = 0;$$

$$17) w = z \left(z - \frac{z^3}{6} - \sin z\right), z_0 = 0;$$

$$18) w = (z - 1)^2(1 - \cos \pi z), z_0 = 1;$$

$$19) w = (z - i)^2 \sin(z - i)^3, z_0 = i;$$

$$20) w = e^{z^2} - \cos z^2, z_0 = 0.$$

243. Найти все нули  $z_k$  аналитической функции  $w = f(z)$ . Для каждого нуля найти его порядок  $n_k$ :

$$1) w = (e^z - 1)(z^4 + 4z^2);$$

$$2) w = z^2 \sin^2 z \cdot (z^3 + i);$$

$$3) w = (z^2 + \pi^2) \sin z;$$

$$4) w = \frac{1 - \operatorname{ctg} z}{z}(z^2 + 1);$$

$$5) w = (e^{\sin z} - 1)(z^2 + 4)^3;$$

$$6) w = (e^{1 - \cos z} - 1)(z^2 - 9)^3;$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$7) w = \frac{\sin^2 z}{z}(z^5 + 16z);$$

$$8) w = z \sin^2 z \cdot (z^2 + 10z + 25);$$

$$9) w = z(1 - \cos z)(z^2 + 2z + 2);$$

$$10) w = (z^4 + 1)^2 \cdot \cos^3 z;$$

$$11) w = \left(z - \frac{\pi}{2}\right)^4 \cos z;$$

$$12) w = \frac{\sin^3 z}{z}(z^2 + 2z + 1);$$

$$13) w = z(z^3 - 1)(1 - \cos z);$$

$$14) w = (z^2 + \pi^2) \sin \pi z;$$

$$15) w = (e^z + 1)(z^4 + 16);$$

$$16) w = (\sin z + 2)(z^4 + 81);$$

$$17) w = (3 - \cos z)(z^2 + 4)(z + 3)^2;$$

$$18) w = \frac{\sin z}{z^7}(z^2 + 4)^3;$$

$$19) w = (1 - \operatorname{ch} z)(z^2 + 1)(z^2 - 3z + 2)^2;$$

$$20) w = (z^2 + \pi^2) \operatorname{sh} z.$$



## 12.3. Задания для самостоятельной работы

244. Найти порядок нуля  $z_0$  аналитической функции  $w = f(z)$ :

1)  $w = 6 \sin z^3 + z^3(z^6 - 6)$ ,  $z_0 = 0$ ;

2)  $w = e^{\sin z} - e^{\operatorname{tg} z}$ ,  $z_0 = 0$ ;

3)  $w = \frac{(z^2 - 4\pi^2) \sin z}{z^2}$ ,  $z_0 = 0$ ;

4)  $w = z^3(e^{z^3} - e^z)$ ,  $z_0 = 0$ ;

5)  $w = (z - 1)^2 \sin^2(z - 1)^2$ ,  $z_0 = 1$ ;

6)  $w = (1 - \sqrt{2 - 2 \cos z})^2$ ,  $z_0 = \frac{\pi}{3}$ ;

7)  $w = (\sqrt{z} - 2)^3$ ,  $z_0 = 4$ ;

8)  $w = \cos z^3$ ,  $z_0 = \frac{\pi}{2}$ ;

9)  $w = \cos^3 z$ ,  $z_0 = \frac{\pi}{2}$ ;

10)  $w = (1 - \sqrt{2 - 2 \sin z})^2$ ,  $z_0 = \frac{\pi}{6}$ .

245. Существует ли функция  $w = f(z)$ , аналитическая в круге  $D = \{z : |z - z_0| < 2\}$ , для которой выполняются следующие условия?

1)  $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1 + (-1)^n}{n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $z_0 = 0$ ;

2)  $f\left(\frac{n}{n+1}\right) = -f\left(\frac{n+2}{n+1}\right) = -\frac{1}{(n+1)^3}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $z_0 = 1$ ;



$$3) f\left(\frac{1}{n}\right) = 2^{-n}, n \in \mathbb{N}, z_0 = 0;$$

$$4) \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right| < 2^{-n}, n \in \mathbb{N}, z_0 = 0;$$

$$5) f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{3n}{n+2}, n \in \mathbb{N}, z_0 = 0;$$

$$6) f(z) = f(3z), z \in D, f(z) \neq \text{const}, z_0 = 0;$$

$$7) f(z) = f\left(\frac{z}{2}\right), z \in D, f(z) \neq \text{const}, z_0 = 0;$$

$$8) f(z) = f(z^2), z, z^2 \in D, f(z) \neq \text{const}, z_0 = 0;$$

$$9) f(z) = f(\sqrt{z}), z \in D, f(z) \neq \text{const}, z_0 = 0, \sqrt{1} = 1;$$

$$10) f\left(\frac{1}{n}\right) = 3^{-n}, n \in \mathbb{N}, z_0 = 0.$$



## 12.4. Задания творческого характера

246. Функция  $f(z) = \cos \frac{1}{z}$  имеет бесконечную последовательность нулей  $z_n = \frac{2}{(2n+1)\pi}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , сходящуюся к нулю. Однако  $f(z) \not\equiv 0$ . Нет ли здесь противоречия с теоремой единственности?
247. Точка  $z_0$  называется  $A$ -точкой аналитической функции  $w = f(z)$ , если  $f(z) = A$ . Может ли последовательность  $A$  точек функции, отличной от тождественно равной постоянной и аналитической в  $\mathbb{C}$ , иметь предельную точку?
248. С помощью теоремы единственности доказать, что для всех  $z \in \mathbb{C}$  выполняются равенства.
- 1)  $\sin 2z = 2 \sin z \cos z$ ;
  - 2)  $\operatorname{ch} 2z = \operatorname{sh}^2 z + \operatorname{ch}^2 z$ ;
  - 3)  $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ ;
  - 4)  $e^z \cdot e^{-z} = 1$ .
249. Пусть функция  $w = f(z)$  является аналитической в окрестности некоторой точки и множество  $E$ , принимаемой ею в этой окрестности значений, конечно. Доказать, что  $E$  состоит из одной точки.
250. Пусть функция  $w = f(z)$ , аналитическая в односвязной области  $D(f)$ , принимает только целые значения. Доказать, что  $f(z) = \operatorname{const}$  в  $D(f)$ .
251. Пусть функция  $w = f(z)$  является аналитической в области  $G$  и некоторая точка  $z_0 \in G$  является ее нулем бесконечного порядка, т.е.  $f(z_0) = 0$  и для любого  $n \in \mathbb{N}$  все производные  $f^{(n)}(z_0) = 0$ . Доказать, что  $f(z) \equiv 0$  в  $G$ .
252. Пусть  $p \in \mathbb{N}$  и  $p \geq 2$ . Существует ли отличная от тождественно равной постоянной и аналитическая в некоторой окрестности точки  $z_0$  функция  $w = f(z)$ , удовлетворяющая в этой окрестности условию  $f(z) = f(z^p)$ ?



253. Доказать, что если функция  $w = f(z)$  является аналитической в единичном круге  $D = \{z : |z| < 1\}$  и в каждой точке его границы, то она аналитически продолжается и в некоторый круг  $D_\rho = \{z : |z| < \rho\}$ ,  $\rho > 1$ .
254. Пусть функция  $w = f(z)$  аналитична в некоторой окрестности точки  $z_0$  и  $f(z_0) = 0$ . Доказать, что если  $f(z)$  тождественно не равна нулю, то найдется окрестности точки  $z_0$ , в которой нет нулей  $f(z)$ , отличных от  $z_0$ .
255. Используя теорему единственности доказать, что

$$\int_0^{+\infty} e^{-zt} dt = \frac{1}{z}, \quad \text{если } \operatorname{Re} z > 0.$$





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 13

# Ряд Лорана

- 13.1. Задания для аудиторной работы
- 13.2. Базовые индивидуальные задания
- 13.3. Задания для самостоятельной работы
- 13.4. Задания творческого характера



## 13.1. Задания для аудиторной работы

256. Разложить функцию  $f(z)$  в ряд Лорана в кольце  $K$ :

1)  $f(z) = \frac{z}{z^2 - 4z + 3};$

а)  $K = \{z : 1 < |z| < 3\};$

б)  $K = \{z : 0 < |z - 1| < 2\};$

в)  $K = \{z : 3 < |z| < +\infty\};$

[Ответ]

2)  $f(z) = \frac{z}{(z - i)(z + 3)};$

а)  $K = \{z : 1 < |z| < 3\};$

б)  $K = \{z : \sqrt{2} < |z - 1| < 4\};$

в)  $K = \{z : 3 < |z| < +\infty\};$

[Ответ]

3)  $f(z) = \frac{3}{z^2 + z - 2};$

а)  $K = \{z : |z| < 1\};$

б)  $K = \{z : 1 < |z| < 2\};$

в)  $K = \{z : 2 < |z| < +\infty\};$

[Ответ]

4)  $f(z) = \frac{1}{z^2 - z};$

а)  $K = \{z : 0 < |z| < 1\};$

б)  $K = \{z : 1 < |z + 1| < 2\};$

в)  $K = \{z : 1 < |z| < +\infty\};$

[Ответ]

5)  $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1};$

а)  $K = \{z : |z| < 1\};$

б)  $K = \{z : 0 < |z - i| < 2\};$

в)  $K = \{z : 1 < |z| < +\infty\};$

[Ответ]



$$6) f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z + 2};$$

$$а) K = \{z : |z| < 1\};$$

$$б) K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

$$в) K = \{z : 2 < |z| < +\infty\}.$$

[\[Решение\]](#) [\[Ответ\]](#)

257. Применяя почленное дифференцирование рядов, найти разложение в ряд Лорана функции  $f(z)$  в кольце  $K$ :

$$1) f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^2}, K = \{z : 0 < |z - i| < 2\};$$

[\[Ответ\]](#)

$$2) f(z) = \frac{1}{(z-1)^2(z+2)}, K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

[\[Ответ\]](#)

$$3) f(z) = \frac{1}{z(z-3)^2}, K = \{z : 1 < |z-1| < 2\};$$

[\[Ответ\]](#)

$$4) f(z) = \frac{z}{(z+1)^2(z-2)}, K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

[\[Ответ\]](#)

$$5) f(z) = \frac{1}{z^2(z^2-9)}, K = \{z : 1 < |z-1| < 2\};$$

[\[Ответ\]](#)

$$6) f(z) = \frac{1}{z(z+3)^2}, K = \{z : 1 < |z+1| < 2\}.$$

[\[Решение\]](#) [\[Ответ\]](#)

258. Разложить функцию  $f(z)$  в ряд Лорана в кольце  $K$ :

$$1) f(z) = z^4 \cos \frac{1}{z}, K = \{z : 0 < |z| < +\infty\};$$

[\[Ответ\]](#)

$$2) f(z) = z^2 e^{\frac{1}{z}}, K = \{z : 0 < |z| < +\infty\};$$

[\[Ответ\]](#)

$$3) f(z) = (z-1)e^{\frac{1}{1-z}}, K = \{z : 0 < |z-1| < +\infty\};$$

[\[Ответ\]](#)

$$4) f(z) = z^2 \sin \frac{1}{z-1}, K = \{z : 0 < |z-1| < +\infty\};$$

[\[Ответ\]](#)



$$5) f(z) = \sin \frac{z}{1-z}, K = \{z : 0 < |z-1| < +\infty\}; \quad [\text{Ответ}]$$

$$6) f(z) = \cos \frac{z^2 - 4z}{(z-2)^2}, K = \{z : 0 < |z-2| < +\infty\}. \quad [\text{Решение}] [\text{Ответ}]$$

259. Выяснить, допускает ли функция  $f(z)$  разложение в ряд Лорана в некоторой проколотой окрестности точки  $z_0$ :

$$1) f(z) = \ln z, z_0 = 0; \quad [\text{Ответ}]$$

$$2) f(z) = \frac{z}{\sin z - 2}, z_0 = \infty; \quad [\text{Ответ}]$$

$$3) f(z) = \frac{z^3}{\sin \frac{1}{z}}, z_0 = 0; \quad [\text{Ответ}]$$

$$4) f(z) = \operatorname{ctg} z, z_0 = \infty; \quad [\text{Ответ}]$$

$$5) f(z) = \cos \frac{1}{z}, z_0 = 0; \quad [\text{Ответ}]$$

$$6) f(z) = \frac{z}{1 - \cos z}, z_0 = \infty. \quad [\text{Решение}] [\text{Ответ}]$$



## 13.2. Базовые индивидуальные задания

260. Разложить функцию  $f(z)$  в ряд Лорана в кольце  $K$ :

1)  $f(z) = \frac{1}{z^2 - 3z}$ ;

а)  $K = \{z : 0 < |z| < 3\}$ ;

б)  $K = \{z : 1 < |z - 1| < 2\}$ ;

в)  $K = \{z : 3 < |z| < +\infty\}$ ;

2)  $f(z) = \frac{1}{z^2 - 5z + 6}$ ;

а)  $K = \{z : 2 < |z| < 3\}$ ;

б)  $K = \{z : 0 < |z - 2| < 1\}$ ;

в)  $K = \{z : 3 < |z| < +\infty\}$ ;

3)  $f(z) = \frac{1}{z^2 - z - 6}$ ;

а)  $K = \{z : 2 < |z| < 3\}$ ;

б)  $K = \{z : 0 < |z - 3| < 5\}$ ;

в)  $K = \{z : 3 < |z| < +\infty\}$ ;

4)  $f(z) = \frac{1}{z^2 + z - 12}$ ;

а)  $K = \{z : 3 < |z| < 4\}$ ;

б)  $K = \{z : 0 < |z + 4| < 7\}$ ;

в)  $K = \{z : 4 < |z| < +\infty\}$ ;

5)  $f(z) = \frac{z}{z^2 + 4z + 3}$ ;

а)  $K = \{z : 1 < |z| < 3\}$ ;

б)  $K = \{z : 0 < |z + 1| < 2\}$ ;

в)  $K = \{z : 3 < |z| < +\infty\}$ ;



$$6) f(z) = \frac{z+3}{z^2+z-2};$$

$$а) K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z+2| < 3\};$$

$$в) K = \{z : 2 < |z| < +\infty\};$$

$$7) f(z) = \frac{z+3}{z^2+z-12};$$

$$а) K = \{z : 3 < |z| < 4\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z-3| < 7\};$$

$$в) K = \{z : 4 < |z| < +\infty\};$$

$$8) f(z) = \frac{z+4}{z^2-z-2};$$

$$а) K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z+1| < 3\};$$

$$в) K = \{z : 2 < |z| < +\infty\};$$

$$9) f(z) = \frac{z}{z^2+3z+2};$$

$$а) K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z+2| < 1\};$$

$$в) K = \{z : 2 < |z| < +\infty\};$$

$$10) f(z) = \frac{z+5}{z^2-2z-3};$$

$$а) K = \{z : 1 < |z| < 3\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z+1| < 4\};$$

$$в) K = \{z : 3 < |z| < +\infty\};$$

$$11) f(z) = \frac{z-1}{z^2+8z+15};$$

$$а) K = \{z : 3 < |z| < 5\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z-3| < 2\};$$

$$в) K = \{z : 5 < |z| < +\infty\};$$



$$12) f(z) = \frac{1}{z^2 + 12z + 11};$$

$$а) K = \{z : 1 < |z| < 11\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z + 1| < 10\};$$

$$в) K = \{z : 11 < |z| < +\infty\};$$

$$13) f(z) = \frac{1}{z(1 - z)};$$

$$а) K = \{z : 0 < |z| < 1\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z - 1| < 1\};$$

$$в) K = \{z : 1 < |z| < +\infty\};$$

$$14) f(z) = \frac{1}{z^2 + 1};$$

$$а) K = \{z : 0 < |z - i| < 2\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z + i| < 2\};$$

$$в) K = \{z : 1 < |z| < +\infty\};$$

$$15) f(z) = \frac{1}{z^2 + 9};$$

$$а) K = \{z : 0 < |z - 3i| < 6\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z + 3i| < 6\};$$

$$в) K = \{z : 0 < |z| < +\infty\};$$

$$16) f(z) = \frac{z}{(z - i)(z - 1)};$$

$$а) K = \{z : 0 < |z - 1| < \sqrt{2}\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z - i| < \sqrt{2}\};$$

$$в) K = \{z : 1 < |z| < +\infty\};$$

$$17) f(z) = \frac{1}{(z - i)(z + 2i)};$$

$$а) K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z - i| < 3\};$$

$$в) K = \{z : 3 < |z| < +\infty\};$$



$$18) f(z) = \frac{1}{(z+1)(z+i\sqrt{3})};$$

$$а) K = \{z : 0 < |z+1| < 2\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z+i\sqrt{3}| < 2\};$$

$$в) K = \{z : \sqrt{3} < |z| < +\infty\};$$

$$19) f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-1+i)};$$

$$а) K = \{z : 1 < |z| < \sqrt{2}\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z-1| < 1\};$$

$$в) K = \{z : \sqrt{2} < |z| < +\infty\};$$

$$20) f(z) = \frac{1}{(z+1+i)(z+2+2i)};$$

$$а) K = \{z : \sqrt{2} < |z| < 2\sqrt{2}\};$$

$$б) K = \{z : 0 < |z+1+i| < \sqrt{2}\};$$

$$в) K = \{z : 2\sqrt{2} < |z| < +\infty\}.$$

261. Применяя, где это необходимо, почленное дифференцирование рядов, найти разложение в ряд Лорана функции  $f(z)$  в кольце  $K$ :

$$1) f(z) = \frac{1}{(z^2+9)^2}, K = \{z : 0 < |z+3i| < 6\};$$

$$2) f(z) = \frac{1}{z(z-3)^2}, K = \{z : 0 < |z| < 3\};$$

$$3) f(z) = \frac{1}{(z-i)^2(z+i)}, K = \{z : 0 < |z+i| < 2\};$$

$$4) f(z) = \frac{1}{(z+1)^2(z-i)}, K = \{z : 0 < |z-i| < 2\};$$

$$5) f(z) = \frac{1}{(z+1)^2(z-2)^2}, K = \{z : 0 < |z-2| < 3\};$$





$$6) f(z) = \frac{z}{(z^2 + 4)^2}, K = \{z : 0 < |z + 2i| < 4\};$$

$$7) f(z) = \frac{1}{(z - i)^2(z - 2i)^2}, K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

$$8) f(z) = \frac{z}{(z - 1)^2(z - 2)^2}, K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

$$9) f(z) = \frac{1}{(z + i)^2(z + 3i)^2}, K = \{z : 0 < |z + 3i| < 2\};$$

$$10) f(z) = \frac{1}{(z^2 - 4)^2}, K = \{z : 0 < |z - 2| < 4\};$$

$$11) f(z) = \frac{z}{(z - i)^2(z + 1)}, K = \{z : 0 < |z + 1| < \sqrt{2}\};$$

$$12) f(z) = \frac{1}{z(z^2 + 1)^2}, K = \{z : 0 < |z| < 1\};$$

$$13) f(z) = \frac{1}{(z - i)^2(z + 2i)^2}, K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

$$14) f(z) = \frac{1}{(z^2 + 16)^2}, K = \{z : 0 < |z - 4i| < 8\};$$

$$15) f(z) = \frac{1}{(z - 1)^4}, K = \{z : 0 < |z| < 1\};$$

$$16) f(z) = \frac{1}{(z - 1)^4}, K = \{z : 1 < |z| < +\infty\};$$

$$17) f(z) = \frac{1}{(z + 2)^3}, K = \{z : 2 < |z| < +\infty\};$$

$$18) f(z) = \frac{1}{(z + i)^3}, K = \{z : 0 < |z| < 1\};$$



$$19) f(z) = \frac{1}{(z+i)^3}, K = \{z : 1 < |z| < +\infty\};$$

$$20) f(z) = \frac{1}{(z+1)^3(z-1)}, K = \{z : 0 < |z-1| < 2\}.$$

262. Разложить функцию  $f(z)$  в ряд Лорана в кольце  $K$ :

$$1) f(z) = z \cos \frac{1}{z-1}, K = \{z : 0 < |z-1| < +\infty\};$$

$$2) f(z) = \sin \frac{z}{z-1}, K = \{z : 0 < |z-1| < +\infty\};$$

$$3) f(z) = ze^{\frac{z}{z-1}}, K = \{z : 0 < |z-1| < +\infty\};$$

$$4) f(z) = (z-1)e^{\frac{1}{(1-z)^2}}, K = \{z : 0 < |z-1| < +\infty\};$$

$$5) f(z) = \sin \frac{z^2 + 2z}{(z+1)^2}, K = \{z : 0 < |z+1| < +\infty\};$$

$$6) f(z) = \cos \frac{z^2 - 2z}{(z-1)^2}, K = \{z : 0 < |z-1| < +\infty\};$$

$$7) f(z) = \operatorname{ch} \frac{z}{z-1}, K = \{z : 0 < |z-1| < +\infty\};$$

$$8) f(z) = z \operatorname{ch} \frac{1}{z+2}, K = \{z : 0 < |z+2| < +\infty\};$$

$$9) f(z) = \operatorname{sh} \frac{z}{z+1}, K = \{z : 0 < |z+1| < +\infty\};$$

$$10) f(z) = \operatorname{ch} \frac{z^2 - 4z}{(z-2)^2}, K = \{z : 0 < |z-2| < +\infty\};$$

$$11) f(z) = z \operatorname{sh} \frac{1}{z+1}, K = \{z : 0 < |z+1| < +\infty\};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$12) f(z) = \sin \frac{z}{z-i}, K = \{z : 0 < |z-i| < +\infty\};$$

$$13) f(z) = e^{\frac{z^2+2z}{(z+1)^2}}, K = \{z : 1 < |z+1| < +\infty\};$$

$$14) f(z) = e^{\frac{z}{z+1}}, K = \{z : 0 < |z+1| < +\infty\};$$

$$15) f(z) = \frac{ze^{2z}}{z-1}, K = \{z : 0 < |z-1| < +\infty\};$$

$$16) f(z) = \frac{ze^z}{z+1}, K = \{z : 0 < |z+1| < +\infty\};$$

$$17) f(z) = \ln \frac{z+i}{z+2i}, K = \{z : 2 < |z| < +\infty\};$$

$$18) f(z) = \frac{\operatorname{ch} z}{z+1}, K = \{z : 0 < |z+1| < +\infty\};$$

$$19) f(z) = \frac{\operatorname{sh}(z+2)}{z}, K = \{z : 0 < |z| < +\infty\};$$

$$20) f(z) = \ln \frac{z-1}{z-2}, K = \{z : 2 < |z| < +\infty\}.$$



## 13.3. Задания для самостоятельной работы

263. Разложить функцию  $f(z)$  в ряд Лорана в кольце  $K$ :

$$1) f(z) = \frac{z}{(z^2 - 4)^2(z - 1)}, K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

$$2) f(z) = \frac{z}{(z^2 - 4)^2(z - 1)}, K = \{z : 2 < |z| < +\infty\};$$

$$3) f(z) = \frac{z^2 - z + 3}{z^3 - 3z + 2}, K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

$$4) f(z) = \frac{z^2 - z + 3}{z^3 - 3z + 2}, K = \{z : 2 < |z| < +\infty\};$$

$$5) f(z) = \frac{z^2}{(z^2 + 1)^2}, K = \{z : 0 < |z - i| < 2\};$$

$$6) f(z) = \frac{z}{(z - 1)^2(z - 2i)}, K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

$$7) f(z) = \frac{z^2 - 2z + 5}{(z - 2)(z^2 + 1)}, K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

$$8) f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^3}, K = \{z : 0 < |z - i| < 2\};$$

$$9) f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^3}, K = \{z : 2 < |z| < +\infty\};$$

$$10) f(z) = \frac{1}{(z^2 + 9)^3}, K = \{z : 0 < |z + 3i| < 6\}.$$



264. Разложить функцию  $f(z)$  в ряд Лорана в кольце  $K$ :

$$1) f(z) = \sin \frac{z}{1+z}, K = \{z : 0 < |z+1| < +\infty\};$$

$$2) f(z) = \ln \frac{z-1}{z+1}, K = \{z : 1 < |z| < +\infty\};$$

$$3) f(z) = \ln \frac{z-a}{z-b}, K = \{z : \max\{|a|, |b|\} < |z| < +\infty\};$$

$$4) f(z) = \frac{1}{(z-a)^2(z-b)^2} \quad (0 < |a| < |b|), K = \{z : |a| < |z| < |b|\};$$

$$5) f(z) = \frac{1}{(z-a)^2(z-b)^2} \quad (0 < |a| < |b|), K = \{z : 0 < |z-a| < |b-a|\};$$

$$6) f(z) = \frac{1}{z-2} \ln \frac{z-i}{z+i}, K = \{z : 1 < |z| < 2\};$$

$$7) f(z) = \frac{1}{z-2} \ln \frac{z-i}{z+i}, K = \{z : 2 < |z| < +\infty\};$$

$$8) f(z) = \frac{ze^{2z}}{z-a}, K = \{z : 0 < |z-a| < +\infty\};$$

$$9) f(z) = \cos \frac{z^2 - 2az}{(z-a)^2}, K = \{z : 0 < |z-a| < +\infty\};$$

$$10) f(z) = z^2 \sin \frac{z}{z-a}, K = \{z : 0 < |z-a| < +\infty\}.$$

265. Выяснить, допускает ли функция  $f(z)$  разложение в ряд Лорана в некоторой проколотой окрестности точки  $z_0$ :

$$1) f(z) = \ln \frac{z-1}{z+i}, z_0 = \infty;$$

$$2) f(z) = \ln \frac{z}{(z+1)^2}, z_0 = \infty;$$



$$3) f(z) = z^\pi := e^{\pi \ln z}, z_0 = 0;$$

$$4) f(z) = \frac{z}{\sin^2 z}, z_0 = 0;$$

$$5) f(z) = \frac{z}{2 + \sin z}, z_0 = \infty;$$

$$6) f(z) = \ln \frac{1}{1 - z}, z_0 = \infty;$$

$$7) f(z) = \operatorname{th} \frac{1}{z}, z_0 = 0;$$

$$8) f(z) = \operatorname{sh} \frac{1}{z - 1}, z_0 = 1;$$

$$9) f(z) = z^\alpha := e^{\alpha \ln z}, z_0 = 0;$$

$$10) f(z) = \sin \frac{1}{z}, z_0 = 0.$$

266. Выяснить, имеет ли многозначная функция  $F(z)$  однозначную ветвь  $f(z)$ , допускающую разложение в ряд Лорана в окрестности точки  $z_0$ :

$$1) F(z) = \sqrt{z}, z_0 = 0;$$

[\[Ответ\]](#)

$$2) F(z) = \sqrt{z(z-1)}, z_0 = \infty;$$

[\[Ответ\]](#)

$$3) F(z) = \sqrt{1 + \sqrt{z}}, z_0 = 0;$$

[\[Ответ\]](#)

$$4) F(z) = \operatorname{Arcsin} z, z_0 = 0;$$

[\[Ответ\]](#)

$$5) F(z) = \operatorname{Arsh}(z + i), z_0 = 0;$$

[\[Ответ\]](#)

$$6) F(z) = \sqrt{1 + \sqrt{z}}, z_0 = 1;$$

[\[Ответ\]](#)

$$7) F(z) = \operatorname{Ln}((z+1)(z+2)), z_0 = \infty;$$

[\[Ответ\]](#)

$$8) F(z) = \operatorname{Arctg}(z+1), z_0 = 0.$$

[\[Ответ\]](#)



## 13.4. Задания творческого характера

267. Разложить в ряд Лорана функцию  $\operatorname{ctg} z$ :

1) в кольце  $K = \{z : 0 < |z| < \pi\}$ ;

2) в кольце  $K = \{z : \pi < |z| < 2\pi\}$ .

268. Найти противоречие с ???теоремой единственности для рядов Лорана??? в следующей цепочке равенств:

$$0 = \frac{1}{z-1} + \frac{1}{1-z} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} + \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} z^n.$$

269. При  $t > 0$  и всех  $z$  из кольца  $\{z : 0 < |z| < +\infty\}$  получить разложение функции

$$f(z) = \exp\left(\frac{t}{2}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right)$$

в ряд Лорана

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(t) z^n,$$

где

$$J_n(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(n+k)!} \left(\frac{t}{2}\right)^{n+2k}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$



270. Доказать, что разложение в ряд Лорана функции

$$f(z) = \operatorname{ch} \left( z + \frac{1}{z} \right)$$

в кольце  $K = \{z : 0 < |z| < +\infty\}$  имеет вид:

$$\operatorname{ch} \left( z + \frac{1}{z} \right) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left( z^n + \frac{1}{z^n} \right),$$

где

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{ch}(2 \cos \theta) \cos n\theta \, d\theta.$$

271. Используя замену  $z = e^{it}$  и разложение в ряд Лорана в кольце  $K = \{z : 0 < |z| < \infty\}$  функции

$$f(z) = \frac{1}{2i} \left( e^z - e^{\frac{1}{z}} \right),$$

доказать, что при  $t \in (0, 2\pi)$ :

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nt}{n!} = e^{\cos t} \sin(\sin t);$$

$$2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nt}{n} = \frac{\pi - t}{2}.$$





Меню

Часть II. Задачи

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 14

# Изолированные особые точки аналитической функции

14.1. Задания для аудиторной работы

14.2. Базовые индивидуальные задания

14.3. Задания для самостоятельной работы

14.4. Задания творческого характера



## 14.1. Задания для аудиторной работы

272. Найти конечные **особые точки** функции  $f(z)$  и определить их тип:

1)  $f(z) = \frac{e^z}{1+z^2}$ ; [Ответ]

2)  $f(z) = \frac{1}{z+z^5}$ ; [Ответ]

3)  $f(z) = \frac{z^2}{(1+z^3)^2}$ ; [Ответ]

4)  $f(z) = \frac{1-\cos z}{z^2}$ ; [Ответ]

5)  $f(z) = z^2 \cos \frac{\pi}{z}$ ; [Ответ]

6)  $f(z) = \frac{z}{1-\cos z}$ . [Ответ]

273. Найти все **особые точки** функции  $f(z)$  и исследовать их характер (включая **бесконечность**):

1)  $f(z) = z e^{-1/z}$ ; [Ответ]

2)  $f(z) = \frac{\cos z}{z^2}$ ; [Ответ]

3)  $f(z) = \frac{1-\cos z}{\sin^2 z}$ ; [Ответ]

4)  $f(z) = \frac{1}{z^3(2-\cos z)}$ . [Решение] [Ответ]

5)  $f(z) = \frac{z^2+1}{e^z}$ ; [Ответ]



$$б) f(z) = \frac{e^z}{z(1 - e^{-z})}.$$

[\[Решение\]](#) [\[Ответ\]](#)

274. Найти все **особые точки** функции  $f(z)$  и исследовать их характер (включая **бесконечность**):

$$1) f(z) = \frac{\operatorname{tg} z}{z};$$

[\[Ответ\]](#)

$$2) f(z) = e^{\frac{z}{1-z}};$$

[\[Ответ\]](#)

$$3) f(z) = \sin \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2};$$

[\[Ответ\]](#)

$$4) f(z) = \operatorname{ctg} z - \frac{1}{z};$$

[\[Ответ\]](#)

$$5) f(z) = \operatorname{tg}^2 z;$$

[\[Ответ\]](#)

$$б) f(z) = \sin \left( \frac{1}{\sin \frac{1}{z}} \right).$$

[\[Решение\]](#) [\[Ответ\]](#)

275. Определить, является ли точка  $z = \infty$  **изолированной особой точкой** функции  $f(z)$ :

$$1) f(z) = \operatorname{tg} \frac{1}{z};$$

[\[Ответ\]](#)

$$2) f(z) = \operatorname{th} z;$$

[\[Ответ\]](#)

$$3) f(z) = \frac{1}{e^z + 1};$$

[\[Ответ\]](#)

$$4) f(z) = \frac{1}{\sin z};$$

[\[Ответ\]](#)

$$5) f(z) = \frac{1 - e^z}{1 + e^z};$$

[\[Ответ\]](#)

$$б) f(z) = \frac{1}{\sin z + \cos z}.$$

[\[Решение\]](#) [\[Ответ\]](#)



## 14.2. Базовые индивидуальные задания

276. Найти конечные **особые точки** функции  $f(z)$  и определить их тип:

1) а)  $f(z) = \frac{z^2}{z^2 + 2z + 2}$ ,      б)  $f(z) = \frac{\cos z}{z - z^3}$ ;

2) а)  $f(z) = \frac{z^3}{(z^4 + i)(z^2 + 9)}$ ,      б)  $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ ;

3) а)  $f(z) = \frac{z}{(z^4 + 1)(z^2 + 4)}$ ,      б)  $f(z) = ze^{\frac{1}{z}}$ ;

4) а)  $f(z) = \frac{z^4}{1 + z^4}$ ,      б)  $f(z) = \frac{e^z}{\cos z}$ ;

5) а)  $f(z) = \frac{z^2 - 4}{(z^2 + z + 1)(z^3 + 1)}$ ,      б)  $f(z) = \frac{z}{1 + \cos z}$ ;

6) а)  $f(z) = \frac{z^3 - 81}{(z^2 + 6z + 10)(z^4 - i)}$ ,      б)  $f(z) = e^{\frac{z}{1-z}}$ ;

7) а)  $f(z) = \frac{z}{(z^2 - 2z + 5)(z^3 + 1)}$ ,      б)  $f(z) = \frac{1}{e^z + 1}$ ;

8) а)  $f(z) = \frac{z^2 + z}{(z^2 - 4z + 5)(z^4 + 1)}$ ,      б)  $f(z) = \frac{1}{z(2 + \cos z)}$ ;

9) а)  $f(z) = \frac{z^3}{(1 + z)^4}$ ,      б)  $f(z) = \frac{\sin z^2}{z}$ ;

10) а)  $f(z) = \frac{z^2}{(z^3 + 1)(z^2 + 8z + 25)}$ ,      б)  $f(z) = ze^{-z^2}$ ;



$$11) \text{ а) } f(z) = \frac{1}{z + z^3}, \quad \text{б) } f(z) = \frac{z^3}{e^z};$$

$$12) \text{ а) } f(z) = \frac{1}{z^2(z^2 + 1)^2}, \quad \text{б) } f(z) = \frac{\cos 2z}{(z - 1)^2};$$

$$13) \text{ а) } f(z) = \frac{z^3 - 27}{(z^2 + 4z + 20)(z^4 - 1)}, \quad \text{б) } f(z) = z^3 \sin \frac{1}{z};$$

$$14) \text{ а) } f(z) = \frac{z^3 + 8}{(z^2 - 6z + 34)(z^4 + 1)}, \quad \text{б) } f(z) = \frac{1}{\sin z};$$

$$15) \text{ а) } f(z) = \frac{z}{(z^2 - 8z + 17)(z^3 + 1)}, \quad \text{б) } f(z) = \frac{1}{\cos z};$$

$$16) \text{ а) } f(z) = \frac{z^6 - 1}{(z^2 + 2z + 37)(z^2 + 1)}, \quad \text{б) } f(z) = \frac{1}{\sin z - \cos z};$$

$$17) \text{ а) } f(z) = \frac{z^2}{(z^2 - 4z + 29)(z^2 + 81)}, \quad \text{б) } f(z) = \frac{1 + e^z}{1 - e^z};$$

$$18) \text{ а) } f(z) = \frac{z}{(z^2 + 6z + 13)(z^3 + i)}, \quad \text{б) } f(z) = \frac{e^z}{(1 + z^2)^3};$$

$$19) \text{ а) } f(z) = \frac{z^3 + 125}{(z^2 + 8z + 25)(z^4 + 1)}, \quad \text{б) } f(z) = \frac{z}{2 + \sin z};$$

$$20) \text{ а) } f(z) = \frac{z^3 + 27}{(z^2 + 6z + 10)(z^2 - i)}, \quad \text{б) } f(z) = \frac{z + \frac{\pi}{4}}{\sin z + \cos z}.$$

277. Найти все **особые точки** функции  $f(z)$  и исследовать их характер (включая **бесконечность**):

$$1) f(z) = z^2 e^{-\frac{1}{z}};$$

$$2) f(z) = \frac{\sin z}{z^3};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$3) f(z) = \frac{z + \frac{\pi}{4}}{\sin z - \cos z};$$

$$4) f(z) = \frac{2 - e^z}{2 + e^z};$$

$$5) f(z) = e^{\frac{z}{z+1}};$$

$$6) f(z) = \frac{1}{e^z - 1} - \frac{1}{z};$$

$$7) f(z) = \frac{1 - e^z}{2 + e^z};$$

$$8) f(z) = \frac{z^2}{e^z + 1};$$

$$9) f(z) = \frac{\cos^2 z}{z^2};$$

$$10) f(z) = \operatorname{ctg} \frac{1}{z} - \frac{1}{z};$$

$$11) f(z) = \frac{e^z}{4 + z^2};$$

$$12) f(z) = \frac{z^2 + 16}{e^z};$$

$$13) f(z) = \frac{1}{\operatorname{sh} z - \operatorname{ch} z};$$

$$14) f(z) = \frac{1}{\operatorname{sh} z};$$

$$15) f(z) = \frac{i + e^z}{i - e^z};$$

$$16) f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^4};$$



$$17) f(z) = \frac{z}{1 + \operatorname{ch} z};$$

$$18) f(z) = z^5 e^{-z^4};$$

$$19) f(z) = \frac{\sin \pi z}{(z + 1)^3};$$

$$20) f(z) = z e^{-z}.$$

278. Определить, является ли точка  $z = \infty$  для функции  $f(z)$  **изолированной особой точкой**. В случае положительного ответа указать ее тип:

$$1) f(z) = \frac{\sin z}{z^5 - 1};$$

$$2) f(z) = \frac{1}{\sin^2 z};$$

$$3) f(z) = \operatorname{th} \frac{1}{z};$$

$$4) f(z) = \operatorname{cth} \frac{1}{z};$$

$$5) f(z) = e^z \sin \frac{1}{z};$$

$$6) f(z) = z^6 e^{\frac{1}{z}};$$

$$7) f(z) = \frac{1}{e^z + e};$$

$$8) f(z) = \cos z - \sin z;$$

$$9) f(z) = \frac{z^4 + 1}{e^z};$$

$$10) f(z) = \frac{z^6 + 1}{z^2 + z};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$11) f(z) = \frac{z^2}{1 + z^4};$$

$$12) f(z) = e^{-z} \cos \frac{1}{z};$$

$$13) f(z) = \frac{\sin \pi z}{(z - 1)^3};$$

$$14) f(z) = \frac{(z^2 + 1)^2}{z^2 + 4};$$

$$15) f(z) = \frac{z^2 + 2}{z^{10} + 2};$$

$$16) f(z) = z^4 \cos \frac{1}{z^2};$$

$$17) f(z) = z^3 e^{-3z};$$

$$18) f(z) = z^2 \operatorname{ch} \frac{1}{z};$$

$$19) f(z) = \frac{\sin \frac{1}{2}}{1 + z};$$

$$20) f(z) = \sin z \sin \frac{1}{z}.$$





## 14.3. Задания для самостоятельной работы

279. Найти все **особые точки** функции  $f(z)$  и исследовать их характер (включая **бесконечность**):

$$1) f(z) = \sin\left(\frac{1}{\cos \frac{1}{z}}\right);$$

$$2) f(z) = \frac{1}{\cos z + \cos a};$$

$$3) f(z) = \frac{1}{\sin z - \sin a};$$

$$4) f(z) = \sin \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2};$$

$$5) f(z) = e^{\operatorname{tg} \frac{1}{z}};$$

$$6) f(z) = \frac{z^7}{(z^2 - 4)^2 \cos \frac{1}{z-2}};$$

$$7) f(z) = \operatorname{ctg} \frac{1}{z} - \frac{1}{z};$$

$$8) f(z) = \operatorname{ctg} \frac{1}{z} - \frac{2}{z};$$

$$9) f(z) = \operatorname{tg}^2 z;$$

$$10) f(z) = \frac{e^{\frac{1}{z-1}}}{e^z - 1};$$

$$11) f(z) = \frac{1 - e^{2z}}{1 + e^{2z}};$$

$$12) f(z) = \sin z + \cos \frac{1}{z}.$$



280. Доказать, что точка  $z_0$  является **существенно особой точкой** для функции  $f(z)$ :

1)  $f(z) = e^{-z^3}$ ,  $z_0 = \infty$ ;

2)  $f(z) = \sin \frac{\pi}{z^2 + z}$ ,  $z_0 = 0$ ;

3)  $f(z) = \sin(e^z)$ ,  $z_0 = \infty$ ;

4)  $f(z) = z^3 \cos \frac{\pi}{z}$ ,  $z_0 = 0$ ;

5)  $f(z) = e^{\operatorname{tg} z}$ ,  $z_0 = \frac{\pi}{2}$ ;

6)  $f(z) = \cos \frac{\pi}{z^2 + 1}$ ,  $z_0 = i$ ;

7)  $f(z) = e^{\frac{1}{z^2}}$ ,  $z_0 = 0$ ;

8)  $f(z) = \cos z - \sin z$ ,  $z_0 = \infty$ ;

9)  $f(z) = \frac{z^2 + 1}{e^z}$ ,  $z_0 = \infty$ ;

10)  $f(z) = \sin \frac{\pi}{z}$ ,  $z_0 = 0$ ;

11)  $f(z) = \cos(e^z)$ ,  $z_0 = \infty$ ;

12)  $f(z) = \cos \frac{z}{z-1}$ ,  $z_0 = 1$ .

281. Определить характер **особой точки**  $z_0 = 0$  функции  $f(z)$ :

1)  $f(z) = \exp \frac{\sin z}{z}$ ;

2)  $f(z) = \frac{e^z}{\sin z - z + \frac{z^3}{6}}$ ;

3)  $f(z) = (e^z - 1 - z) \operatorname{ctg}^3 z$ ;



$$4) f(z) = \frac{\sin 2z}{\cos z - 1 + \frac{z^2}{2}};$$

$$5) f(z) = e^{\frac{1}{z^2 - z}};$$

$$6) f(z) = \frac{1 + e^{z^2}}{1 - e^{z^2}};$$

$$7) f(z) = \frac{1}{z - \sin z};$$

$$8) f(z) = z^2 \operatorname{ctg} \frac{1}{z}.$$

282. Выяснить, является ли точка  $z_0$  **правильной** или особой для каждой из однозначных ветвей многозначной функции  $f(z)$ . В случае, если она является особой, указать характер особенности:

$$1) f(z) = \frac{z}{1 + \sqrt{z-2}}, z_0 = 3;$$

$$2) f(z) = \frac{1}{\sqrt{z} + \sqrt[3]{z}}, z_0 = 1;$$

$$3) f(z) = \frac{2z + 1}{1 + z - 2\sqrt{z}}, z_0 = 1;$$

$$4) f(z) = \cos \frac{1}{1 + \sqrt{z}}, z_0 = 1;$$

$$5) f(z) = \frac{z + 1}{1 + \sqrt{z-3}}, z_0 = 4;$$

$$6) f(z) = \frac{1}{\sin \frac{\operatorname{Ln} z}{2i}}, z_0 = 1;$$

$$7) f(z) = \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{z}{z-2}}}, z_0 = \infty;$$



$$8) f(z) = \operatorname{ctg} \frac{1}{1 + \sqrt{z}}, z_0 = \left(1 + \frac{1}{\pi}\right)^2.$$

283. Пусть  $P_n(z)$  и  $Q_m(z)$  — полиномы степеней  $n$  и  $m$  соответственно. Охарактеризовать поведение при  $z \rightarrow \infty$  следующих функций:

1)  $P_n(z) + Q_m(z)$ ;

2)  $\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$ ;

3)  $P_n(z) \cdot Q_m(z)$ ;

4)  $(P_n(z))^k, k \in \mathbb{Z}$ ;

5)  $\exp(P_n(z))$ ;

6)  $\sin \frac{P_n(z)}{Q_m(z)}$ ;

7)  $P_n(Q_m(z))$ ;

8)  $\exp\left(\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}\right)$ .



## 14.4. Задания творческого характера

284. Пусть  $f(z)$  — однозначная **аналитическая** функция, не имеющая в области  $G$  других особенностей, кроме **полюсов**. Доказать, что функция  $f'(z)/f(z)$  (логарифмическая производная функции  $f(z)$ ) имеет **простые полюсы** во всех полюсах функции  $f(z)$  и во всех нулях этой функции и не имеет в  $G$  никаких других **особых точек**.
285. Какую особенность имеет в точке  $z = z_0$  функции  $F(z) = f(\varphi(z))$ , если  $\varphi$  в этой точке **аналитична** или имеет **полюс**, а точка  $\xi_0 = \varphi(z_0)$  является для функции  $f$ :
- устранимой точкой**;
  - полюсом порядка  $n$** ;
  - существенно особой точкой**?
286. Пусть  $z_0$  — **изолированная особая точка** для функции  $f(z)$  и  $\operatorname{Re} f(z) > 0$  в некоторой окрестности этой точки. Доказать, что  $z_0$  является **устранимой особой точкой** для функции  $f(z)$ .
287. Показать, что функция обратная к **целой**, не может быть также **целой**, кроме случая линейной функции.
288. Пусть  $z_0$  — **изолированная особая точка** для функции  $f(z)$ , удовлетворяющей в некоторой окрестности этой точки неравенству  $|f(z)| < M|z - z_0|^{-m}$ , где  $m$  и  $M$  — положительные постоянные. Доказать, что  $z_0$  не может быть **существенно особой точкой** функции  $f(z)$ .
289. Пусть  $z_0$  — **существенно особая точка** функции  $f(z)$ . Чем является точка  $z_0$  для функции

$$\frac{1}{f(z)(f(z) - a)},$$

где  $a \in \mathbb{C}$  и  $a \neq 0$ ?



290. Теорема Пикара утверждает, что в окрестности существенно особой точки аналитическая функция принимает бесконечно много раз всякое конечное значение, за исключением, быть может, одного, которое называется пикаровским исключительным значением. Если рассматривать мероморфные функции, то возможное число исключительных значений (включая и  $\infty$  не превосходит двух.

Найти исключительные значения для каждой из следующих функций  $f(z)$  и показать, что эти значения (если они существуют) являются асимптотическими, т.е. что можно указать хотя бы одну линию оканчивающуюся в существенно особой точке, вдоль которой функция стремится к исключительному значению:

1)  $f(z) = e^z$ ;

2)  $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$ ;

3)  $f(z) = \cos \frac{1}{z}$ ;

4)  $f(z) = \operatorname{tg} z$ ;

5)  $f(z) = \operatorname{tg}^2(z)$ .



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 15

# Вычисление вычетов

- 15.1. Задания для аудиторной работы
- 15.2. Базовые индивидуальные задания
- 15.3. Задания для самостоятельной работы
- 15.4. Задания творческого характера



## 15.1. Задания для аудиторной работы

291. Найти **вычет** функции  $f(z)$  в указанной точке  $z_0$ :

1) а)  $f(z) = e^{\frac{1}{z-i}}$ ,  $z_0 = i$ ;

б)  $f(z) = \frac{e^{z^2}-1}{z^3-z^2}$ ,  $z_0 = 0$ ;

[Решение] [Ответ]

2) а)  $f(z) = \frac{z^3-1}{z-1}$ ,  $z_0 = 1$ ;

б)  $f(z) = \frac{\sin^2 z}{z^3}$ ,  $z_0 = 0$ ;

[Ответ]

3) а)  $f(z) = z^2 \sin \frac{1}{z-1}$ ,  $z_0 = 1$ ;

б)  $f(z) = \frac{\operatorname{tg} z^2}{z^4+z^2}$ ,  $z_0 = 0$ ;

[Ответ]

4) а)  $f(z) = z \cos \frac{1}{z-2}$ ,  $z_0 = 2$ ;

б)  $f(z) = \operatorname{ctg} z - \frac{1}{z}$ ,  $z_0 = 0$ ;

[Ответ]

5) а)  $f(z) = \frac{1}{e^z-1} - \frac{1}{\sin z}$ ,  $z_0 = 0$ ;

б)  $f(z) = \frac{e^z}{z \sin z}$ ,  $z_0 = 0$ .

[Ответ]

292. Найти **вычет** функции  $f(z)$  в бесконечно удаленной точке:

1)  $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$ ;

[Решение] [Ответ]

2)  $f(z) = \cos z$ ;

[Решение] [Ответ]

3)  $f(z) = \sin z$ ;

[Ответ]

4)  $f(z) = \sin \frac{1}{1-z}$ ;

[Ответ]

5)  $f(z) = \frac{z^3}{z+2}$ .

[Ответ]





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

293. Найти **вычеты** функции  $f(z)$  относительно каждого **полюса**:

1) а)  $f(z) = \frac{e^z}{z-1}$ ;

б)  $f(z) = \frac{z^2}{(z+1)^3}$ ;

[Решение] [Ответ]

2) а)  $f(z) = \frac{z^2+1}{z-2}$ ;

б)  $f(z) = \frac{\sin \pi z}{(z-1)^3}$ ;

[Ответ]

3) а)  $f(z) = \operatorname{ctg} z$ ;

б)  $f(z) = \frac{\cos z}{(z-1)^2}$ ;

[Ответ]

4) а)  $f(z) = \operatorname{tg} z$ ;

б)  $f(z) = \frac{\sin z}{(z-\pi)^2}$ .

[Ответ]

294. Найти **вычеты** функции  $f(z)$  во всех ее **особых точках**:

1)  $f(z) = \frac{z+1}{z^2(z-1)}$ ;

[Решение] [Ответ]

2)  $f(z) = \frac{e^z}{(z+1)^3(z-2)}$ ;

[Ответ]

3)  $f(z) = \frac{1}{z^4+1}$ ;

[Ответ]

4)  $f(z) = \frac{z}{(z+1)^3(z-2)^2}$ ;

[Ответ]

5)  $f(z) = \frac{z^2}{(z^2+1)^2}$ .

[Ответ]



## 15.2. Базовые индивидуальные задания

295. Найти **вычет** функции  $f(z)$  в указанной точке  $z_0$ :

$$1) f(z) = \frac{e^z}{(25 + z^2) \sin 5z}, z_0 = 0;$$

$$2) f(z) = \frac{e^{3z}}{z^3}, z_0 = 0;$$

$$3) f(z) = \frac{z^{14}}{(1 + z)^7}, z_0 = -1;$$

$$4) f(z) = \frac{z^6}{z - i}, z_0 = i;$$

$$5) f(z) = \frac{1}{(z - 2)^2(z - 3)}, z_0 = 2;$$

$$6) f(z) = \frac{1}{z^2(z - 4)}, z_0 = 0;$$

$$7) f(z) = \frac{z e^{8z} - e^z + 1}{z(e^z - 1)}, z_0 = 2\pi i;$$

$$8) f(z) = \frac{z e^{iz}}{z^2 + 81}, z_0 = 9i;$$

$$9) f(z) = \frac{e^z}{(9 + z^2) \sin 3z}, z_0 = 0;$$

$$10) f(z) = \frac{e^{4z}}{z^4}, z_0 = 0;$$



$$11) f(z) = \frac{z^4}{(1+z)^4}, z_0 = -1;$$

$$12) f(z) = \frac{z^3}{z-i}, z_0 = i;$$

$$13) f(z) = \frac{1}{(z-7)^2(z-8)}, z_0 = 7;$$

$$14) f(z) = \frac{1}{z^2(z-5)}, z_0 = 0;$$

$$15) f(z) = \frac{z e^{2z} - e^z + 1}{z(e^z - 1)}, z_0 = 2\pi i;$$

$$16) f(z) = \frac{z e^{iz}}{z^2 + 64}, z_0 = 8i;$$

$$17) f(z) = \frac{e^z}{(49 + z^2) \sin 7z}, z_0 = 0;$$

$$18) f(z) = \frac{e^{6z}}{z^6}, z_0 = 0;$$

$$19) f(z) = \frac{z^8}{(1+z)^8}, z_0 = -1;$$

$$20) f(z) = \frac{z^8}{z-i}, z_0 = i.$$

296. Найти **вычеты** в конечных **особых точках** функции  $f(z)$ :

$$1) f(z) = \frac{\sin z^2}{z^3 - 2z^2};$$

$$2) f(z) = \frac{1}{64z^3 - z^5};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$3) f(z) = \frac{z}{(z^2 + 9)^2};$$

$$4) f(z) = \frac{z}{(z^2 + 16)(z - 4)};$$

$$5) f(z) = \frac{1}{16 - z^4};$$

$$6) f(z) = \frac{1}{z(1 - e^{5z})};$$

$$7) f(z) = \frac{1 - \cos 9z}{z^3(z - 9)};$$

$$8) f(z) = \frac{e^{iz}}{(z^2 - 49)(z + 14)};$$

$$9) f(z) = \frac{\sin z}{z^2(z + 3\pi)^2};$$

$$10) f(z) = \frac{\sin z^6}{z^7 - 6z^6};$$

$$11) f(z) = \frac{1}{4z^3 - z^5};$$

$$12) f(z) = \frac{z}{(z^2 + 25)^2};$$

$$13) f(z) = \frac{z}{(z^2 + 49)(z - 7)};$$

$$14) f(z) = \frac{1}{81 - z^4};$$

$$15) f(z) = \frac{1}{z(1 - e^{4z})};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$16) f(z) = \frac{1 - \cos 5z}{z^3(z - 5)};$$

$$17) f(z) = \frac{e^{iz}}{(z^2 - 4)(z + 4)};$$

$$18) f(z) = \frac{\sin z}{z^2(z + 8\pi)^2};$$

$$19) f(z) = \frac{\sin z^3}{z^4 - 3z^3};$$

$$20) f(z) = \frac{1}{36z^3 - z^5}.$$

297. Найти **вычеты** в **особых точках** функции  $f(z)$ :

$$1) f(z) = e^{\frac{1}{z^4}} \cos z;$$

$$2) f(z) = z^6 e^{\frac{1}{z^3}};$$

$$3) f(z) = (z - 4) e^{\frac{1}{z-5}};$$

$$4) f(z) = \frac{e^{z+7}}{z + 7};$$

$$5) f(z) = e^{z^8 + \frac{1}{z^8}};$$

$$6) f(z) = z^2 \cos \frac{1}{z - 6};$$

$$7) f(z) = z^2 \sin \frac{1}{z + 3};$$

$$8) f(z) = z^5 e^{\frac{1}{z}};$$

$$9) f(z) = \cos \frac{1}{z} + z^4;$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$10) f(z) = e^{\frac{z}{z-2}};$$

$$11) f(z) = e^{\frac{1}{z^{12}}} \cos z;$$

$$12) f(z) = z^8 e^{\frac{1}{z^4}};$$

$$13) f(z) = (z-2) e^{\frac{1}{z-3}};$$

$$14) f(z) = \frac{e^{z+2}}{z+2};$$

$$15) f(z) = e^{z^{14} + \frac{1}{z^{14}}};$$

$$16) f(z) = z^2 \cos \frac{1}{z-2};$$

$$17) f(z) = z^2 \sin \frac{1}{z+6};$$

$$18) f(z) = z^3 e^{\frac{1}{z}};$$

$$19) f(z) = \cos \frac{1}{z} + z^5;$$

$$20) f(z) = e^{\frac{z}{z-6}}.$$

298. Найти **вычет** функции  $f(z)$  в бесконечно удаленной точке:

$$1) f(z) = e^{\frac{1}{z-6}};$$

$$2) f(z) = \cos 4z;$$

$$3) f(z) = \sin 5z;$$

$$4) f(z) = \frac{z^3}{z+3};$$

$$5) f(z) = \frac{\sin \frac{1}{z}}{z-2};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$6) f(z) = \frac{e^{\frac{1}{z}}}{(z-7)^2};$$

$$7) f(z) = \frac{z}{25+z^2};$$

$$8) f(z) = \frac{z^2}{(4+z)(5-z)};$$

$$9) f(z) = e^{\frac{1}{z-3}};$$

$$10) f(z) = \cos 6z;$$

$$11) f(z) = \sin 2z;$$

$$12) f(z) = \frac{z^3}{z+4};$$

$$13) f(z) = \frac{\sin \frac{1}{z}}{z-6};$$

$$14) f(z) = \frac{e^{\frac{1}{z}}}{(z-2)^2};$$

$$15) f(z) = \frac{z}{9+z^2};$$

$$16) f(z) = \frac{z^2}{(5+z)(6-z)};$$

$$17) f(z) = e^{\frac{1}{z-4}};$$

$$18) f(z) = \cos 5z;$$

$$19) f(z) = \sin 3z;$$

$$20) f(z) = \frac{z^3}{z+6}.$$



Меню

Часть II. Задачи

Глава 15. Вычисление вычетов

15.3. Задания для самостоятельной работы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 15.3. Задания для самостоятельной работы





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 15.4. Задания творческого характера



Меню

Часть II. Задачи

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 16

# Вычисление интегралов с помощью вычетов

16.1. Задания для аудиторной работы

16.2. Базовые индивидуальные задания

16.3. Задания для самостоятельной работы

16.4. Задания творческого характера



## 16.1. Задания для аудиторной работы

299. Полагая, что обход **контуров** происходит в **положительном направлении**, вычислить следующие интегралы:

1)  $\int_L \frac{dz}{(z-1)^2(z^2+1)}$ , где  $L$  — окружность  $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$ ; [Решение] [Ответ]

2)  $\int_L \frac{z dz}{(z-1)^2(z+2)}$ , где  $L$  — астроида  $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 3^{\frac{2}{3}}$ ; [Ответ]

3)  $\int_L \frac{dz}{(z-1)(z^2+1)}$ , где  $L$  — окружность  $x^2 + y^2 = 4$ ; [Ответ]

4)  $\int_L \frac{dz}{z(z+4)}$ , где  $L$  — окружность  $x^2 + y^2 = 9$ ; [Ответ]

5)  $\int_L \frac{z dz}{(z+1)(z^2+1)}$ , где  $L$  — окружность  $x^2 + (y+1)^2 = 1$ ; [Ответ]

6)  $\int_L e^{\frac{3}{z}} dz$ , где  $L$  — окружность  $x^2 + y^2 = 1$ . [Ответ]

300. С помощью **основной теоремы о вычетах**, вычислить следующие интегралы:

1)  $\int_{|z|=2} \frac{\operatorname{ch} z dz}{(z+1)^3(z-1)}$ ; [Решение] [Ответ]



$$2) \int_{|z|=3} \frac{z^2 dz}{(z^2 + 1)(z - 2)};$$

[Ответ]

$$3) \int_{|z|=4} \frac{dz}{z^5 - z^3};$$

[Ответ]

$$4) \int_{|z-i|=1} \frac{z dz}{e^z - i};$$

[Ответ]

$$5) \int_{|z|=1} \frac{e^z dz}{z - \frac{\pi}{4} i}.$$

[Ответ]

301. С помощью **вычета в бесконечно удаленной точке**, вычислить следующие интегралы:

$$1) \int_{|z|=2} \frac{z dz}{(z^2 + 1)(z - 1)};$$

[Решение] [Ответ]

$$2) \int_{|z|=3} \frac{z^{17} dz}{(z^2 + 2)^3(z^3 + 3)^4};$$

[Ответ]

$$3) \int_{|z|=1} \frac{z^2 + 1}{z^3} dz;$$

[Ответ]

$$4) \int_{|z|=2} \frac{dz}{1 + z^{12}};$$

[Ответ]

$$5) \int_{|z|=3} \frac{z^9 dz}{z^{10} - 1}.$$

[Ответ]



## 16.2. Базовые индивидуальные задания

302. Используя вычет в бесконечно удаленной точке, вычислить интегралы:

$$1) \text{ а) } \int_{|z-3-3i|=6} \frac{\cos \frac{1}{z}}{iz+3} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=6} \frac{dz}{(z-9)(z^5-243)};$$

$$2) \text{ а) } \int_{|z-8-8i|=16} \frac{\cos \frac{1}{z}}{iz+8} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=8} \frac{z^9 dz}{(z^2+1)^2(z^2+2)^3};$$

$$3) \text{ а) } \int_{|z|=20} \frac{e^{\frac{1}{z+10}}}{z-10} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=1} \frac{z^3 dz}{10z^4+1};$$

$$4) \text{ а) } \int_{|z|=14} \frac{e^{\frac{1}{z+7}}}{z-7} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=20} \frac{z^{18} dz}{(z^2+1)^2(z^5+2)^3};$$

$$5) \text{ а) } \int_{|z|=10} \frac{e^{\frac{1}{z+5}}}{z-5} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=16} \frac{z^{15} dz}{(z^2+1)^2(z^4+2)^3};$$

$$6) \text{ а) } \int_{|z-5-5i|=10} \frac{\cos \frac{1}{z}}{iz+5} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=1} \frac{z^3 dz}{4z^4+1};$$

$$7) \text{ а) } \int_{|z-4-4i|=8} \frac{\cos \frac{1}{z}}{iz+4} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=4} \frac{dz}{(z-6)(z^5-32)};$$

$$8) \text{ а) } \int_{|z|=4} \frac{e^{\frac{1}{z+2}}}{z-2} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=1} \frac{z^3 dz}{2z^4+1};$$



$$9) \text{ а) } \int_{|z-6-6i|=12} \frac{\cos \frac{1}{z}}{iz+6} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=8} \frac{dz}{(z-12)(z^5-1024)};$$

$$10) \text{ а) } \int_{|z|=16} \frac{e^{\frac{1}{z+8}}}{z-8} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=4} \frac{z^6 dz}{(z^2+1)^2(z+2)^3};$$

$$11) \text{ а) } \int_{|z|=6} \frac{e^{\frac{1}{z+3}}}{z-3} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=12} \frac{z^{12} dz}{(z^2+1)^2(z^3+2)^3};$$

$$12) \text{ а) } \int_{|z|=18} \frac{e^{\frac{1}{z+9}}}{z-9} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=2} \frac{dz}{(z-3)(z^5-1)};$$

$$13) \text{ а) } \int_{|z|=2} \frac{e^{\frac{1}{z+1}}}{z-1} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=1} \frac{z^3 dz}{5z^4+1};$$

$$14) \text{ а) } \int_{|z-1-i|=2} \frac{\cos \frac{1}{z}}{iz+1} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=1} \frac{z^3 dz}{z^4+1};$$

$$15) \text{ а) } \int_{|z|=8} \frac{e^{\frac{1}{z+4}}}{z-4} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=1} \frac{z^3 dz}{3z^4+1};$$

$$16) \text{ а) } \int_{|z-2-2i|=4} \frac{\cos \frac{1}{z}}{iz+2} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=1} \frac{z^3 dz}{7z^4+1};$$

$$17) \text{ а) } \int_{|z|=12} \frac{e^{\frac{1}{z+6}}}{z-6} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=1} \frac{z^3 dz}{6z^4+1};$$



$$18) \text{ а) } \int_{|z-7-7i|=14} \frac{\cos \frac{1}{z}}{iz+7} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=3} \frac{dz}{(z+5)(z^4-1)};$$

$$19) \text{ а) } \int_{|z-9-9i|=18} \frac{\cos \frac{1}{z}}{iz+9} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=4} \frac{z^7 dz}{(z^2+4)^2(z-i)^2};$$

$$20) \text{ а) } \int_{|z|=5} \frac{e^{\frac{1}{z+2}}}{z-3} dz, \quad \text{б) } \int_{|z|=5} \frac{dz}{(z-7)(z^3-64)}.$$

303. Вычислить интегралы:

$$1) \text{ а) } \int_{|z|=5} \frac{z^{12} - 7z^{10} + 8z^7 + 25z^4 + 15z + 5}{z^5} dz,$$

$$\text{б) } \int_{|z+4i|=12} \frac{e^z dz}{(z+4)^3(z-8)}, \quad \text{в) } \int_{|z+5i|=\frac{5}{2}} \frac{(z+5)^2 dz}{1 - \cos(z+5i)};$$

$$2) \text{ а) } \int_{|z+i|=2} \frac{dz}{z^2(z+1)}, \quad \text{б) } \int_{|z+4i|=12} \frac{e^z dz}{(z-4)(z+8)},$$

$$\text{в) } \int_{|z-1-i|=2} \frac{e^z - 1}{z} dz;$$

$$3) \text{ а) } \int_{|z|=6} \frac{z dz}{(z-3)(z^2+9)}, \quad \text{б) } \int_{|z+3i|=9} \frac{e^z dz}{(z+3)^3(z-6)},$$

$$\text{в) } \int_{|z+1|=\frac{1}{2}} e^{\frac{z}{z+1}} dz;$$



$$4) \text{ а) } \int_{|z|=5} \frac{z^3 dz}{z^4 - 256}, \quad \text{б) } \int_{|z+5i|=15} \frac{e^z dz}{(z+5)^3(z-10)},$$

$$\text{в) } \int_{|z|=\frac{1}{2}} z \cos^2 \frac{1}{z} dz;$$

$$5) \text{ а) } \int_L \frac{dz}{(z-1)^2(z^2+1)}, \text{ где } L : x^2 + y^2 = 2x + 2y,$$

$$\text{б) } \int_{|z|=4} \frac{(z+3) dz}{(z-3) \sin z}, \quad \text{в) } \int_{|z|=6} \sin \frac{1}{z} dz;$$

$$6) \text{ а) } \int_L \frac{dz}{(z+4)^2(z^2+16)}, \text{ где } L : x^2 + y^2 + 8x + 8y = 0,$$

$$\text{б) } \int_{|z+3i|=9} \frac{\cos z dz}{(z-3)(z+6)}, \quad \text{в) } \int_{|z-2-2i|=4} \frac{e^{2z} - 1}{z} dz;$$

$$7) \text{ а) } \int_{|z|=3} \frac{z^{10} - 5z^8 + 6z^5 + 9z^2 + 9z + 3}{z^3} dz,$$

$$\text{б) } \int_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{e^{2z} dz}{z^2(z^2-4)}, \quad \text{в) } \int_{|z|=\frac{1}{2}} z \cos^2 \frac{10}{z} dz;$$

$$8) \text{ а) } \int_L \frac{dz}{(z-4)^2(z^2+16)}, \text{ где } L : x^2 + y^2 = 8x + 8y,$$

$$\text{б) } \int_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{e^{3z} dz}{z^2(z^2-9)}, \quad \text{в) } \int_{|z|=\frac{1}{2}} z \cos^2 \frac{4}{z} dz;$$





$$9) \text{ а) } \int_{|z+5i|=6} \frac{dz}{z^2(z^2+25)}, \quad \text{б) } \int_{|z|=6} \frac{(z+5) dz}{(z-5) \sin z},$$

$$\text{в) } \int_{|z+4|=2} e^{\frac{z}{z+4}} dz;$$

$$10) \text{ а) } \int_{|z+3i|=4} \frac{dz}{z^2(z^2+9)}, \quad \text{б) } \int_{|z+i|=3} \frac{e^z dz}{(z-1)(z+2)},$$

$$\text{в) } \int_{|z|=1} \frac{e^{9z}}{z \sin z} dz;$$

$$11) \text{ а) } \int_{|z+4i|=5} \frac{dz}{z^2(z^2+16)}, \quad \text{б) } \int_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{e^{5z} dz}{z^2(z^2-25)},$$

$$\text{в) } \int_{|z|=\frac{1}{2}} z \cos^2 \frac{5}{z} dz;$$

$$12) \text{ а) } \int_{|z+2i|=3} \frac{dz}{z^2(z^2+4)}, \quad \text{б) } \int_{|z|=2} \frac{e^{\frac{1}{z}} - 1}{z^4 + 1} dz,$$

$$\text{в) } \int_{|z+7|=\frac{7}{2}} e^{\frac{z}{z+7}} dz;$$

$$13) \text{ а) } \int_L \frac{dz}{(z-2)^2(z^2+4)}, \text{ где } L : x^2 + y^2 = 4x + 4y,$$

$$\text{б) } \int_{|z+4i|=12} \frac{\cos z dz}{(z-4)(z+8)}, \quad \text{в) } \int_{|z|=\frac{1}{2}} z \cos^2 \frac{6}{z} dz;$$



$$14) \text{ а) } \int_{|z|=6} \frac{z^3 dz}{z^4 - 625}, \quad \text{б) } \int_{|z+2i|=6} \frac{e^z dz}{(z-2)(z+4)},$$

$$\text{в) } \int_{|z|=\frac{1}{2}} z \cos^2 \frac{z}{2} dz;$$

$$15) \text{ а) } \int_{|z|=4} \frac{z^3 dz}{z^4 - 81}, \quad \text{б) } \int_{|z|=5} \frac{e^{\frac{1}{z}} - 1}{z^4 + 256} dz,$$

$$\text{в) } \int_{|z|=4} \sin \frac{1}{z} dz;$$

$$16) \text{ а) } \int_{|z|=8} \frac{z dz}{(z-4)(z^2+16)}, \quad \text{б) } \int_{|z+3i|=9} \frac{e^z dz}{(z-3)(z+6)},$$

$$\text{в) } \int_{|z+5i|=\frac{5}{2}} e^{\frac{z}{z+5}} dz;$$

$$17) \text{ а) } \int_L \frac{dz}{(z-3)^2(z^2+9)}, \text{ где } L : x^2 + y^2 = 6x + 6y,$$

$$\text{б) } \int_{|z+5i|=15} \frac{\cos z dz}{(z-5)(z+10)}, \quad \text{в) } \int_{|z+3i|=\frac{3}{2}} e^{\frac{z}{z+3}} dz;$$

$$18) \text{ а) } \int_{|z|=2} \frac{z^3 dz}{z^4 - 1}, \quad \text{б) } \int_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{e^z dz}{z^2(z^2 - 1)},$$

$$\text{в) } \int_{|z+9i|=\frac{9}{2}} z \frac{(z+9)^2}{1 - \cos(z-9i)} dz;$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$19) \text{ а) } \int_{|z|=10} \frac{z dz}{(z-5)(z^2+25)}, \quad \text{б) } \int_{|z|=4} \frac{e^{\frac{1}{z}} - 1}{z^4 + 81} dz,$$

$$\text{в) } \int_{|z|=2} \sin \frac{1}{z} dz;$$

$$20) \text{ а) } \int_L \frac{dz}{(z+1)^2(z^2+1)}, \text{ где } L : x^2 + y^2 + 2x + 2y = 0,$$

$$\text{б) } \int_{|z+5i|=15} \frac{e^z dz}{(z-5)(z+10)}, \quad \text{в) } \int_{|z+6|=3} e^{\frac{z}{z+6}} dz.$$



Меню

Часть II. Задачи

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

16.3. Задания для самостоятельной работы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 16.3. Задания для самостоятельной работы



Меню

Часть II. Задачи

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

16.4. Задания творческого характера



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 16.4. Задания творческого характера



Меню

Часть II. Задачи

Глава 17. Вычисление определенных интегралов



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 17

# Вычисление определенных интегралов

17.0. Некоторые предварительные сведения

17.1. Задания для аудиторной работы

17.2. Базовые индивидуальные задания

17.3. Задания для самостоятельной работы

17.4. Задания творческого характера



## 17.0. Некоторые предварительные сведения

Вычисление интегралов от периодических функций по периоду.

Интеграл вида

$$\int_0^{2\pi} F(e^{i\varphi}) d\varphi,$$

где  $F(z)$  — функция, **аналитическая** в круге  $|z| < 1$  (или  $|z| > 1$ ) за исключением конечного числа точек и **непрерывная** вплоть до границы  $|z| = 1$ .

Заменой  $z = e^{i\varphi}$ ,  $d\varphi = dz/(iz)$  этот интеграл сводится к контурному интегралу

$$\int_{|z|=1} \frac{F(z)}{iz} dz,$$

где контур интегрирования обходится против часовой стрелки, причем промежуток  $[0, 2\pi)$  переходит в окружность  $|z| = 1$ .

Если подынтегральная функция содержит тригонометрические функции  $\cos \varphi$  или  $\sin \varphi$ , то их необходимо преобразовать, используя **определение**,

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}.$$

Рассмотрим интегралы вида

$$\int_0^{2\pi} R(\cos x, \sin x) dx.$$

Заменой  $z = e^{ix}$ ,  $dz = i e^{ix} dx$ ,  $dx = -i dz/z$ , они сводятся к контурным по окружности  $|z| = 1$ . Так как

$$\cos x = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad \sin x = \frac{z - z^{-1}}{2i},$$



Меню

Часть II. Задачи

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

17.0. Некоторые предварительные сведения



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

то получим интегралы вида

$$\int_{|z|=1} R\left(\frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right) \frac{-i dz}{z},$$

которые вычисляются по **теореме Коши о вычетах**.





## 17.1. Задания для аудиторной работы

304. Вычислить интегралы:

$$1) \int_0^{2\pi} \cos(e^{i\varphi}) d\varphi;$$

[Решение] [Ответ]

$$2) \int_0^{\pi} \operatorname{tg}(\varphi + i) d\varphi;$$

[Решение] [Ответ]

$$3) \int_0^{2\pi} \cos^2(e^{-i\varphi}) d\varphi;$$

[Ответ]

$$4) \int_0^{\pi} \operatorname{ctg}(\varphi - i) d\varphi.$$

[Ответ]

305. Вычислить интегралы:

$$1) \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 x}{13 + 12 \cos x} dx;$$

[Решение] [Ответ]

$$2) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \frac{1}{3} \cos x};$$

[Ответ]

$$3) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{(5 + 3 \sin x)^2};$$

[Ответ]



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$4) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{(2 + \cos x)^2};$$

[Ответ]

$$5) \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dx}{(1 + \sin^2 x)^2};$$

[Решение] [Ответ]

$$6) \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{i + \sin \varphi};$$

[Ответ]

$$7) \int_0^{2\pi} \frac{\sin x \, dx}{3 + \sin x};$$

[Ответ]

$$8) \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dx}{(2 - \sin x)^2}.$$

[Ответ]



## 17.2. Базовые индивидуальные задания

306. Вычислить интегралы:

$$1) \int_0^{\pi} \operatorname{tg}(x + 7i) dx;$$

$$2) \int_0^{\pi} \operatorname{ctg}(x - 11i) dx;$$

$$3) \int_0^{\pi} \operatorname{tg}(x + 5i) dx;$$

$$4) \int_0^{\pi} \operatorname{ctg}(x - 2i) dx;$$

$$5) \int_0^{\pi} \operatorname{tg}(x + 3i) dx;$$

$$6) \int_0^{\pi} \operatorname{ctg}(x - 8i) dx;$$

$$7) \int_0^{\pi} \operatorname{tg}(x + 8i) dx;$$

[Указание]



$$8) \int_0^{\pi} \operatorname{ctg}(x - 3i) dx;$$

$$9) \int_0^{\pi} \operatorname{tg}(x + 2i) dx;$$

$$10) \int_0^{\pi} \operatorname{ctg}(x - 4i) dx;$$

$$11) \int_0^{\pi} \operatorname{tg}(x + 9i) dx;$$

$$12) \int_0^{\pi} \operatorname{ctg}(x - 6i) dx;$$

$$13) \int_0^{\pi} \operatorname{tg}(x + 6i) dx;$$

$$14) \int_0^{\pi} \operatorname{ctg}(x - 9i) dx;$$

$$15) \int_0^{\pi} \operatorname{tg}(x + 10i) dx;$$

$$16) \int_0^{\pi} \operatorname{ctg}(x - 7i) dx;$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$17) \int_0^{\pi} \operatorname{tg}(x + 4i) dx;$$

$$18) \int_0^{\pi} \operatorname{ctg}(x - 5i) dx;$$

$$19) \int_0^{\pi} \operatorname{tg}(x + 11i) dx;$$

$$20) \int_0^{\pi} \operatorname{ctg}(x - 10i) dx.$$

307. Вычислить интегралы:

$$1) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{11 + \cos x};$$

$$2) \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2x dx}{1 - 14 \cos x + 49};$$

$$3) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{2 + \cos x};$$

$$4) \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2x dx}{1 - 10 \cos x + 25};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$5) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{8 + \cos x};$$

$$6) \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2x dx}{1 - 6 \cos x + 9};$$

$$7) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{3 + \cos x};$$

$$8) \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2x dx}{1 - 16 \cos x + 64};$$

$$9) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{4 + \cos x};$$

$$10) \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2x dx}{1 - 4 \cos x + 4};$$

$$11) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{6 + \cos x};$$

$$12) \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2x dx}{1 - 18 \cos x + 81};$$

$$13) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{9 + \cos x};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$14) \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2x \, dx}{1 - 12 \cos x + 36};$$

$$15) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{7 + \cos x};$$

$$16) \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2x \, dx}{1 - 20 \cos x + 100};$$

$$17) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{5 + \cos x};$$

$$18) \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2x \, dx}{1 - 8 \cos x + 16};$$

$$19) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{10 + \cos x};$$

$$20) \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2x \, dx}{1 - 22 \cos x + 121}.$$

308. Вычислить интегралы:

$$1) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 - \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{16}};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$2) \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 3x \, dx}{1 - \cos 2x + \frac{1}{4}};$$

$$3) \int_0^{2\pi} \frac{\cos x \, dx}{1 - \frac{1}{3} \sin x + \frac{1}{36}};$$

$$4) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \frac{1}{4} \cos x};$$

$$5) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 - \cos x + \frac{1}{4}};$$

$$6) \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 3x \, dx}{1 - \frac{2}{3} \cos 2x + \frac{1}{9}};$$

$$7) \int_0^{2\pi} \frac{\cos x \, dx}{1 - \sin x + \frac{1}{4}};$$

$$8) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \frac{1}{6} \cos x};$$

$$9) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 - \frac{1}{3} \cos x + \frac{1}{36}};$$

$$10) \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 3x \, dx}{1 - \frac{1}{3} \cos 2x + \frac{1}{36}};$$





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$11) \int_0^{2\pi} \frac{\cos x \, dx}{1 - \frac{2}{3} \sin x + \frac{1}{9}};$$

$$12) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \frac{1}{5} \cos x};$$

$$13) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 - \frac{2}{5} \cos x + \frac{1}{25}};$$

$$14) \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 3x \, dx}{1 - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{16}};$$

$$15) \int_0^{2\pi} \frac{\cos x \, dx}{1 - \frac{2}{5} \sin x + \frac{1}{25}};$$

$$16) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \frac{1}{2} \cos x};$$

$$17) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 - \frac{2}{3} \cos x + \frac{1}{9}};$$

$$18) \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 3x \, dx}{1 - \frac{2}{5} \cos 2x + \frac{1}{25}};$$

$$19) \int_0^{2\pi} \frac{\cos x \, dx}{1 - \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{16}};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$20) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \frac{1}{3} \cos x}.$$

309. Вычислить интегралы:

$$1) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{41 + 40 \cos x};$$

$$2) \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x dx}{13 + 12 \cos x};$$

$$3) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{(25 + 24 \cos x)^2};$$

$$4) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{25 + 24 \cos x};$$

$$5) \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x dx}{61 + 60 \cos x};$$

$$6) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{(41 + 42 \cos x)^2};$$

$$7) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{61 + 60 \cos x};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$8) \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x \, dx}{113 + 112 \cos x};$$

$$9) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{(13 + 12 \cos x)^2};$$

$$10) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{113 + 112 \cos x};$$

$$11) \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x \, dx}{41 + 40 \cos x};$$

$$12) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{(5 + 4 \cos x)^2};$$

$$13) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{5 + 4 \cos x};$$

$$14) \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x \, dx}{85 + 84 \cos x};$$

$$15) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{(61 + 60 \cos x)^2};$$

$$16) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{85 + 84 \cos x};$$



Меню

Часть II. Задачи

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

17.2. Базовые индивидуальные задания



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$17) \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x \, dx}{25 + 24 \cos x};$$

$$18) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{(85 + 84 \cos x)^2};$$

$$19) \int_0^{2\pi} \frac{dx}{13 + 12 \cos x};$$

$$20) \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x \, dx}{5 + 4 \cos x}.$$



Меню

Часть II. Задачи

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

17.3. Задания для самостоятельной работы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 17.3. Задания для самостоятельной работы



Меню

Часть II. Задачи

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

17.4. Задания творческого характера



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 17.4. Задания творческого характера



Меню

Часть II. Задачи

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 18

# Вычисление несобственных интегралов

18.0. Некоторые предварительные сведения

18.1. Задания для аудиторной работы

18.2. Базовые индивидуальные задания

18.3. Задания для самостоятельной работы

18.4. Задания творческого характера



## 18.0. Некоторые предварительные сведения

Теорию вычетов можно использовать при вычислении несобственных интегралов по вещественной оси, если методы действительного анализа оказываются неэффективными.

I. *Интегралы от рациональных функций.* Рассмотрим рациональную функцию

$$f(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)},$$

где  $P_m(x)$  и  $Q_n(x)$  — многочлены степени  $m$  и  $n$  соответственно.

Если  $f(x)$  **непрерывна** на действительной оси ( $Q_n(x) \neq 0$ ) и  $n \geq m + 2$ , то

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res} f(z),$$

где  $z_k$  — **особые точки** подынтегральной функции, лежащие в верхней полуплоскости ( $\operatorname{Im} z_k > 0$ ).

Заметим, что, в последней формуле можно суммировать и по тем индексам  $k$ , для которых  $\operatorname{Im} z_k < 0$ .

В таком случае в правой части следует добавить знак « $-$ ».

II. *Интегралы по вещественной оси, содержащие тригонометрические функций.*

Для вычисления интегралов вида

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \cos \lambda x dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \sin \lambda x dx, \quad \lambda > 0,$$

где  $R(x)$  — правильная рациональная дробь, рассмотрим функцию

$$f(z) = R(z) e^{i\lambda z},$$

имеющую конечное число **изолированных особых точек** — **полюсов**, которыми являются нули знаменателя рациональной функции. Согласно **формуле Эйлера**

$$\operatorname{Re} f(z) = R(x) \cos \lambda x, \quad \operatorname{Im} f(z) = R(x) \sin \lambda x.$$





При вычислении рассматриваемых интегралов удобно пользоваться следующей леммой Жордана.

**Лемма 18.1 (Жордана).** Пусть  $f(z)$  — функция, *аналитическая* в верхней полуплоскости, за исключением конечного числа особых точек. Если при этом в этой полуплоскости  $f(z) \rightarrow 0$  при  $|z| \rightarrow +\infty$ , то при  $\lambda > 0$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) e^{i\lambda z} dz = 0,$$

где  $C_R = \{z : |z| = R, \operatorname{Im} z > 0\}$ .

Несложно показать, что из леммы Жордана непосредственно вытекают две важные формулы.

Пусть  $f(x)$  — четная функция. Тогда

$$\int_0^{+\infty} f(x) \cos \lambda x dx = \pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z_k} f(z) e^{i\lambda z}. \quad (18.1)$$

Если же  $f(x)$  — нечетная функция, то

$$\int_0^{+\infty} f(x) \sin \lambda x dx = \pi \sum_k \operatorname{Res}_{z_k} f(z) e^{i\lambda z}. \quad (18.2)$$

В последних двух формулах суммирование берется по всем особым точкам функции  $f(z)$ , расположенным в верхней полуплоскости.



## 18.1. Задания для аудиторной работы

310. Вычислить интегралы:

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx;$$

[Ответ]

$$2) \int_0^{+\infty} \frac{x^4 + 1}{x^6 + 1} dx;$$

[Ответ]

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^6 + 1};$$

[Ответ]

$$4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x + 2)^2};$$

[Ответ]

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^2};$$

[Решение] [Ответ]

$$6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x + 2i)^2(x - i)^5};$$

[Решение] [Ответ]

$$7) \int_0^{+\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1};$$

[Решение] [Ответ]



311. Вычислить интегралы:

$$1) \int_0^{+\infty} \frac{\cos 4x}{x^2 + 9} dx;$$

[Решение] [Ответ]

$$2) \int_0^{+\infty} \frac{x \sin 4x}{x^2 + 9} dx;$$

[Решение] [Ответ]

$$3) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx;$$

[Решение] [Ответ]

$$4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 4x + 20} dx;$$

[Решение] [Ответ]

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 \cos x}{(x^2 + 1)^2} dx;$$

[Ответ]

$$6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx;$$

[Ответ]

$$7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 2x + 5} dx;$$

[Ответ]

$$8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin 2x}{(x^2 + 6x + 10)^2} dx.$$

[Ответ]



## 18.2. Базовые индивидуальные задания

312. Вычислить интегралы:

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{16 + x^4};$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{225 + x^4};$$

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{81 + x^4};$$

$$4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{1 + x^4};$$

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{289 + x^4};$$

$$6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{121 + x^4};$$

$$7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{25 + x^4};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{324 + x^4};$$

$$9) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{49 + x^4};$$

$$10) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{144 + x^4};$$

$$11) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{4 + x^4};$$

$$12) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{169 + x^4};$$

$$13) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{9 + x^4};$$

$$14) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{361 + x^4};$$

$$15) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{36 + x^4};$$

$$16) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{400 + x^4};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$17) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{64 + x^4};$$

$$18) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{100 + x^4};$$

$$19) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{196 + x^4};$$

$$20) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{256 + x^4}.$$

313. Вычислить интегралы:

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 121)^3};$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 49)^3};$$

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 100)^3};$$

$$4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 36)^3};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 196)^3};$$

$$6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^3};$$

$$7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 361)^3};$$

$$8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 81)^3};$$

$$9) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 9)^3};$$

$$10) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 64)^3};$$

$$11) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 324)^3};$$

$$12) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 169)^3};$$

$$13) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 256)^3};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$14) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 4)^3};$$

$$15) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 25)^3};$$

$$16) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 225)^3};$$

$$17) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 144)^3};$$

$$18) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 16)^3};$$

$$19) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 289)^3};$$

$$20) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 400)^3}.$$

314. Вычислить интегралы:

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 100)^3};$$





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 225)^3};$$

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 144)^3};$$

$$4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 81)^3};$$

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 16)^3};$$

$$6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 64)^3};$$

$$7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 256)^3};$$

$$8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 289)^3};$$

$$9) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 36)^3};$$

$$10) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 49)^3};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$11) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 25)^3};$$

$$12) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 400)^3};$$

$$13) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 361)^3};$$

$$14) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 1)^3};$$

$$15) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 169)^3};$$

$$16) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 4)^3};$$

$$17) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 324)^3};$$

$$18) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 121)^3};$$

$$19) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 196)^3};$$



$$20) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 9)^3}.$$

315. Вычислить интегралы:

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 + 4x + 20)^2};$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 - 6x + 10)^2};$$

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 - 8x + 20)^2};$$

$$4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 + 6x + 13)^2};$$

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 + 8x + 17)^2};$$

$$6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 - 2x + 26)^2};$$

$$7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 - 4x + 20)^2};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 + 6x + 10)^2};$$

$$9) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 - 6x + 25)^2};$$

$$10) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 + 4x + 5)^2};$$

$$11) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 - 6x + 13)^2};$$

$$12) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 - 8x + 17)^2};$$

$$13) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 + 6x + 18)^2};$$

$$14) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 + 8x + 20)^2};$$

$$15) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 - 2x + 5)^2};$$

$$16) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 - 4x + 13)^2};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$17) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 + 6x + 25)^2};$$

$$18) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 - 6x + 34)^2};$$

$$19) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 + 4x + 13)^2};$$

$$20) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2 - 8x + 25)^2}.$$

316. Вычислить интегралы:

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(289 + x^2)^4};$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(64 + x^2)^4};$$

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(225 + x^2)^4};$$

$$4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1 + x^2)^4};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(196 + x^2)^4};$$

$$6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(256 + x^2)^4};$$

$$7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(100 + x^2)^4};$$

$$8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(361 + x^2)^4};$$

$$9) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(4 + x^2)^4};$$

$$10) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(400 + x^2)^4};$$

$$11) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(121 + x^2)^4};$$

$$12) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(9 + x^2)^4};$$

$$13) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(16 + x^2)^4};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$14) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(144 + x^2)^4};$$

$$15) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(324 + x^2)^4};$$

$$16) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(49 + x^2)^4};$$

$$17) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(169 + x^2)^4};$$

$$18) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(81 + x^2)^4};$$

$$19) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(25 + x^2)^4};$$

$$20) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(36 + x^2)^4}.$$

317. Вычислить интегралы:

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 81)^2};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 121)^2};$$

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 289)^2};$$

$$4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 9)^2};$$

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 64)^2};$$

$$6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 49)^2};$$

$$7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 361)^2};$$

$$8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^2};$$

$$9) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 169)^2};$$

$$10) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 100)^2};$$





Меню

Часть II. Задачи

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

18.2. Базовые индивидуальные задания



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$11) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 256)^2};$$

$$12) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 225)^2};$$

$$13) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 196)^2};$$

$$14) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 324)^2};$$

$$15) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 25)^2};$$

$$16) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 4)^2};$$

$$17) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 36)^2};$$

$$18) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 16)^2};$$

$$19) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 400)^2};$$



$$20) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 144)^2}.$$

318. Вычислить интегралы:

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 225)^2};$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 121)^2};$$

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 36)^2};$$

$$4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 144)^2};$$

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 4)^2};$$

$$6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 196)^2};$$

$$7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 361)^2};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 1)^2};$$

$$9) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 400)^2};$$

$$10) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 64)^2};$$

$$11) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 324)^2};$$

$$12) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 256)^2};$$

$$13) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 100)^2};$$

$$14) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 4)^2};$$

$$15) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 81)^2};$$

$$16) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 9)^2};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$17) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 289)^2};$$

$$18) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 25)^2};$$

$$19) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 49)^2};$$

$$20) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 169)^2}.$$

319. Вычислить интегралы:

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 16)(x^2 + 1)};$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 4)(x^2 + 25)};$$

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 9)(x^2 + 36)};$$

$$4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 16)};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 36)(x^2 + 25)};$$

$$6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 25)(x^2 + 1)};$$

$$7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)};$$

$$8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 16)(x^2 + 9)};$$

$$9) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 4)(x^2 + 16)};$$

$$10) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 25)};$$

$$11) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 36)(x^2 + 1)};$$

$$12) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 9)(x^2 + 4)};$$

$$13) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 16)(x^2 + 9)};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$14) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 16)};$$

$$15) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 16)(x^2 + 25)};$$

$$16) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 25)(x^2 + 1)};$$

$$17) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 4)(x^2 + 25)};$$

$$18) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 36)(x^2 + 9)};$$

$$19) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 9)(x^2 + 16)};$$

$$20) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 36)(x^2 + 25)}.$$

320. Вычислить интегралы:

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(9 + \frac{x^2}{36}\right)^2};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(9 + \frac{x^2}{16}\right)^2};$$

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(9 + \frac{x^2}{25}\right)^2};$$

$$4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(9 + \frac{x^2}{9}\right)^2};$$

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(1 + \frac{x^2}{4}\right)^2};$$

$$6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(1 + \frac{x^2}{4}\right)^2};$$

$$7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(1 + \frac{x^2}{9}\right)^2};$$

$$8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(1 + \frac{x^2}{36}\right)^2};$$

$$9) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(25 + \frac{x^2}{16}\right)^2};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$10) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(25 + \frac{x^2}{25}\right)^2};$$

$$11) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(25 + \frac{x^2}{25}\right)^2};$$

$$12) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(25 + \frac{x^2}{36}\right)^2};$$

$$13) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(4 + \frac{x^2}{16}\right)^2};$$

$$14) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(4 + \frac{x^2}{9}\right)^2};$$

$$15) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(4 + \frac{x^2}{4}\right)^2};$$

$$16) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(4 + \frac{x^2}{16}\right)^2};$$

$$17) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(16 + \frac{x^2}{25}\right)^2};$$





$$18) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(16 + \frac{x^2}{4}\right)^2};$$

$$19) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(16 + \frac{x^2}{9}\right)^2};$$

$$20) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{\left(16 + \frac{x^2}{36}\right)^2}.$$

321. Вычислить интегралы:

$$1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x dx}{(x^2 - 6x + 13)^2};$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x dx}{(x^2 + 4x + 40)^2};$$

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x dx}{(x^2 + 6x + 34)^2};$$

$$4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x dx}{(x^2 - 4x + 5)^2};$$

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x dx}{(x^2 + 2x + 17)^2};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x \, dx}{(x^2 - 8x + 25)^2};$$

$$7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x \, dx}{(x^2 - 2x + 26)^2};$$

$$8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x \, dx}{(x^2 + 2x + 10)^2};$$

$$9) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x \, dx}{(x^2 - 4x + 29)^2};$$

$$10) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x \, dx}{(x^2 - 2x + 17)^2};$$

$$11) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x \, dx}{(x^2 - 8x + 20)^2};$$

$$12) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x \, dx}{(x^2 + 4x + 5)^2};$$

$$13) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x \, dx}{(x^2 - 6x + 25)^2};$$

$$14) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x \, dx}{(x^2 + 6x + 13)^2};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$15) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x \, dx}{(x^2 + 6x + 25)^2};$$

$$16) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x \, dx}{(x^2 - 2x + 5)^2};$$

$$17) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x \, dx}{(x^2 - 6x + 34)^2};$$

$$18) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x \, dx}{(x^2 - 8x + 17)^2};$$

$$19) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x \, dx}{(x^2 + 2x + 37)^2};$$

$$20) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x \, dx}{(x^2 - 4x + 20)^2}.$$

322. Вычислить интегралы:

$$1) \int_0^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{x^2 + 36};$$

$$2) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x \, dx}{x^2 + 81};$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x \, dx}{x^2 + 1};$$

$$4) \int_0^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{x^2 + 64};$$

$$5) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x \, dx}{x^2 + 9};$$

$$6) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x \, dx}{x^2 + 25};$$

$$7) \int_0^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{x^2 + 49};$$

$$8) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x \, dx}{x^2 + 4};$$

$$9) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x \, dx}{x^2 + 16};$$

$$10) \int_0^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{x^2 + 100};$$

$$11) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x \, dx}{x^2 + 25};$$



$$12) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x \, dx}{x^2 + 9};$$

$$13) \int_0^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{x^2 + 36};$$

$$14) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x \, dx}{x^2 + 64};$$

$$15) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x \, dx}{x^2 + 100};$$

$$16) \int_0^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{x^2 + 49};$$

$$17) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x \, dx}{x^2 + 4};$$

$$18) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x \, dx}{x^2 + 16};$$

$$19) \int_0^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{x^2 + 1};$$

$$20) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x \, dx}{x^2 + 81}.$$



Меню

Часть II. Задачи

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

18.3. Задания для самостоятельной работы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 18.3. Задания для самостоятельной работы



Меню

Часть II. Задачи

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

18.4. Задания творческого характера



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 18.4. Задания творческого характера



Меню

Часть II. Задачи

Глава 19. Вычисление интегралов от многозначных функций



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 19

# Вычисление интегралов от многозначных функций

19.1. Задания для аудиторной работы

19.2. Базовые индивидуальные задания

19.3. Задания для самостоятельной работы

19.4. Задания творческого характера





Меню

Часть II. Задачи

Глава 19. Вычисление интегралов от многозначных функций

19.1. Задания для аудиторной работы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 19.1. Задания для аудиторной работы



Меню

Часть II. Задачи

Глава 19. Вычисление интегралов от многозначных функций

19.2. Базовые индивидуальные задания



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 19.2. Базовые индивидуальные задания



Меню

Часть II. Задачи

Глава 19. Вычисление интегралов от многозначных функций

19.3. Задания для самостоятельной работы



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 19.3. Задания для самостоятельной работы



Меню

Часть II. Задачи

Глава 19. Вычисление интегралов от многозначных функций

19.4. Задания творческого характера



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## 19.4. Задания творческого характера



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

# Решения и указания



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 1. Комплексные числа и действия над ними



## Решение задачи 1.1

Арифметические действия над комплексными числами осуществляются по обычным правилам с учетом того, что  $i^2 = -1$ . Поэтому,

$$z_1 + z_2 = 1 - i + 1 + i = 2,$$

$$z_1 \cdot z_2 = (1 - i)(1 + i) = 1^2 - i^2 = 1 + 1 = 2.$$

При делении комплексных чисел числитель и знаменатель дроби следует умножить на число, сопряженное знаменателю, т.е.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1 - i}{1 + i} = \frac{(1 - i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{1 - 2i - 1}{2} = -i.$$

Осталось выполнить последнее действие:

$$z_1^2 + z_2^2 = (1 - i)^2 + (1 + i)^2 = 1 - 2i - 1 + 1 + 2i - 1 = 0.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 2.1

Изобразим число  $z = 1 + i$  на комплексной плоскости. Найдём модуль




Рис. P.1

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Ясно, что  $\arg z = \varphi = \angle AOB$ . Поэтому

$$\operatorname{tg} \angle AOB = \frac{1}{1} = 1,$$

и

$$\arg z = \frac{\pi}{4}.$$

Модули и аргументы комплексных чисел  $\bar{z} = 1 - i$ ,  $-\bar{z} = -1 + i$  и  $-z = -1 - i$  находятся аналогично. Здесь [\[Вернуться к условию\]](#)





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран




Рис. P.2



## Решение задачи 3.1

Сначала найдем модуль и аргумент данного комплексного числа. Изобразим его на комплексной плоскости.




Рис. P.3

В этом случае

$$|z| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (-\sqrt{2})^2} = 2.$$

$$\arg z = \varphi = -\angle AOB = -\frac{\pi}{4}.$$

Поэтому в тригонометрической форме

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

данное число запишется следующим образом

$$z = 2 \left( \cos \left( -\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{4} \right) \right),$$

а в показательной форме

$$z = |z|e^{i\varphi}$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

так

$$z = 2 e^{-i\frac{\pi}{4}}.$$

Для возведения числа в требуемую степень воспользуемся формулой Муавра

$$\begin{aligned} z^6 &= |z|^6 (\cos 6\varphi + i \sin 6\varphi) = 2^6 \left( \cos \left( -6 \cdot \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left( -6 \cdot \frac{\pi}{4} \right) \right) = \\ &= 64 \left( \cos \left( -\frac{3\pi}{2} \right) + i \sin \left( -\frac{3\pi}{2} \right) \right) = 64(0 + i) = 64i. \end{aligned}$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 4.1

Сначала найдем модуль и аргумент комплексного числа  $z = 1$ . Очевидно,

$$|z| = 1, \quad \arg z = 0.$$

Все значения корня находим по формуле

$$w_k = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\arg z + 2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

В данном случае

$$w_k = \sqrt[4]{1} = \sqrt[4]{1} e^{i \frac{2k\pi}{4}}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Подставляя все требуемые значения  $k$ , получаем

$$w_0 = e^0 = 1;$$

$$w_1 = e^{i \frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i;$$

$$w_2 = e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1;$$

$$w_3 = e^{i \frac{3\pi}{2}} = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} = -i.$$

Все значения  $\sqrt[4]{1}$  лежат в вершинах квадрата, вписанного в окружность радиуса 1 с центром в начале координат (рисунок Р.4). [\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран




Рис. P.4



## Решение задачи 5.1

Пусть  $z = x + iy$ . Тогда уравнение можно переписать в виде

$$(x + iy)^2 + \sqrt{x^2 + y^2} = 0.$$

Выполним несложные преобразования,

$$x^2 - y^2 + \sqrt{x^2 + y^2} + 2ixy = 0.$$

Комплексные числа равны тогда и только тогда, когда равны их действительные и мнимые части. Поэтому, последнее уравнение эквивалентно системе

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + \sqrt{x^2 + y^2} = 0, \\ 2xy = 0. \end{cases}$$

Принимая во внимание второе уравнение, возможны две ситуации. Если  $x = 0$ , то

$$-y^2 + \sqrt{y^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y^2 = |y|,$$

т.е.  $y_1 = 0$ ,  $y_2 = 1$ ,  $y_3 = -1$ . Так как  $z = x + iy$ , то в этом случае решениями исходного уравнения будут числа  $z_1 = 0$ ,  $z_2 = i$ ,  $z_3 = -i$ .

Если же  $y = 0$ , то

$$x^2 + \sqrt{x^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = -|x|,$$

т.е.  $x = 0$ . В этом случае получим, что решением уравнения будет  $z_1 = 0$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 6.1

Пусть  $z = x + iy$ . Тогда

$$\operatorname{Re}(iz) = \operatorname{Re}(i(x + iy)) = \operatorname{Re}(ix - y) = -y$$

и поэтому

$$\begin{aligned} \{z : 0 < \operatorname{Re}(iz) < 1\} &= \{z = x + iy : 0 < -y < 1\} = \\ &= \{z = x + iy : -1 < y < 0\}. \end{aligned}$$

Полученная область изображена на [рисунке P.5](#).

[\[Вернуться к условию\]](#)




Рис. P.5



## Решение задачи 7.1

Пусть  $z = x + iy$ . Выделив действительную и мнимую часть в правой части исходного уравнения, получим

$$x + iy = i + \cos t + i \sin t = \cos t + i(1 + \sin t).$$

Комплексные числа равны тогда и только тогда, когда равны их действительные и мнимые части. Поэтому, последнее уравнение эквивалентно системе

$$\begin{cases} x = \cos t, \\ y = 1 + \sin t \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} x = \cos t, \\ y - 1 = \sin t. \end{cases}$$

Возведем в квадрат оба уравнения и сложим. Получим

$$x^2 + (y - 1)^2 = \cos^2 t + \sin^2 t,$$

т.е.

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1? \quad t \in [0, 2\pi].$$

Значит, исходное уравнение задает на плоскости окружность с центром в точке  $(0, 1)$  и радиусом 1 ([рисунок Р.6](#)). [\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Решение задачи 7.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран




Рис. Р.6



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 2. Элементарные трансцендентные функции



## Решение задачи 29.1

По определению

$$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i \arg z + i2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

где главное значение аргумента  $\arg z \in (-\pi, \pi]$ . Так как  $|-1| = 1$ , а  $\arg(-1) = \pi$ , то

$$\operatorname{Ln}(-1) = \ln 1 + i\pi + i2k\pi = i(\pi + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

При возведении в степень поступим следующим образом. Так как

$$z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z},$$

то

$$j^i = e^{i \operatorname{Ln} j}.$$

Из определения логарифма следует, что

$$\operatorname{Ln} j = \ln |j| + i \arg j + i2k\pi = \ln 1 + i\frac{\pi}{2} + i2k\pi = i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Поэтому,

$$j^i = e^{i \cdot i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)} = e^{-\frac{\pi}{2} + 2m\pi},$$

где  $m = -k \in \mathbb{Z}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Решение задачи 30.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 30.1

а) Положим  $z = x + iy$ . Тогда

$$w = iz^2 = i(x + iy)^2 = i(x^2 + i2xy - y^2) = -2xy + i(x^2 - y^2).$$

Отсюда

$$\operatorname{Re} w = -2xy, \quad \operatorname{Im} w = x^2 - y^2.$$

б) Положим  $z = x + iy$ . Учитывая формулы для гиперболических функций, получаем

$$w = \operatorname{ch} iz = \operatorname{ch} i(x + iy) = \operatorname{ch}(ix - y) = \operatorname{ch} ix \operatorname{ch} y - \operatorname{sh} ix \operatorname{sh} y.$$

Осталось применить формулы связи гиперболических и тригонометрических функций

$$\operatorname{ch} ix = \cos x, \quad \operatorname{sh} ix = i \sin x.$$

Окончательно,

$$w = \cos x \operatorname{ch} y - i \sin x \operatorname{sh} y,$$

т.е.

$$\operatorname{Re} w = \cos x \operatorname{ch} y, \quad \operatorname{Im} w = -\sin x \operatorname{sh} y.$$

в) Пусть  $z = |z|e^{i \arg z}$ ,  $\arg z \in (-\pi, \pi]$ . По определению показательной функции

$$\begin{aligned} w = z^i &= e^{i \operatorname{Ln} z} = e^{i(\ln |z| + i \arg z)} = e^{-\arg z + i \ln |z|} = \\ &= e^{-\arg z} e^{i \ln |z|} = e^{-\arg z} (\cos(\ln |z|) + i \sin(\ln |z|)). \end{aligned}$$

Тогда

$$\operatorname{Re} w = e^{-\arg z} \cos(\ln |z|), \quad \operatorname{Im} w = e^{-\arg z} \sin(\ln |z|).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 31.1

Воспользуемся определением.  $\operatorname{Arccos} z$  — это такое число  $w$ , что

$$\cos w = z.$$

Учитывая определение  $\cos w$  последнее равенство перепишем в виде

$$\frac{e^{iw} + e^{-iw}}{2} = z.$$

Выразим  $w$  из этого уравнения. Сделаем замену

$$e^{iw} = t.$$

Получим и решим уравнение относительно  $t$ :

$$t + \frac{1}{t} = 2z, \quad t^2 - 2zt + 1 = 0.$$

Поскольку дискриминант этого уравнения  $D = 4z^2 - 4$ , то его решениями будут

$$t = z + \sqrt{z^2 - 1}.$$

Здесь корень принимает два значения и правая часть может быть переписана в виде

$$t = z \pm \sqrt{z^2 - 1}.$$

Но обычно это не делают. Далее, учитывая замену, получаем

$$e^{iw} = z + \sqrt{z^2 - 1}.$$

Откуда следует, что

$$iw = \operatorname{Ln} \left( z + \sqrt{z^2 - 1} \right), \quad w = -i \operatorname{Ln} \left( z + \sqrt{z^2 - 1} \right),$$

т.е.

$$\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln} \left( z + \sqrt{z^2 - 1} \right),$$

что и требовалось доказать.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Решение задачи 31.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 31.2

По определению

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$$

Возведем оба равенства квадрат,

$$\sin^2 z = \frac{e^{2iz} - 2 + e^{-2iz}}{-4}, \quad \cos^2 z = \frac{e^{2iz} + 2 + e^{-2iz}}{4},$$

и сложим

$$\sin^2 z + \cos^2 z = \frac{1}{4} (-e^{2iz} + 2 - e^{-2iz} + e^{2iz} + 2 + e^{-2iz}) = \frac{1}{4} \cdot 4 = 1.$$

Что и требовалось доказать.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Решение задачи 31.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 31.3

Воспользуемся определением тригонометрических функций

$$\operatorname{tg} iz = \frac{\sin iz}{\cos iz} = \frac{e^{i \cdot iz} - e^{i \cdot (-iz)}}{2i} : \frac{e^{i \cdot iz} + e^{i \cdot (-iz)}}{2} = \frac{e^{-z} - e^z}{2i} : \frac{e^{-z} + e^z}{2}.$$

Осталось вспомнить, что

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}.$$

Тогда

$$\operatorname{tg} iz = -\frac{1}{i} \frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z} = i \operatorname{th} z,$$

что и требовалось доказать.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Решение задачи 32.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 32.1

Воспользуемся формулой

$$\operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln} i \left( z + \sqrt{z^2 - 1} \right).$$

Получим,

$$\operatorname{Arcsin} i = -i \operatorname{Ln} i (i + \sqrt{-2}) = -i \operatorname{Ln} i (i \pm i\sqrt{2}) = -i \operatorname{Ln}(-1 \pm \sqrt{2}).$$

Заметим, что

$$\begin{aligned} \operatorname{Ln}(\sqrt{2} - 1) &= \ln(\sqrt{2} - 1) + i2k\pi, \\ \operatorname{Ln}(-\sqrt{2} - 1) &= \ln(\sqrt{2} + 1) + i\pi + i2k\pi. \end{aligned}$$

Поэтому,

$$\operatorname{Arcsin} i = -i(\ln(\sqrt{2} - 1) + i2k\pi) = 2k\pi - i \ln(\sqrt{2} - 1)$$

или

$$\operatorname{Arcsin} i = -i(\ln(\sqrt{2} + 1) + i\pi + i2k\pi) = \pi + 2k\pi - i \ln(\sqrt{2} + 1), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





## Решение задачи 33.1

Очевидно,

$$z = \operatorname{Arccos} 2.$$

Для нахождения этих значений воспользуемся формулой

$$\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln} \left( z + \sqrt{z^2 - 1} \right).$$

Получим,

$$\begin{aligned} \operatorname{Arccos} 2 &= -i \operatorname{Ln} \left( 2 + \sqrt{3} \right) = \\ &= -i \left( \ln(2 + \sqrt{3}) + i2k\pi \right) = 2k\pi - i \ln(2 + \sqrt{3}), \quad k \in \mathbb{Z}, \end{aligned}$$

т.е.

$$z = 2k\pi - i \ln(2 + \sqrt{3}), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 3. Функции комплексного переменного



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 3. Функции комплексного переменного



## Решение задачи 51.1

Покажем, что предел

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re} z}{z}$$

не существует. Для этого воспользуемся определением предела на языке последовательностей. Пусть

$$z_n = \frac{1}{n}, \quad \text{а} \quad \tilde{z}_n = \frac{i}{n}.$$

Обе эти последовательности сходятся к нулю, т.е.

$$z_n \rightarrow 0 \quad \text{и} \quad \tilde{z}_n \rightarrow 0.$$

При этом

$$f(z_n) = 1, \quad \text{а} \quad f(\tilde{z}_n) = 0 \quad \text{при любых } n \in \mathbb{N}$$

Это означает, что

$$f(z_n) \rightarrow 1, \quad \text{а} \quad f(\tilde{z}_n) \rightarrow 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Отсюда следует, что

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re} z}{z}$$

не существует.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 3. Функции комплексного переменного

Решение задачи 51.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 51.6

Покажем, что предел

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z \operatorname{Im} z}{|z|} = 0.$$

Действительно,

$$0 \leq |f(z)| = \left| \frac{z \operatorname{Im} z}{z} \right| = |\operatorname{Im} z| \leq |z|.$$

Но

$$\lim_{z \rightarrow 0} |z| = 0.$$

Тогда и

$$\lim_{z \rightarrow 0} |f(z)| = 0.$$

Отсюда следует, что

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 0.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 3. Функции комплексного переменного

Решение задачи 52.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 52.1

Так как

$$w = \bar{z}^2 \cdot z = (x - iy)^2(x + iy) = (x^2 - y^2)x + 2xy^2 + i((x^2 - y^2)y - 2x^2y),$$

то

$$u(x, y) = \operatorname{Re} f(z) = (x^2 - y^2)x + 2xy^2,$$

$$v(x, y) = \operatorname{Im} f(z) = (x^2 - y^2)y - 2x^2y.$$

Функции  $u(x, y)$  и  $v(x, y)$  непрерывны в каждой точке  $(x, y)$ , поэтому функция  $w = \bar{z}^2 \cdot z$  непрерывна в каждой точке  $z = x + iy$  комплексной плоскости.

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 52.2

По определению

$$w = \sin z = \sin(x + iy) = \frac{e^{x+iy} - e^{-i(x+iy)}}{2i} = \sin x \operatorname{ch} y + i \cos x \operatorname{sh} y.$$

Следовательно,

$$u(x, y) = \operatorname{Re}(\sin z) = \sin x \operatorname{ch} y,$$

$$v(x, y) = \operatorname{Im}(\sin z) = \cos x \operatorname{sh} y.$$

Так как функции  $u(x, y)$  и  $v(x, y)$  непрерывны в каждой точке  $(x, y)$ , то функция  $w = \sin z$  непрерывна в каждой точке  $z = x + iy$  комплексной плоскости.

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 53.1

По критерию дифференцируемости функция  $w = f(z)$  дифференцируема в точке  $z = x + iy$  тогда и только тогда, когда  $u(x, y)$  и  $v(x, y)$  дифференцируемы в точке  $(x, y)$  как функции двух действительных переменных и выполняются условия Коши – Римана

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

В нашем случае  $u(x, y) = xy$ ,  $v(x, y) = x^2 - y^2$ . Так как частные производные

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -2y$$

непрерывны для любых  $(x, y)$ , то  $u$  и  $v$  дифференцируемы в  $\mathbb{R}^2$ . Условия Коши – Римана имеют вид:

$$\begin{cases} y = -2y, \\ x = -2x. \end{cases}$$

Они выполняются только в точке  $(0, 0)$ . Поэтому данная функция  $w = f(z)$  дифференцируема только в точке  $z = 0$ .

Для аналитичности в точке  $z_0$  требуется дифференцируемость  $f(z)$  в некоторой ее окрестности. Следовательно, точек аналитичности  $f(z)$  не имеет.

Производную функции  $w = f(z)$  в точке дифференцируемости  $z_0 = x_0 + iy_0$  будем находить по формуле

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

В нашем случае  $z_0 = 0 = 0 + i0$ ,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2x$$

и, следовательно,

$$f'(0) = 0.$$



## Решение задачи 54.1

Проведем те же рассуждения, что и при решении задачи 3.1. Имеем

$$w = x + ay + i(bx + cy),$$

$$u(x, y) = x + ay, \quad v(x, y) = bx + cy.$$

Частные производные

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = a, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = b, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = c$$

непрерывны для любых  $(x, y)$ , то  $u(x, y)$  и  $v(x, y)$  дифференцируемы в  $\mathbb{R}^2$ . Условия Коши – Римана имеют вид:

$$\begin{cases} 1 = c, \\ a = -b. \end{cases}$$

Поэтому функция  $w = f(z)$  будет дифференцируемой, а, значит, и аналитической в  $\mathbb{C}$  при условиях  $a = -b$  и  $c = 1$ . [\[Вернуться к условию\]](#)





## Решение задачи 55.1

Проведем те же рассуждения, что и при решении задач 3.1, 4.1. Имеем

$$w = e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y),$$

$$u(x, y) = e^x \cos y, \quad v(x, y) = e^x \sin y.$$

Частные производные

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y$$

непрерывны для любых  $(x, y)$ , то  $u(x, y)$  и  $v(x, y)$  дифференцируемы в  $\mathbb{R}^2$ . Условия Коши – Римана выполняются при любых  $(x, y)$ . Значит функция  $w = e^z$  дифференцируема в  $\mathbb{C}$ . Теперь найдем производную

$$(e^z)' = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + i e^x \sin y = e^x(\cos y + i \sin y) = e^{x+iy} = e^z.$$

Итак,

$$(e^z)' = e^z.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 56.1

Функция  $u(x, y)$ , имеющая в области  $G$  непрерывные частные производные второго порядка и удовлетворяющая в этой области уравнению Лапласа

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

называется гармонической. В данном случае  $u(x, y) = x^2 + y^2 + xy$  и

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 1, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = 1,$$

т.е. все частные производные второго порядка непрерывны. Однако, функция  $u(x, y)$  не удовлетворяет уравнению Лапласа. Поэтому  $u(x, y)$  не является гармонической в области определения.

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 57.1

Первый способ. Находим функцию  $v(x, y)$  по формуле

$$v(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy + a, \quad a \in \mathbb{R},$$

где криволинейный интеграл берется по любой кривой, лежащей в  $\mathbb{C}$  и соединяющей точку  $(x_0, y_0)$  с  $(x, y)$ . Положим  $(x_0, y_0) = (0, 0)$ , а в качестве кривой интегрирования  $L$  возьмем ломаную  $L = L_1 \cup L_2$  (см. рис. P.7),

$$L_1 = \{z \in \mathbb{C} : z(t) = t, t \in [0, x]\}, \quad L_2 = \{z \in \mathbb{C} : z(t) = x + it, t \in [0, y]\}.$$

В данном случае




Рис. P.7

$$u(x, y) = e^{-y} \cos x,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -e^{-y} \cos x, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = -e^{-y} \sin x.$$



Поэтому,

$$\begin{aligned} v(x, y) &= \int_0^x (-\cos t) dt + \int_0^y (-e^{-t} \sin x) dt + a = \sin x + \sin x \cdot e^{-t} \Big|_0^y + a = \\ &= \sin x + e^{-y} \sin x - \sin x + a = e^{-y} \sin x + a. \end{aligned}$$

Тогда искомая функция примет вид

$$f(z) = e^{-y} \cos x + ie^{-y} \sin x + a = e^{i(x+iy)} + a = e^{iz+a}.$$

Так как  $f(-i) = e$ , то  $a = 0$ . Следовательно,  $f(z) = e^{iz}$ .

Второй способ. Так как функции  $u(x, y)$  и  $v(x, y)$  связаны условиями Коши – Римана, то  $v(x, y)$  найдем из системы дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial x} = e^{-y} \cos x, \\ \frac{\partial v}{\partial y} = -e^{-y} \sin x. \end{cases}$$

Интегрируя первое уравнение по переменной  $x$ , получаем

$$v(x, y) = e^{-y} \sin x + \varphi(y),$$

где  $\varphi(y)$  — некоторая функция одной действительной переменной. Функция  $v(x, y)$  удовлетворяет второму уравнению системы. Поэтому справедливо равенство

$$-e^{-y} \sin x + \varphi'(y) = -e^{-y} \sin x,$$

т.е.  $\varphi'(y) = 0$ . Отсюда следует, что

$$\varphi(y) \equiv \text{const} = a \in \mathbb{R}.$$

Итак,

$$f(z) = e^{-y} \cos x + ie^{-y} \sin x + a.$$



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 3. Функции комплексного переменного

Решение задачи 57.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Далее, поступая также как и в первом способе решения, окончательно получаем

$$f(z) = e^{iz}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 66.1

Найдем частные производные функции  $u(x, y) = \varphi(xy)$ :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(xy) \cdot (xy)'_x = \varphi'(xy) \cdot y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(xy) \cdot x,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varphi'(xy) \cdot y^2, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \varphi'(xy) \cdot x^2,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \varphi'(xy) + \varphi''(xy)xy, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \varphi'(xy) + \varphi''(xy)xy.$$

Все частные второго порядка функции  $u(x, y)$  непрерывны. Уравнение Лапласа имеет вид:

$$\varphi''(xy)(x^2 + y^2) = 0.$$

Отсюда следует, что  $u(x, y)$  является гармонической в  $\mathbb{R}^2$  тогда и только тогда, когда

$$\varphi''(t) = 0,$$

т.е. в случае, когда  $\varphi(t)$  представляет собой линейную функцию:

$$\varphi(t) = at + b, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Таким образом, гармонические функции такого вида заданы равенством

$$u(x, y) = axy + b, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной



## Решение задачи 76.1

Найдем производную данной функции

$$w' = 3z^2.$$

Коэффициент растяжения в точке равен модулю значения производной в этой точке, т.е.

$$k = |f'(z_0)| = |3 \cdot 1^2| = 3.$$

В свою очередь, угол поворота равен аргументу производной, т.е.

$$\theta = \arg f'(z_0) = \arg 3 = 0.$$

Таким образом, все кривые, проходящие через точку  $z_0 = 1$  при отображении  $w = z^3$  будут растягиваться с коэффициентом  $k = 3$  и не будут поворачиваться. [\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Решение задачи 76.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 76.3

Найдем значение производной функции в данной точке

$$f'(z_0) = 3(1 + i)^2 = 3(1 + 2i - 1) = 6i.$$

Поэтому,

$$k = |f'(z_0)| = 6, \quad \theta = \arg f'(z_0) = \frac{\pi}{2}.$$

Следовательно, все кривые, проходящие через точку  $z_0 = 1 + i$  при отображении  $w = z^3$  будут растягиваться с коэффициентом  $k = 6$  и будут поворачиваться на один и тот же угол  $\theta = \pi/2$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 78.1

Найдем производную данной функции

$$w' = 4z^3.$$

Линейное растяжение характеризуется величиной  $k = |f'(z)|$ . При этом, если  $k > 1$ , то происходит растяжение, если же  $k < 1$  — сжатие. Следовательно, в данном случае сжатие происходит при выполнении условия

$$|4z^3| < 1,$$

т.е. в круге

$$|z| < \frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$$

Растяжение происходит при выполнении условия

$$|4z^3| > 1,$$

т.е. вне круга

$$|z| > \frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Решение задачи 78.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 78.2

Найдем производную данной функции  $w' = 2z - 1$ . В данном случае сжатие происходит при выполнении условия

$$|2z - 1| < 1,$$

а растяжение —

$$|2z - 1| > 1.$$

Выясним, что представляют собой эти области. Пусть  $z = x + iy$ , тогда

$$|2(x + iy) - 1| < 1,$$

$$|2x - 1 + 2iy| < 1,$$

$$\sqrt{(2x - 1)^2 + 4y^2} < 1,$$

$$(2x - 1)^2 + 4y^2 < 1,$$

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 < \frac{1}{4}.$$

Таким образом, сжатие происходит в круге с центром в точке  $(1/2, 0)$  радиуса  $1/2$ , а растяжение — вне его. [\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Решение задачи 81.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 81.1

Если кривая  $\gamma$  задается параметрическим уравнением

$$z(t) = x(t) + iy(t), \quad t \in [\alpha, \beta],$$

т.е.

$$\gamma : z(t) = x(t) + iy(t), \quad t \in [\alpha, \beta],$$

то угол  $\varphi$  между касательной к кривой  $\gamma$  в точке  $z = z(t_0)$  и положительным направлением оси  $Ox$  равен  $\arg z'(t_0)$ . отображение  $w = z^2$  конформно в точке  $z_0 = 0$ , поэтому оно сохраняет углы между кривыми.

В данном примере касательная к кривой  $\gamma_1$  в точке  $z_0 = 0$  наклонена к оси  $Ox$  под углом  $\varphi_1 = \arg(1+i) = \frac{\pi}{4}$  (т.к.  $z'(0) = 1+i$ ). Аналогично, для кривой  $\gamma_2$  соответствующий угол равен  $\varphi_2 = \arg 1 = 0$ . Поэтому угол между кривыми  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  в точке  $z_0 = 0$  равен  $\frac{\pi}{4}$ . В силу конформности отображения  $w = z^2$  угол между образами кривых  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  равен углу между кривыми  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$ . Поэтому искомым углом равен  $\frac{\pi}{4}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Решение задачи 81.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 81.6

Сохраняя обозначения, введенные при решении задачи 1), получаем

$$\varphi_1 = \arg(1 + i2 \sin t \cos t) \Big|_{t=0} = \arg 1 = 0,$$

$$\varphi_2 = \arg(1 + it) \Big|_{t=0} = \arg 1 = 0.$$

Поэтому угол между образами кривых  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  равен 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 5. Линейная функция



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 94.6

Так как

$$|-1 - i| = \sqrt{2}, \quad \arg(-1 - i) = -\frac{3\pi}{4},$$

то

$$w = \sqrt{2}e^{-\frac{3\pi}{4}}z + 1.$$

Это отображение может быть представлено в виде композиции трех отображений:

$$\tau = \sqrt{2}z, \quad \xi = e^{-i\frac{3\pi}{4}}\tau, \quad w = \xi + 1.$$

Первое из указанных отображений является растяжением в  $\sqrt{2}$  раз, второе — поворотом на угол  $3\pi/4$  по часовой стрелке вокруг нуля, третье — параллельным переносом на 1 в направлении оси  $Ox$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 95.6

Для нахождения коэффициентов  $a$  и  $b$  линейной функции  $w = az + b$ , переводящей  $A$  в  $A_1$  и  $B$  в  $B_1$ , запишем систему

$$\begin{cases} b = 1 + i, \\ a + b = 0, \end{cases}$$

откуда  $a = -1(1 + i)$ ,  $b = 1 + i$ . Тогда искомое отображение имеет вид

$$w = -(1 + i)z + 1 + i.$$

Заметим, что это отображение точку  $C$  переводит в точку  $C_1$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 96.6

Искомая функция имеет вид  $w = az + b$ . Тогда, учитывая условие задачи, получаем:

$$\begin{cases} -a + b = -1, \\ ia + b = -i, \end{cases}$$

откуда  $a = -i$ ,  $b = -1 - i$ . Поэтому искомое отображение имеет вид

$$w = -iz - 1 - i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 97.3

Для неподвижной точки  $z^*$  выполняется условие  $w(z^*) = z^*$ , т.е.

$$3iz^* + 1 = z^*,$$

откуда

$$z^* = \frac{1}{1 - 3i}$$

или

$$z^* = \frac{1}{10} + \frac{3}{10}i.$$

Так как  $w' = 3i$ , то по свойству модуля и аргумента производной,  $k = |3i| = 3$ ,  $\varphi = \arg 3i = \frac{\pi}{2}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 98.6

Искомое отображение  $w = az + b$  является композицией трех отображений

$$\begin{cases} \tau = 3z, \\ \xi = e^{-i\frac{\pi}{6}}\tau, \\ w = \xi + 6 + 3i. \end{cases}$$

Первое из них растягивает круг  $|z| < 1$  в 3 раза, второе — поворачивает круг  $|\xi| < 3$  на угол  $-\frac{\pi}{6}$ , третье — круг  $|\xi| < 3$  параллельно переносит в круг  $|w - 6 - 3i| < 3$ . Ясно, что при этом горизонтальный диаметр переходит в диаметр, образующий с направлением действительной оси угол  $-\frac{\pi}{6}$ . [\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 99.6

Отображение  $\tau = 11 - z$  переносит заданную полосу на полосу  $0 < \operatorname{Re} \tau < 6$ , которая отображением  $\xi = \frac{\tau}{6}$  сжимается в полосу  $0 < \operatorname{Re} \xi < 1$ . Таким образом, отображение  $\xi = (11 - z)/6$  переводит полосу  $5 < \operatorname{Re} z < 11$  в полосу  $0 < \operatorname{Re} \xi < 1$  и

$$\xi(8) = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}, \quad \xi(8 + i) = \frac{3 - i}{6}.$$

Заметим, что параллельный перенос вдоль мнимой оси полосу  $0 < \operatorname{Re} \xi < 1$  переводит саму в себя. Поэтому, подберем  $t \in \mathbb{R}$  так, чтобы для отображения  $w = \xi + it = (11 - z)/6 + it$  выполнялись условия:

$$\begin{cases} w(8) = \frac{1}{2} + i\frac{1}{2}, \\ \operatorname{Im} w(8 + i) < 1. \end{cases}$$

Отсюда

$$\begin{cases} \frac{1}{2} + it = \frac{1}{2} + i\frac{1}{2}, \\ t - \frac{1}{6} < 1, \end{cases} \quad \text{т.е.} \quad t = \frac{1}{2}.$$

Окончательно получим, что искомое отображение имеет вид

$$w = \frac{11 - z}{6} + \frac{i}{2}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 6. Дробно-линейная функция



## Решение задачи 118.1

Так как  $\operatorname{Im} z = 1/5$ , то **кривая**  $G$  задается параметрическим уравнением

$$z = t + \frac{i}{5}, \quad t \in (-\infty, +\infty).$$

Тогда ее образом является кривая ( $w = u + iv$ )

$$w = \frac{1}{t + \frac{i}{5}}, \quad t \in (-\infty, +\infty).$$

Отсюда следует, что

$$u + iv = \frac{t - \frac{i}{5}}{t^2 + \frac{1}{25}} = \frac{t}{t^2 + \frac{1}{25}} - i \frac{1}{5(t^2 + \frac{1}{25})},$$

т.е.

$$\begin{cases} u = \frac{t}{t^2 + \frac{1}{25}}, \\ v = -\frac{1}{5(t^2 + \frac{1}{25})}. \end{cases}$$

Тогда переменные  $u$  и  $v$  удовлетворяют соотношению

$$u^2 + v^2 + 5v = 0,$$

которое является уравнением окружности.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 6. Дробно-линейная функция

Решение задачи 119.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 119.5

Искомое дробно-линейное отображение **задается формулой**

$$\frac{w - w_1}{w - w_2} : \frac{w_3 - w_1}{w_3 - w_2} = \frac{z - z_1}{z - z_2} : \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}.$$

Подставив заданные значения, получим

$$\frac{1}{w - i} : \frac{1}{1 - i} = \frac{z + 1}{1} : \frac{1 + i}{1}.$$

Заметим, что разность в которой встретился знак  $\infty$  была заменена на 1. Тогда

$$w - i = \frac{2}{z + 1},$$

т.е.

$$w = \frac{iz + 2 + i}{z + 1}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 6. Дробно-линейная функция

Решение задачи 120.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 120.1

Границей области  $G = \{z : \operatorname{Re} z < 0\}$  является прямая  $\operatorname{Re} z = 0$ . Так как  $w(0) = -1$ ,  $w(4i) = -i$ ,  $w(\infty) = 1$ , то мнимая ось (прямая  $\operatorname{Re} z = 0$ ) переходит в окружность  $\{w : |w| = 1\}$ . Эта окружность является границей образа области  $G$ . Поэтому, образом  $G$  может быть либо круг  $\{w : |w| < 1\}$ , либо его внешность. В силу того, что  $w(-1) = -3/5$  и  $|w(-1)| < 1$ , то образ  $G$  есть единичный круг.

[\[Вернуться к условию\]](#)





## Решение задачи 121.1

Найдем образы осей координат, т.е. прямых  $\operatorname{Re} z = 0$  и  $\operatorname{Im} z = 0$ . Так как

$$w(0) = -1, \quad w(1) = -i, \quad w(\infty) = 1,$$

то действительная ось переходит в единичную окружность с центром в нуле.

Аналогично, так как

$$w(0) = -1, \quad w(i) = 0, \quad w(\infty) = 1,$$

то мнимая ось переходит в действительную ось  $\operatorname{Im} w = 0$  (см. [рисунок Р.8](#)). Поэтому, образом  $G$  может




Рис. Р.8

быть только одна из четырех областей, изображенных на [рисунке Р.8](#) (это следует из того, что граница области  $G$  переходит в границу образа  $w(G)$ ). Но

$$w(1+i) = \frac{1}{5} - i\frac{2}{5}.$$

Значит,  $w(G) = G_2$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 122.6

Преобразование симметрии относительно окружности  $\{z : |z| = 1\}$  задается функцией  $z^* = 1/\bar{z}$ .  
Кривая  $\{z : \operatorname{Re} z = 2\}$  является прямой

$$z = 2 + it, \quad t \in (-\infty, +\infty).$$

Поэтому, ее образ задается параметрически в виде

$$z^* = \frac{1}{2 - it} = \frac{2 + it}{t^2 + 4} = \frac{2}{t^2 + 4} + i \frac{t}{t^2 + 4}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Легко проверить, что при  $t \in (-\infty, +\infty)$  точка  $z^*$  пробегает окружность

$$\left| z^* - \frac{1}{4} \right| = \frac{1}{4}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 7. Функция Жуковского



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 139.6

Множество  $E$  является окружностью, задаваемой параметрическим уравнением

$$z = e^{i\varphi}, \quad \varphi \in [0, 2\pi].$$

Тогда ее образ задается параметрическим уравнением

$$w = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} = \cos \varphi, \quad \varphi \in [0, 2\pi].$$

При изменении  $\varphi$  от 0 до  $2\pi$  точка  $w = \cos \varphi$  пробегает отрезок  $[-1, 1]$  действительной оси дважды. Итак, образом  $E$  является отрезок  $[-1, 1]$ . [\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 140.6

Образами окружностей  $\{z : |z| = R > 1\}$  являются эллипсы

$$\frac{u^2}{a_R^2} + \frac{v^2}{b_R^2} = 1,$$

где  $a_R = \frac{1}{2} \left( R + \frac{1}{R} \right)$ ,  $b_R = \frac{1}{2} \left( R - \frac{1}{R} \right)$  и с фокусами в точках  $w = \pm 1$  (см. ответ к задаче 139.5). При изменении  $R$  от 1 до  $\infty$  эти эллипсы заполняют всю плоскость  $w$  с разрезом по отрезку  $[-1, 1]$  (в отрезок  $[-1, 1]$  отображается граница области  $G$ , т.е.  $\partial G = \{z : |z| = 1\}$ , см. ответ к задаче 139.6). Итак, образом  $G$  является  $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ . [\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 141.6

Из [задачи 139.1](#) следует, что луч  $\{z : \arg z = \frac{\pi}{4}\}$  отображится в гиперболу, уравнение которой имеет вид

$$\frac{u^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} - \frac{v^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 1.$$

Рассмотрим луч

$$z = R e^{i\varphi}, \quad 0 < R < +\infty.$$

При отображении с помощью функции Жуковского образом этого луча является кривая

$$\begin{cases} u = \frac{1}{2} \left( R + \frac{1}{R} \right) \cos \varphi, \\ v = \frac{1}{2} \left( R - \frac{1}{R} \right) \sin \varphi, \end{cases} \quad 0 < R < +\infty.$$

Исключая параметр  $R$ , при  $\varphi \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$  и  $\varphi \neq \frac{\pi}{2}$  получаем

$$\frac{u^2}{\cos^2 \varphi} - \frac{v^2}{\sin^2 \varphi} = 1.$$

Это уравнение гиперболы с фокусами в точках  $w = \pm 1$ . При  $\varphi = \frac{\pi}{2}$  луч переходит в прямую  $\{w : \operatorname{Re} w = 0\}$ . Заметим, что при  $\varphi = \frac{\pi}{4}$  и  $\varphi = \frac{3\pi}{4}$  луч переходит в одну и ту же гиперболу. При изменении  $R$  от 0 до  $+\infty$  все остальные гиперболы заполняют всю область, лежащую между ветвями гиперболы (см. [рисунок P.9](#))

$$\frac{u^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} - \frac{v^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 1.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран




Рис. P.9



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 7. Функция Жуковского

Решение задачи 142.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 142.6

Функция Жуковского отображает круг  $\{z : |z| < 1\}$  в область  $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ . Выясним, что является образом отрезка  $[-\frac{1}{2}, 1]$ . В этом случае

$$w = \frac{1}{2} \left( x + \frac{1}{x} \right), \quad x \in \left[ -\frac{1}{2}, 1 \right].$$

Ясно, что отрезок  $[0, 1]$  переходит в  $[1, +\infty)$ , а полуинтервал  $[-\frac{1}{2}, 0)$  в  $(-\infty, -\frac{5}{4}]$ . Тогда в целом область  $G$  перейдет в плоскость с разрезом по  $(-\infty, -\frac{5}{4}] \cup [-1, 1] \cup [1, +\infty)$ , т.е. в  $\mathbb{C} \setminus \{w : w \in (-\infty, -\frac{5}{4}] \cup [-1, +\infty)\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 143.6

Функция Жуковского

$x_i = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right)$  отображает  $\{z : |z| < 1\} \setminus \left[ \frac{1}{3}, 1 \right]$  на всю плоскость с разрезом по отрезку  $[-1, \frac{5}{3}]$ . Линейная функция  $\tau = \frac{3}{4} \left( \xi - \frac{1}{3} \right)$  отображает  $\mathbb{C} \setminus \left[ -1, \frac{5}{3} \right]$  в область  $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ . Одна из ветвей обратной функции к функции Жуковского

$$w = \tau + \sqrt{\tau^2 - 1}$$

отображает  $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$  на  $\{w : |w| < 1\}$ . Таким образом, искомая функция имеет вид

$$w = \tau + \sqrt{\tau^2 - 1}, \quad \tau = \frac{3}{4} \left( \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) - \frac{1}{3} \right).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Решение задачи 158.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 158.1

Найдем, например, образ  $w_3(D_3)$ . Очевидно,

$$w_3 = z^4 = (|z|e^{i \arg z})^4 = |z|^4 e^{4i \arg z}.$$

Если  $|z| < 2$ , то  $|z^4| < 16$ , а если

$$-\frac{\pi}{4} < \arg z < \frac{\pi}{4},$$

то

$$-\pi < 4 \arg z < \pi.$$

Поэтому,

$$w_3(D_3) = \{w : |w| < 16\} \setminus [-16, 0].$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Решение задачи 159.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 159.1

Найдем  $w_1(D_1)$ . Так как,

$$w_1 = e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy},$$

то  $|e^z| = e^x$ , а  $\arg e^z = y$ . Если  $z \in D_1$ , то  $2 < x < 4$ ,  $\pi/6 < y < \pi/3$ . Тогда  $w \in w_1(D_1)$  только в том случае, когда  $e^2 < |w| < e^4$ , а  $\pi/6 < \arg w < \pi/3$ , т.е.

$$w_1(D_1) = \left\{ w : e^2 < |w| < e^4, \frac{\pi}{6} < \arg w < \frac{\pi}{3} \right\}.$$

Найдем  $w_2(D_2)$ . По определению

$$w_2 = \ln z = \ln |z| + i \arg z.$$

Если  $z \in D_2$ , то  $1 < |z| < e$ , а  $0 < \arg z < \pi$ . В этом случае  $0 < \ln |z| < 1$ ,  $0 < \arg z < \pi$ . Поэтому,

$$w_2(D_2) = \{z : 1 < |z| < e, 0 < \arg z < \pi\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 160.1

По определению

$$\begin{aligned}w_3 = \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{e^{i(x+iy)} + e^{-i(x+iy)}}{2} = \\ &= \frac{1}{2}(e^y + e^{-y}) \cos x + i \frac{1}{2}(e^{-y} - e^y) \sin x.\end{aligned}$$

Если  $z \in D$ , то  $-\pi/2 < x < \pi/2$ ,  $y > 0$ . Поэтому,

$$u(x, y) = \frac{1}{2}(e^y + e^{-y}) \cos x > 0,$$

а

$$v(x, y) = \frac{1}{2}(e^{-y} - e^y) \sin x$$

пробегает все значения из  $\mathbb{R}$ . При этом  $v(x, y) = 0$  только в том случае, когда  $x = 0$  и

$$u(x, y) = \frac{1}{2}(e^y + e^{-y}).$$

Но при  $y > 0$

$$u(x, y) = \frac{1}{2}(e^y + e^{-y}) > 1.$$

Поэтому,  $w \in w(D)$  только в том случае, когда  $\operatorname{Re} w > 0$  и  $w \neq [0, 1]$ , т.е.

$$w(D) = \{w : \operatorname{Re} w > 0\} \setminus [0, 1].$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 161.1

Отображение  $\tau = z - 6$  переводит полосу  $G_1$  в полосу  $G_1^* = \{\tau : 0 < \operatorname{Re} \tau < 6\}$   $\tau$ -плоскости (рисунок P.10).




Рис. P.10

Отображение  $\xi = \pi/6\tau$  переводит полосу  $G_1^*$   $\tau$ -плоскости в полосу  $G_2^* = \{\xi : 0 < \operatorname{Re} \xi < \pi\}$   $\xi$ -плоскости (рисунок P.11).




Рис. P.11

Отображение  $w = e^{i\xi}$  переводит полосу  $G_2^*$   $\xi$ -плоскости в верхнюю полуплоскость  $w$ -плоскости (рисунок P.12).

Искомое отображение является композицией указанных трех отображений, т.е.

$$w = e^{i \frac{\pi(z-6)}{6}} : G_1 \rightarrow G_2.$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран




Рис. P.12



## Решение задачи 162.6

Отображение полуплоскости  $\{z : \operatorname{Im} z > 0\}$  на треугольник с вершинами в точках  $A_1(0, 0)$ ,  $B_1(1, 0)$  и  $C_1(x_0, y_0)$ , где  $y_0 > 0$ ,  $0 < \alpha_k < 1$ ,  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$  (рисунок P.13). задается интегралом Кристоффеля –




Рис. P.13

Шварца

$$w = \frac{1}{B(\alpha_1, \alpha_2)} \int_0^z \xi^{\alpha_1-1} (1-\xi)^{\alpha_2-1} d\xi,$$

где  $B(x, y)$  — бета-функция Эйлера, т.е.

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt.$$

Отобразим треугольник  $ABC$  на треугольник  $A_1B_1C_1$  указанного вида (рисунок P.14).

Для этого используем последовательность элементарных преобразований:

- 1)  $\tau = w - 3 - 3i$  — параллельный перенос;
- 2)  $u = e^{i\pi}\tau$  — поворот на угол  $\pi$ ;






Рис. P.14

3)  $\zeta = u/4$  — подобие.

Тогда искомое отображение является линейным и имеет вид

$$\zeta = -\frac{w - 3 - 3i}{4}.$$

Так как

$$\zeta(1 + i) = \frac{1}{2} + i\frac{1}{2},$$

то  $C_1(1/2, 1/2)$ , т.е. треугольник  $A_1B_1C_1$  — равнобедренный и углы при основании  $A_1B_1$  равны  $\pi/4$ .

Тогда отображение верхней полуплоскости на треугольник  $A_1B_1C_1$  имеет вид:

$$\zeta = \frac{1}{B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)} \int_0^z \xi^{-\frac{3}{4}} (1 - \xi)^{-\frac{3}{4}} d\xi. \quad (\text{P.1})$$

Найдем отображение  $\Delta A_1B_1C_1$  на  $\Delta ABC$ . Для этого найдем обратное отображение к линейному отображению  $\zeta = -(w - 3 - 3i)/4$ , т.е. выразим  $w$  через  $\zeta$ . В результате получим

$$w = -4\zeta + 3 + 3i. \quad (\text{P.2})$$

Тогда искомое отображение полуплоскости на  $\Delta ABC$  является композицией отображений (P.1) и (P.2), т.е.

$$w = \frac{-4}{B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)} \int_0^z \xi^{-\frac{3}{4}} (1 - \xi)^{-\frac{3}{4}} d\xi + 3 + 3i.$$



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Решение задачи 162.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши



## Решение задачи 172.6

Уравнение кривой в каждом из рассматриваемых случаев можно записать следующим образом:

а)  $z = t + it^2, 0 \leq t \leq 1;$

б)  $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ , где  $\Gamma_1: z = it, 0 \leq t \leq 1, \Gamma_2: z = t + i, 0 \leq t \leq 1.$

Поэтому, воспользовавшись формулой

$$I = \int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t))z'(t) dt,$$

получим:

а)  $I = \int_0^1 (1 - it^2)(1 + i2t) dt = 1 + \frac{i}{3};$

б)  $I = \int_0^1 (-it)i dt + \int_0^1 (t - i) dt = 1 - i.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 173.3

Интегральная формула Коши имеет вид

$$g(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(z) dz}{z - z_0},$$

где точка  $z_0$  лежит внутри  $\gamma$ , а  $g(z)$  является **аналитической** в **односвязной области**, ограниченной  $\gamma$ .

В случае а)

$$\int_{\gamma} \frac{e^z dz}{z(z-1)} = \int_{\gamma} \frac{\frac{e^z}{z-1} dz}{z} = 2\pi i g(0) = -2\pi i,$$

где  $z_0 = 0$ , а  $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$ .

В случае б)

$$\int_{\gamma} \frac{e^z dz}{z(z-1)} = \int_{\gamma} \frac{\frac{e^z}{z} dz}{z-1} = 2\pi i g(1) = 2\pi e i,$$

где  $z_0 = 1$ , а  $g(z) = \frac{e^z}{z}$ .

В случае в), учитывая равенство

$$\frac{1}{z(z-1)} = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z},$$

получаем

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \frac{e^z dz}{z(z-1)} &= \int_{\gamma} \frac{e^z dz}{z-1} - \int_{\gamma} \frac{e^z dz}{z} = \\ &= 2\pi i g_1(1) - 2\pi i g_2(0) = 2\pi e i - 2\pi i = 2\pi(e-1), \end{aligned}$$

где для первого интеграла  $z_0 = 1$ ,  $g_1(z) = e^z$ , а для второго —  $z_0 = 0$ ,  $g_2(z) = e^z$ .



В случае г)

$$\int_{\gamma} \frac{e^z dz}{z(z-1)} = 0$$

по интегральной теореме Коши.

*Замечание Р.1.* В случае в) можно не прибегать к разложению рациональной функции  $\frac{1}{z(z-1)}$  на простые дроби, а воспользоваться равенством

$$\int_{\gamma} \frac{e^z dz}{z(z-1)} = \int_{\gamma_1} \frac{e^z dz}{z(z-1)} + \int_{\gamma_2} \frac{e^z dz}{z(z-1)},$$

где контуры  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  описаны в случаях а) и б) соответственно (см. [рисунок Р.15](#)), а  $\gamma^*$  — разрез, проходящий




Рис. Р.15

при интегрировании два раза в противоположных направлениях.

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 174.6

В случае а) представим данный интеграл в виде:

$$I = \int_{\gamma} \frac{e^z dz}{z^2(z+1)^3} = \int_{\gamma} \frac{g(z) dz}{z^2},$$

где  $g(z) = \frac{e^z}{(z+1)^3}$ . Тогда к этому интегралу можно применить обобщенную интегральную формулу Коши ( $z_0 = 0$  и  $n = 1$ ). В результате получим, что

$$I = \frac{2\pi i}{1!} g'(0) = 2\pi i \cdot (-2) = -4\pi i.$$

Аналогично, в случае б)

$$I = \int_{\gamma} \frac{e^z dz}{z^2(z+1)^3} = \int_{\gamma} \frac{g(z) dz}{(z+1)^3},$$

где  $g(z) = \frac{e^z}{z^2}$ . Применив обобщенную интегральную формулу Коши ( $z_0 = -1$ ,  $n = 2$ ), получим

$$I = \frac{2\pi i}{2!} g^{(2)}(-1) = 2\pi i \cdot (-2) = \frac{11\pi i}{e}.$$

В случае в) воспользуемся равенством

$$I = \int_{\gamma} \frac{e^z dz}{z^2(z+1)^3} = \int_{\gamma_1} \frac{e^z dz}{z^2(z+1)^3} + \int_{\gamma_2} \frac{e^z dz}{z^2(z+1)^3},$$

где контуры  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  описаны в случаях а) и б) соответственно (см. [рисунок P.16](#)), а  $\gamma^*$  — разрез, проходящий при интегрировании два раза в противоположных направлениях. Поэтому,

$$I = \frac{11\pi i}{e} - 4\pi i = \left(\frac{11}{e} - 4\right) \pi i.$$

В случае г) интеграл равен нулю по [интегральной теореме Коши](#).

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран




Рис. Р.16





## Решение задачи 175.6

Функция

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 4)(z - 1)}$$

теряет аналитичность в точках  $1, \pm 2i$ . Рассмотрим всевозможные положения контура  $\gamma$  по отношению к этим точкам.

Пусть контур  $\gamma$  содержит внутри себя ровно одну из указанных точек (см. [рисунок Р.17](#)).




Рис. Р.17

В каждом случае применим [интегральную формулу Коши](#). Если  $\gamma$  совпадает с контуром  $\gamma_1$ , то

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_{\gamma_1} \frac{dz}{(z + 2i)(z - 2i)(z - 1)} = \left[ g(z) = \frac{z_0 = 2i}{(z + 2i)(z - 1)} \right] = 2\pi i \cdot g(2i) = \\
 &= 2\pi i \cdot \frac{1}{4i(2i - 1)} = -\frac{\pi}{10}(1 + 2i).
 \end{aligned}$$



Если  $\gamma = \gamma_2$ , то

$$I_2 = \int_{\gamma_2} \frac{dz}{(z+2i)(z-2i)(z-1)} = \left[ \begin{array}{l} z_0 = 1 \\ g(z) = \frac{1}{z^2+4} \end{array} \right] = 2\pi i \cdot g(1) = \frac{2\pi}{5} i.$$

Таким же образом, если  $\gamma = \gamma_3$ , то

$$I_3 = \int_{\gamma_3} \frac{dz}{(z+2i)(z-2i)(z-1)} = \left[ \begin{array}{l} z_0 = -2i \\ g(z) = \frac{1}{(z-2i)(z-1)} \end{array} \right] = 2\pi i \cdot g(-2i) = \\ = 2\pi i \cdot \frac{1}{-4i(-1-2i)} = \frac{\pi}{10}(1-2i).$$

Пусть теперь контур  $\gamma$  содержит внутри себя только точки  $2i$  и  $1$ . Тогда, произведя разрез по кривой  $\gamma^*$  (см. [рисунок Р.18](#)) и используя рассуждения из решения [задачи 174.6](#), получим




Рис. Р.18

$$I_4 = \int_{\gamma} \frac{dz}{(z^2+4)(z-1)} = I_1 + I_2 = -\frac{\pi}{10}(1+2i) + \frac{2\pi}{5} i = -\frac{\pi}{10}(1-2i).$$



Аналогично, если контур  $\gamma$  содержит внутри себя только точки  $\pm 2i$ , то

$$I_5 = \int_{\gamma} \frac{dz}{(z^2 + 4)(z - 1)} = I_1 + I_3 = -\frac{\pi}{10}(1 + 2i) + \frac{\pi}{10}(1 - 2i) = -\frac{2\pi}{5}i.$$

Если же внутри  $\gamma$  находятся только точки  $-2i$  и  $1$ , то

$$I_6 = \int_{\gamma} \frac{dz}{(z^2 + 4)(z - 1)} = I_2 + I_3 = \frac{2\pi}{5}i + \frac{\pi}{10}(1 - 2i) = \frac{\pi}{2}(1 + 2i).$$

Осталось рассмотреть еще два случая расположения контура  $\gamma$ . Если контур  $\gamma$  содержит внутри себя точки  $\pm 2i$  и  $1$ , то

$$I_7 = \int_{\gamma} \frac{dz}{(z^2 + 4)(z - 1)} = I_1 + I_2 + I_3 = -\frac{\pi}{10}(1 + 2i) + \frac{2\pi}{5}i + \frac{\pi}{10}(1 - 2i) = \frac{\pi}{2}(1 + 2i) = 0.$$

Если контур  $\gamma$  не содержит внутри себя ни одной из точек  $\pm 2i$  и  $1$ , то функция  $f(z)$  является аналитической в замыкании области, ограниченной  $\gamma$  и по **интегральной теореме Коши**

$$I_8 = \int_{\gamma} \frac{dz}{(z^2 + 4)(z - 1)} = 0.$$

Итак, данный интеграл может принимать семь различных значений:

$$-\frac{\pi}{10}(1 + 2i), \frac{2\pi}{5}i, \frac{\pi}{10}(1 - 2i), -\frac{\pi}{10}(1 - 2i), -\frac{2\pi}{5}i, \frac{\pi}{2}(1 + 2i), 0.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 10. Степенные ряды



## Решение задачи 196.6

Радиус сходимости  $R$  степенного ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

будем находить по [формуле Коши – Адамара](#):

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}.$$

В нашем случае  $\sqrt[n]{|c_n|} = \sqrt[n]{n^2} \cdot (3 + (-1)^n)$ . Поскольку верхний предел последовательности является наибольшей ее предельной точкой и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2} = 1,$$

то

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = 4.$$

Следовательно, радиус сходимости  $R = \frac{1}{4}$ . Тогда круг сходимости  $D$  совпадает с кругом, центр которого в точке  $z_0 = i$ , а радиус равен  $\frac{1}{4}$ , т.е.

$$D = \left\{ z : |z - i| < \frac{1}{4} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 197.6

Обозначим искомый радиус сходимости через  $R^*$ .

Если  $|z_0| > 1$ , то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|1 + z_0^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} |z_0| \sqrt[n]{\left| \frac{1}{z_0^n} + 1 \right|} = |z_0|.$$

Заметим, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|1 + z_0^n|} = 1 \quad \text{при } |z_0| \leq 1.$$

Поэтому,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|1 + z_0^n| |c_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|1 + z_0^n|} \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \frac{1}{R} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|1 + z_0^n|}.$$

Отсюда и из **формулы Коши – Адамара** следует, что

$$R^* = \frac{R}{|z_0|}, \quad \text{если } |z_0| > 1,$$

и

$$R^* = R, \quad \text{если } |z_0| \leq 1.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 198.6

Радиус сходимости ряда равен 1. Поэтому границей круга сходимости является единичная окружность  $\{z : |z| = 1\}$ . Каждую точку  $z$  этой окружности представим в виде

$$z = \cos \varphi + i \sin \varphi,$$

где  $\varphi$  — угол, принадлежащий промежутку  $[0, 2\pi)$ . Тогда, принимая во внимание формулу Эйлера

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi,$$

получим

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^n}{n \ln^2 z} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos n\varphi}{n \ln^2 n} + i \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin n\varphi}{n \ln^2 n}.$$

Поэтому сходимость нашего ряда равносильна сходимости двух действительных рядов

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos n\varphi}{n \ln^2 n}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin n\varphi}{n \ln^2 n}.$$

Поскольку последовательность

$$a_n = \frac{1}{n \ln^2 n},$$

монотонно убывает, стремится к нулю и при  $\varphi \neq 0$

$$\left| \sum_{n=0}^N \cos n\varphi \right| \leq \left| \frac{\sin \left(N + \frac{1}{2}\right) \varphi + \sin \frac{\varphi}{2}}{2 \sin \frac{\varphi}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{\varphi}{2} \right|},$$

$$\left| \sum_{n=0}^N \sin n\varphi \right| \leq \left| \frac{\cos \frac{\varphi}{2} - \cos \left(N + \frac{1}{2}\right) \varphi}{2 \sin \frac{\varphi}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{\varphi}{2} \right|},$$



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

а значит и

$$\left| \sum_{n=2}^N \cos n\varphi \right| \leq 2 + \frac{1}{\left| \sin \frac{\varphi}{2} \right|}, \quad \left| \sum_{n=2}^N \sin n\varphi \right| \leq 2 + \frac{1}{\left| \sin \frac{\varphi}{2} \right|},$$

то по признаку Дирихле оба ряда сходятся для  $\varphi \neq 0$ .

Пусть  $\varphi = 0$ , т.е.  $z = 1$ . Данный ряд в этой точке имеет вид

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}.$$

К исследованию его сходимости применим интегральный признак Коши. Рассмотрим первообразную

$$F(x) = \int_2^x \frac{dt}{t \ln^2 t} = -\frac{1}{\ln t} \Big|_2^x = -\frac{1}{\ln x} + \frac{1}{\ln 2}.$$

Так как

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{1}{\ln 2},$$

то несобственный интеграл

$$\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t \ln^2 t}$$

сходится, а следовательно, сходится и ряд

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





## Решение задачи 199.6

Радиус сходимости ряда равен 1. Поскольку при

$$\frac{1}{(1+z)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \quad \text{при } |z| < 1,$$

то для этих  $z$

$$\frac{1}{(1+z^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}.$$

Дифференцируя этот степенной ряд при  $|z| < 1$ , приходим к равенству

$$\frac{-2z}{(1+z^2)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 2n z^{2n-1}.$$

Сокращая обе части последнего разложения на  $-2z$  и вводя новую переменную суммирования, получаем

$$\frac{1}{(1+z^2)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) z^{2n}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 11. Ряды Тейлора



## Решение задачи 216.6

С помощью метода неопределенных коэффициентов легко показать, что

$$\frac{6z}{(z-1)(z-3)} = \frac{-3}{z-1} + \frac{9}{z-3}.$$

Поэтому, нужно разложить по степени  $(z-2)$  в окрестности точки  $z_0 = 2$  функции  $-3/(z-1)$  и  $9/(z-3)$ .

Так как при  $|z-2| < 1$

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{1+z-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n,$$

то

$$\frac{-3}{z-1} = -3 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n.$$

Аналогично, при  $|z-2| < 1$

$$\frac{9}{z-3} = \frac{-9}{1-(z-2)} = -9 \sum_{n=0}^{\infty} (z-2)^n.$$

Поэтому, при  $|z-2| < 1$

$$\frac{6z}{(z-1)(z-3)} = 3 \sum_{n=0}^{\infty} ((-1)^{n+1} - 3)(z-2)^n, \quad D = \{z : |z-2| < 1\}.$$

Так как точки  $z = 1$  и  $z = 3$  для функции  $f(z) = 6z/((z-1)(z-3))$  являются единственными конечными особыми точками, то по **теореме Тейлора** полученный степенной ряд сходится в круге сходимости  $D = \{z : |z-2| < 1\}$ . [[Вернуться к условию](#)]



## Решение задачи 217.6

Применим известную формулу тригонометрии и получим

$$\cos(3z - i) = \cos i \cos 3z + \sin i \sin 3z.$$

Разложение в ряд Тейлора функций  $\cos \xi$  и  $\sin \xi$  имеют вид:

$$\cos \xi = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\xi^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin \xi = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\xi^{2n-1}}{(2n-1)!}.$$

Поэтому,

$$\begin{aligned} \cos 3z &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n}}{(2n)!} z^{2n}, \\ \sin 3z &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^{2n-1}}{(2n-1)!} z^{2n-1}. \end{aligned}$$

Учитывая эти разложения, получим:

$$\cos(3z - i) = \cos i \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n}}{(2n)!} z^{2n} + \sin i \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^{2n-1}}{(2n-1)!} z^{2n-1}.$$

Так как конечных особых точек у функции  $\cos(3z - 1)$  нет, то радиус круга сходимости  $R = \infty$ , т.е.  $D = \{z : |z| < +\infty\}$ . [\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 218.6

Будем опираться на известное разложение

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, \quad |z| < 1. \quad (\text{P.3})$$

В круге сходимости  $\{z : |z| < 1\}$  ряд (P.3) можно почленно дифференцировать. Поэтому,

$$\frac{-1}{(1+z)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n z^{n-1}.$$

Подставим в это разложение  $z^2$  вместо  $z$ , получим

$$\frac{1}{(1+z^2)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} n z^{2n-2}.$$

Так как для функции  $1/(1+z^2)^2$  конечными особыми точками является  $z = -i$  и  $z = i$ , то по **теореме Тейлора** кругом сходимости полученного ряда является  $D = \{z : |z| < 1\}$ . [\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 219.6

Функция  $\operatorname{tg} z$  является **аналитической** во всей комплексной плоскости  $\mathbb{C}$ , кроме точек  $z_k = \pi/2 + k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . Поэтому, в круге  $D = \{z : |z| < \pi/2\}$  она **разлагается в ряд Тейлора**, т.е. справедливо равенство

$$\frac{\sin z}{\cos z} = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n + \dots, \quad |z| < \frac{\pi}{2},$$

где  $a_0 = \operatorname{tg} 0 = 0$ , а  $a_1, a_2, a_3, \dots$  — неизвестные коэффициенты.

Отсюда для  $|z| < \pi/2$  имеем

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \left( \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n \right) \cdot \left( \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \right).$$

Перемножая ряды в правой части последнего равенства, будем иметь:

$$\begin{aligned} z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots &= \\ &= a_1 z + a_2 z^2 + \left( a_3 - \frac{a_1}{2!} \right) z^3 + \left( a_4 - \frac{a_2}{2} \right) z^4 + \left( a_5 - \frac{a_3}{2} + \frac{a_1}{24} \right) z^5 + \dots \end{aligned}$$

Отсюда получаем, что  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = 0$ ,  $a_3 = 1/3$ ,  $a_4 = 0$ ,  $a_5 = 2/15$ , и, следовательно

$$\operatorname{tg} z = z + \frac{1}{3} z^3 + \frac{2}{15} z^5 + \dots, \quad D = \left\{ z : |z| < \frac{\pi}{2} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Решение задачи 236.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 236.3

Решив уравнение

$$z \sin z = 0,$$

найдем все нули данной функции:  $z_k = k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)





## Решение задачи 237.3

Разложим данную функцию в ряд Тейлора по степеням  $z$ . Для этого воспользуемся известным разложением для  $e^\xi$ , положив  $\xi = z^2$ . В результате получим

$$\begin{aligned} z^2(e^{z^2} - 1) &= z^2 \left( \frac{z^2}{1!} + \frac{z^4}{2!} + \frac{z^6}{3!} + \dots \right) = \\ &= z^4 \left( 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{3!} + \dots \right) = z^4 \varphi(z), \end{aligned}$$

где  $\varphi(0) = 1 \neq 0$  и функция  $\varphi(z)$  аналитична в точке 0 (как сумма степенного ряда). Отсюда следует, что  $n = 4$ , т.е.  $z_0 = 0$  — нуль четвертого порядка. Решение этой задачи с помощью вычисления производных является более громоздким. [\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Решение задачи 238.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 238.1

Преобразуем:

$$w = (z^4 - 1)(z - 1) = (z^2 - 1)(z^2 + 1)(z - 1) = (z - 1)^2(z + 1)(z - i)(z + i).$$

Отсюда следует, что  $z_1 = 1$  — нуль порядка 2,  $z_2 = -1$ ,  $z_{3,4} = \pm i$  — простые нули данной функции.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Решение задачи 239.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 239.1

Предположим, что такая функция  $w = f(z)$  существует. Рассмотрим множество  $E = \{1/(2k + 1)\}_{k=1}^{\infty}$  и функцию  $g_1(z) \equiv 0$ . Так как  $E$  в  $D$  имеет предельную точку  $a = 0$ , и  $f(z) = g_1(z)$  для всех  $z \in E$ , то по теореме единственности  $f(z) = g_1(z) = 0$  для всех  $z \in D$ . Рассмотрим теперь множество  $E_1 = \{1/(2k)\}_{k=2}^{\infty}$  и функцию  $g_2(z) \equiv 1$ .  $E_1$  имеет в  $D$  предельную точку  $a = 0$ , и аналитические функции  $f(z)$  и  $g_2(z)$  совпадают на  $E_1$ , т.е.  $f(z) = g_2(z)$  для всех  $z \in E_1$ . По теореме единственности  $f(z) = g_2(z) = 1$  для всех  $z \in D$ . Итак, одновременно  $f(z)$  тождественно равна 0 и 1 в  $D$ . Полученное противоречие показывает, что функции с указанными свойствами не существует. [\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 240.1

Предположим, что такая функция  $w = f(z)$  существует. Рассмотрим множество  $E = \{1/(2k+1)\}_{k=1}^{\infty}$ . Это множество имеет в  $D$  предельную точку  $a = 0$ . Функция  $g(z) = z$  является аналитической в  $D$  и

$$f\left(\frac{1}{2k+1}\right) = g\left(\frac{1}{2k+1}\right) = \frac{1}{2k+1}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

По теореме единственности  $f(z) = z$  для всех  $z \in D$ . В частности,

$$f\left(\frac{1}{2k}\right) = \frac{1}{2k}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Но по условию

$$f\left(\frac{1}{2k}\right) = \frac{1}{2k + \cos^2 k\pi} = \frac{1}{2k+1} \neq \frac{1}{2k} = f\left(\frac{1}{2k}\right).$$

Полученное противоречие показывает, что функции с указанными свойствами не существует.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 13. Ряд Лорана



## Решение задачи 256.6

а) Функция  $f(z)$  **аналитична** в круге  $\{z : |z| < 1\}$ . Ряд Лорана является **рядом Тейлора**, который находится следующим образом:

$$f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-1)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1},$$

$$\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n \quad (|z| < 2),$$

$$\frac{1}{z-1} = -\frac{1}{1-z} = -\sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1).$$

Поэтому в круге  $\{z : |z| < 1\}$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n.$$

б) Аналогично, как и в случае а):

$$f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1},$$

$$\frac{1}{z-2} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} \quad (|z| < 2),$$

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n} \quad (|z| > 1).$$

Поэтому в конце  $K = \{z : 1 < |z| < 2\}$

$$f(z) = -\sum_{n=-\infty}^{-1} z^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}.$$



в) В кольце  $K = \{z : |z| > 2\}$ :

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \sum_{n=-\infty}^{-1} z^n,$$
$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{z^n}.$$

Поэтому, в этом случае

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} z^n - \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{z^n}{2^{n-1}} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) z^n,$$

или, в другой записи,

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (1 - 2^{n-1}) \frac{1}{z^n}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 257.6

У функции  $f(z) = 1/(z(z+3)^2)$  имеется две особые точки  $z_1 = 0$  и  $z_2 = -3$ . Разложим ее на сумму простых дробей

$$\frac{1}{z(z+3)^2} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z+3} + \frac{C}{(z+3)^2}.$$

Приводя члены в правой части равенства к общему знаменателю, получим:

$$\frac{1}{z(z+3)^2} = \frac{A(z+3)^2 + Bz(z+3) + Cz}{z(z+3)^2}.$$

Отсюда следует, что  $A = 1/9$ ,  $B = -1/9$ ,  $C = -3/9$ , т.е.

$$f(z) = \frac{1}{9} \left[ \frac{1}{z} - \frac{1}{z+3} - \frac{3}{(z+3)^2} \right].$$

Далее имеем:

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{z+1-1} = \frac{1}{z+1} \frac{1}{1-\frac{1}{z+1}} = \frac{1}{z+1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z+1)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z+1)^{n+1}} \quad (1 < |z+1|),$$

$$\frac{1}{z+3} = \frac{1}{2+z+1} = \frac{1}{2} \frac{1}{1+\frac{z+1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z+1)^n}{2^{n+1}} \quad (|z+1| < 2).$$

Дифференцируя при  $|z+1| < 2$  предыдущее равенство, получаем, что

$$-\frac{1}{(z+3)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^{n+1}} (z+1)^{n-1}.$$





Учитывая предыдущие равенства, при  $1 < |z + 1| < 2$  будем иметь

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{9} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z+1)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(z+1)^n}{2^{n+1}} + 3 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n+1}{2^{n+2}} (z+1)^n \right] = \\ &= \frac{1}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z+1)^{n+1}} + \frac{1}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+2}} (3n+5)(z+1)^n. \end{aligned}$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 258.6

Заметим, что

$$\begin{aligned} f(z) &= \cos \frac{(z-2)^2 - 4}{(z-2)^2} = \cos \left( 1 - \frac{4}{(z-2)^2} \right) = \\ &= \cos 1 \cos \frac{4}{(z-2)^2} + \sin 1 \sin \frac{4}{(z-2)^2}. \end{aligned}$$

Воспользуемся далее разложениями

$$\begin{aligned} \cos \xi &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \xi^{2n}, \quad \xi \in \mathbb{C}, \\ \sin \xi &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} \xi^{2n-1}, \quad \xi \in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

Тогда при  $0 < |z-2| < +\infty$

$$\begin{aligned} \cos \frac{4}{(z-2)^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \frac{4^{2n}}{(z-2)^{4n}}, \\ \sin \frac{4}{(z-2)^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} \frac{4^{2n-1}}{(z-2)^{4n-2}}. \end{aligned}$$

Поэтому в кольце  $K = \{z : 0 < |z-2| < +\infty\}$

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{(-1)^n 4^{2n} \cos 1}{(2n)! (z-2)^{4n}} + \frac{(-1)^{n-1} 4^{2n-1} \sin 1}{(2n-1)! (z-2)^{4n-2}} \right] + \cos 1.$$



## Решение задачи 259.6

Найдем все особые точки данной функции. Они совпадают с корнями уравнения  $\cos z = 1$  и, следовательно, являются значениями  $\operatorname{Arccos} 1$ . Поскольку

$$\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln} (z + \sqrt{z^2 - 1}),$$

то

$$z_k = -i \operatorname{Ln} 1 = -i(\ln |1| + i \arg 1 + 2k\pi i) = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Поэтому, если взять любую проколотую окрестность  $U(\infty, \varepsilon) = \{z : \varepsilon < |z|\}$  точки  $z_0 = \infty$ , то в ней всегда найдутся особые точки  $f(z)$ . Это следует из того, что при  $k \rightarrow \infty$  последовательность  $z_k \rightarrow +\infty$ .

Значит, данная функция не допускает разложение в ряд Лорана ни в какой проколотой окрестности точки  $z_0$ . [\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции



## Решение задачи 273.4

Рассмотрим функцию

$$\frac{1}{f(z)} = z^3(2 - \cos z).$$

Она имеет нули в точке  $z = 0$  и точках, которые являются корнями уравнения

$$\cos z = 2,$$

т.е.

$$z_k = \operatorname{Arccos} 2 = -i \operatorname{Ln}(2 \pm \sqrt{3}) = -i(\pm \ln(2 + \sqrt{3}) + i2k\pi) = 2k\pi \pm i \ln(2 + \sqrt{3}), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Здесь мы воспользовались тем, что  $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 1$ .

Поскольку в окрестности точки  $z = 0$

$$\frac{1}{f(z)} = z^3 \cdot \varphi(z), \quad \varphi(z) = 2 - \cos z, \quad \varphi(0) \neq 0,$$

то  $z = 0$  — ноль третьего порядка для функции  $1/f(z)$ . Тогда из **критерия для полюса** следует, что  $z = 0$  является **полюсом третьего порядка** для функции  $f(z)$ .

Аналогично, для функции  $1/f(z)$  каждая из точек  $z_k = 2k\pi \pm i \ln(2 + \sqrt{3})$  является полюсом первого порядка. Действительно, так как

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(z_k)} &= 0, \\ \left( \frac{1}{f(z)} \right)' \Big|_{z=z_k} &= 3z_k^2(2 - \cos z_k) + z_k^3 \sin z_k = z_k^3 \sin z_k \neq 0, \end{aligned}$$

то  $z_k$  является нулем первого порядка для функции  $1/f(z)$  и, следовательно, полюсом первого порядка функции  $f(z)$ . Заметим, что  $\sin z_k \neq 0$ , так как известно, что все нули  $\sin z$  имеют вид:  $m\pi$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 273.6

Особыми точками функции

$$f(z) = \frac{e^z}{z(1 - e^{-z})}$$

являются точка  $z = 0$  и корни уравнения  $e^{-z} = 1$ , т.е.

$$z_k = -\operatorname{Ln} 1 = i2k\pi, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

Так как

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(z)} &= z e^{-z}(1 - e^{-z}), \\ \left(\frac{1}{f(z)}\right)' &= (e^{-z} - z e^{-z})(1 - e^{-z}) + z e^{-2z}, \end{aligned}$$

и

$$\left(\frac{1}{f(z)}\right)' \Big|_{z=z_k} = z_k e^{-2z_k} \neq 0, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots,$$

то  $z_k$  является нулем первого порядка для  $1/f(z)$ , а, следовательно, **полюсом первого порядка** для  $f(z)$ . Заметим, что

$$\left(\frac{1}{f(z)}\right)' \Big|_{z=0} = 0,$$

а

$$\left(\frac{1}{f(z)}\right)'' \Big|_{z=0} \neq 0.$$

Значит, точка  $z = 0$  — ноль второго порядка для  $1/f(z)$ . Тогда  $z = 0$  является полюсом второго порядка для  $f(z)$ .

Поскольку  $|z_k| = 2k\pi \rightarrow \infty$  при  $k \rightarrow +\infty$ , то точка  $z = \infty$  является предельной точкой полюсов, т.е. не является изолированной особой точкой. [[Вернуться к условию](#)]



## Решение задачи 274.6

У функции

$$f(z) = \sin\left(\frac{1}{\sin\frac{1}{z}}\right)$$

особыми точками являются  $z = 0$ ,  $z = \infty$  и решения уравнения

$$\frac{1}{z} = k\pi, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots,$$

т.е.

$$z_k = \frac{1}{k\pi}, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

Выясним характер особых точек  $z_k = 1/(k\pi)$ . Для этого при фиксированном  $k = \pm 1, \pm 2, \dots$  исследуем предел

$$I = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{k\pi}} \sin\left(\frac{1}{\sin\frac{1}{z}}\right) = \lim_{z \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{\sin\frac{1}{z + \frac{1}{k\pi}}}\right) = (-1)^k \lim_{z \rightarrow 0} \sin \frac{1}{\sin\left(\frac{1}{z + \frac{1}{k\pi}} - k\pi\right)}.$$

Здесь мы воспользовались формулой приведения. Заметим, что

$$\sin \frac{1}{\sin\left(\frac{1}{z + \frac{1}{k\pi}} - k\pi\right)} = \sin \frac{-k\pi z}{z + \frac{1}{k\pi}}.$$

Полагая по определению

$$g(z) = -\sin\left(\frac{1}{\sin\frac{k\pi z}{z + \frac{1}{k\pi}}}\right),$$

получаем, что

$$I = (-1)^k \lim_{z \rightarrow 0} g(z).$$

Покажем, что предел  $\lim_{z \rightarrow 0} g(z)$  не существует.



По **определению** это означает, что  $z_k = 1/(k\pi)$  — существенно особая точка функции  $f(z)$ .  
Для этого с помощью следующих равенств определим две последовательности  $\{z_n^1\}_{n=1}^\infty$ ,  $\{z_n^2\}_{n=1}^\infty$ :

$$\frac{z_n^1 k \pi}{z_n^1 + \frac{1}{k \pi}} = \arcsin \frac{1}{2 \pi n},$$
$$\frac{z_n^2 k \pi}{z_n^2 + \frac{1}{k \pi}} = \arcsin \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2 \pi n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Тогда при  $n \rightarrow \infty$

$$z_n^1 = \frac{\frac{1}{k \pi} \cdot \arcsin \frac{1}{2 \pi n}}{k \pi - \arcsin \frac{1}{2 \pi n}} \rightarrow 0,$$
$$z_n^2 = \frac{\frac{1}{k \pi} \cdot \arcsin \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2 \pi n}}{k \pi - \arcsin \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2 \pi n}} \rightarrow 0.$$

Остается заметить, что при  $n \rightarrow \infty$

$$g(z_n^1) = \sin 2 \pi n = 0 \rightarrow 0,$$
$$g(z_n^2) = \sin \left( \frac{\pi}{2} + 2 \pi n \right) = 1 \rightarrow 1,$$

т.е. предел  $l$  не существует по определению предела на языке последовательностей.

Итак,  $z_k = 1/(k\pi)$ ,  $k = \pm 1, \pm 2, \dots$  — существенно особые точки  $f(z)$ .

Так как  $z_k \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$ , то точка  $z = 0$  является предельной точкой для существенно особых точек.

Точка  $z = \infty$  является **существенно особой точкой** для  $f(z)$ , так как не существует предел

$$\lim_{z \rightarrow 0} \sin \left( \frac{1}{\sin \frac{1}{z}} \right).$$





Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Решение задачи 274.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Чтобы доказать это, рассмотрим две последовательности:

$$z_n^1 = \frac{1}{\arcsin \frac{1}{2\pi n}} \rightarrow \infty, \quad n \rightarrow \infty,$$

$$z_n^2 = \frac{1}{\arcsin \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}} \rightarrow \infty, \quad n \rightarrow \infty.$$

Тогда

$$f(z_n^1) = \sin 2\pi n = 0,$$

$$f(z_n^2) = \sin \left( \frac{\pi}{2} + 2\pi n \right) = 1.$$

Отсюда и следует нужное утверждение.

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 275.6

По условию

$$f(z) = \frac{1}{\sin z + \cos z}.$$

Конечными особыми точками являются корни уравнения:

$$\sin z + \cos z = 0. \quad (\text{P.4})$$

Так как  $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$  (доказать это самостоятельно), то одновременно  $\sin z$  и  $\cos z$  не могут обратиться в ноль.

Пусть  $\cos z \neq 0$  (аналогично рассматривается другой случай). Тогда разделим уравнение (P.4) на  $\cos z$ , получим:

$$\operatorname{tg} z = -1 \Leftrightarrow z = -\frac{\pi}{4} + n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, точки  $z_n = -\pi/4 + n\pi$ ,  $n \in \mathbb{Z}$  являются особыми точками  $f(z)$ . Это нули знаменателя  $f(z)$  кратности один (доказать это самостоятельно). Поэтому точки  $z_n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ , являются **полюсами  $f(z)$  первого порядка**. Но  $z_n \rightarrow +\infty$  при  $n \rightarrow +\infty$ . Поэтому  $z = \infty$  не является изолированной особой точкой, а является предельной точкой полюсов  $f(z)$ . [Вернуться к условию]



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 15. Вычисление вычетов



## Решение задачи 291.1

а) Используем стандартное разложение:

$$e^t = 1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!} + \dots$$

Полагая  $t = \frac{1}{z-i}$ , получаем

$$e^{\frac{1}{z-i}} = 1 + \frac{1}{1!} \frac{1}{z-i} + \frac{1}{2!} \frac{1}{(z-i)^2} + \dots + \frac{1}{n!} \frac{1}{(z-i)^n} + \dots$$

Значит,  $z_0 = i$  — **существенно особая точка** и

$$\operatorname{Res}_i e^{\frac{1}{z-i}} = c_{-1} = 1.$$

б) Учитывая эквивалентность  $e^{z^2} - 1 \sim z^2$  при  $z \rightarrow 0$ , получаем

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{z^2} - 1}{z^3 - z^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2}{z^2(z-1)} = -1.$$

Значит,  $z_0 = 0$  является **устранимой особой точкой**, поэтому

$$\operatorname{Res}_0 \frac{e^{z^2} - 1}{z^3 - z^2} = 0.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 292.1

Так как

$$\lim_{z \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{z}} = 1,$$

то  $z = \infty$  является **устранимой особой точкой**.

Для нахождения вычета можно действовать двумя способами.

*1-й способ.*

$$\operatorname{Res}_{\infty} f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} z^2 \left( e^{\frac{1}{z}} \right)' = - \lim_{z \rightarrow \infty} z^2 \frac{1}{z^2} e^{\frac{1}{z}} = -1.$$

*2-й способ.* Используя разложение в ряд Лорана в окрестности бесконечно удаленной точки

$$e^{\frac{1}{z}} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2! \cdot z^2} + \dots + \frac{1}{n! \cdot z^n} + \dots,$$

получаем

$$\operatorname{Res}_{\infty} f(z) = -c_{-1} = -1.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 15. Вычисление вычетов

Решение задачи 292.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 292.2

Точка  $z = \infty$  является существенно особой точкой для функции  $f(z) = \cos z$ . При этом

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2} + \dots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \dots,$$

т.е.  $c_{-1} = 0$ . Значит,

$$\operatorname{Res}_{\infty} f(z) = 0.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 293.1

а) Точка  $z = 1$  является **простым полюсом**. Тогда (см., [пример 6.3](#)),

$$\operatorname{Res}_1 f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{e^z}{z - 1} = \lim_{z \rightarrow 1} e^z = e.$$

б) Точка  $z = -1$  является **полюсом третьего порядка**. В этом случае по [теореме 6.2](#) имеем:

$$\operatorname{Res}_{-1} f(z) = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d^2}{dz^2} \left( (z + 1)^3 \frac{z^2}{(z + 1)^3} \right) = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow -1} (z^2)'' = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow -1} 2 = 1.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 294.1

Особыми точками данной функции будут  $z_1 = 1$  и  $z_2 = 0$ .

Точка  $z_1 = 1$  является **простым полюсом**. Тогда (см., [пример 6.3](#)),

$$\operatorname{Res}_1 f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{z + 1}{z^2(z - 1)} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z + 1}{z^2} = 2.$$

Точка  $z_2 = 0$  является **полюсом третьего порядка**. В этом случае по [теореме 6.2](#) имеем:

$$\operatorname{Res}_0 f(z) = \left( \frac{z + 1}{z - 1} \right)' \Big|_{z=0} = \frac{z - 1 - (z + 1)}{(z - 1)^2} \Big|_{z=0} = -2.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Решение задачи 299.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 299.1

Подынтегральная функция  $f(z) = 1/((z-1)^2(z^2+1))$  имеет три **особые точки**:  $z_1 = 1$  — **полюс второго порядка**,  $z_2 = i$  и  $z_3 = -i$  — **простые полюсы**. Внутри контура интегрирования находятся  $z_1$  и  $z_2$ , **причем**

$$\operatorname{Res}_1 f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \left( \frac{1}{z^2 + 1} \right)' = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{-2z}{(z^2 + 1)^2} = -\frac{1}{2},$$

а

$$\operatorname{Res}_i f(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{(z-1)^2(z+i)} = \frac{1}{2i(i-1)^2} = \frac{1}{4}.$$

По **теореме Коши о вычетах**,

$$\int_L \frac{dz}{(z-1)^2(z^2+1)} = 2\pi i (\operatorname{Res}_1 f(z) + \operatorname{Res}_i f(z)) = 2\pi i \left( -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) = -\frac{\pi i}{2}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 300.1

Подынтегральная функция  $f(z) = \operatorname{ch} z / ((z + 1)^3(z - 1))$  внутри контура интегрирования имеет две особые точки:  $z_1 = 1$  — простой полюс и  $z_2 = -1$  — полюс третьего порядка. Найдем вычеты в этих точках:

$$\operatorname{Res}_1 f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\operatorname{ch} z dz}{(z + 1)^3} = \frac{\operatorname{ch} 1}{8},$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{-1} f(z) &= \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d^2}{dz^2} \left( \frac{\operatorname{ch} z}{z - 1} \right) = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d}{dz} \left( \frac{(z - 1) \operatorname{sh} z - \operatorname{ch} z}{(z - 1)^2} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow -1} \frac{(z - 1)^2 \operatorname{ch} z - 2(z - 1) \operatorname{sh} z + 2 \operatorname{ch} z}{(z - 1)^3} = \frac{2 \operatorname{sh} 1 - 3 \operatorname{ch} 1}{8}. \end{aligned}$$

Поэтому,

$$\int_{|z|=2} \frac{\operatorname{ch} z dz}{(z + 1)^3(z - 1)} = 2\pi i \left( \frac{2 \operatorname{sh} 1 - 3 \operatorname{ch} 1}{8} + \frac{\operatorname{ch} 1}{8} \right) = -\frac{\pi i}{2e}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 301.1

Воспользуемся **теоремой о полной сумме вычетов**. Так как все **конечные особые точки** подынтегральной функции  $f(z) = z/((z^2 + 1)(z - 1))$  лежат внутри окружности  $|z| = 2$ , вычислим интеграл через вычет в бесконечно удаленной точке. Разложим  $f(z)$  в **ряд Лорана в окрестности точки  $z = \infty$**  (разделив «углом» числитель на знаменатель, нетрудно получить несколько первых членов ряда):

$$f(z) = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \dots$$

Очевидно, что  $c_{-1} = 0$ , поэтому

$$\operatorname{Res}_{\infty} f(z) = 0.$$

Окончательно,

$$\int_{|z|=2} \frac{z dz}{(z^2 + 1)(z - 1)} = -2\pi i \operatorname{Res}_{\infty} f(z) = 0.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 17. Вычисление определенных интегралов



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 17. Вычисление определенных интегралов



## Решение задачи 304.1

Рассуждая описанным выше образом, получаем

$$\int_0^{2\pi} \cos(e^{i\varphi}) d\varphi = \left. \begin{array}{l} e^{i\varphi} = z, \\ i e^{i\varphi} d\varphi = dz, \\ d\varphi = \frac{dz}{iz} \end{array} \right| = \int_{|z|=1} \frac{\cos z}{iz} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_0 \frac{\cos z}{iz} = 2\pi.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 304.2

Сделаем замену  $z = e^{2i\varphi}$ . Когда  $\varphi$  изменяется от 0 до  $\pi$ ,  $z$  пробегает окружность  $|z| = 1$  в положительном направлении. Несложно видеть, что

$$2i\varphi = \ln z, \quad d\varphi = \frac{1}{2i} \frac{dz}{z}.$$

Тогда

$$\operatorname{tg}(\varphi + i) = \frac{1}{i} \frac{e^{i(\varphi+i)} - e^{i(\varphi+i)}}{e^{i(\varphi+i)} + e^{i(\varphi+i)}} = \frac{1}{i} \frac{e^{i\varphi} e^{-1} - e^{i\varphi} e}{e^{i\varphi} e^{-1} + e^{i\varphi} e} = \frac{1}{i} \frac{\frac{\sqrt{z}}{e} - \frac{e}{\sqrt{z}}}{\frac{\sqrt{z}}{e} + \frac{e}{\sqrt{z}}} = \frac{1}{i} \frac{z - e^2}{z + e^2}.$$

Поэтому данный интеграл примет вид:

$$\frac{1}{2i^2} \int_{|z|=1} \frac{z - e^2}{z + e^2} \frac{dz}{z} = I.$$

**Особые точки** подынтегральной функции  $z_1 = 0$  и  $z_2 = -e^2$  являются **простыми полюсами**. В круге  $|z| < 1$  лежит только  $z_1$ , причем **вычет**

$$\operatorname{Res}_0 \frac{z - e^2}{z + e^2} \frac{1}{z} = -1.$$

Окончательно,

$$I = 2\pi i \frac{1}{2i^2} (-1) = \pi i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 305.1

Заменим  $z = e^{ix}$ . Тогда

$$dz = \frac{dz}{iz}, \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}.$$

Интегрирование по отрезку  $[0, 2\pi]$  сведется к интегрированию по окружности  $|z| = 1$ ,

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 x}{13 + 12 \cos x} dx = \frac{1}{4i} \int_{|z|=1} \frac{(z^2 + 1)^2 dz}{z^2(6z^2 + 13z + 6)} = I.$$

Особые точки подынтегральной функции:  $z_1 = 0$  — полюс второго порядка,  $z_2 = -2/3$  и  $z_3 = -3/2$  простые полюсы. Внутри контура интегрирования лежат только  $z_1$  и  $z_2$ . При этом

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_0 \frac{(z^2 + 1)^2}{z^2(6z^2 + 13z + 6)} &= \lim_{z \rightarrow 0} \left( \frac{(z^2 + 1)^2 dz}{6z^2 + 13z + 6} \right)' = -\frac{13}{36}, \\ \operatorname{Res}_{-\frac{2}{3}} \frac{(z^2 + 1)^2}{z^2(6z^2 + 13z + 6)} &= \left( \frac{\left( \frac{z^2 + 1}{z} \right)^2}{12z + 13} \right) \Bigg|_{z = -\frac{2}{3}} = \frac{163}{180}. \end{aligned}$$

Поэтому, по теореме Коши о вычетах,

$$I = \frac{2\pi i}{4i} \left( \frac{163}{180} - \frac{13}{36} \right) = \frac{13\pi}{45}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





## Решение задачи 305.5

Преобразуем,

$$\sin^2 x = \left( \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^2 = -\frac{1}{4}(e^{2ix} - 2 + e^{-2ix}).$$

Теперь сделаем замену  $z = e^{2ix}$ ,  $dx = dz/(2iz)$ . При этом промежуток интегрирования переходит в окружность  $|z| = 1$ , которая пробегается дважды. Поэтому,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dx}{(1 + \sin^2 x)^2} &= 2 \int_{|z|=1} \frac{dz}{2iz \left(1 - \frac{1}{4}z + \frac{1}{2} - \frac{1}{4z}\right)^2} = \\ &= \frac{16}{i} \int_{|z|=1} \frac{z dz}{(6z - z^2 - 1)^2} = \frac{16}{i} \int_{|z|=1} \frac{z dz}{(z - z_1)^2(z - z_2)^2} = I, \end{aligned}$$

где  $z_1 = 3 - 2\sqrt{2}$ ,  $z_2 = 3 + 2\sqrt{2}$  — корни квадратного трехчлена  $z^2 - 6z + 1$ . Так как  $|z_1| < 1$ , а  $|z_2| > 1$ , то

$$\begin{aligned} I &= 32\pi \operatorname{Res}_{z_1} \frac{z}{(z - z_1)^2(z - z_2)^2} = 32\pi \lim_{z \rightarrow z_1} \left( \frac{z}{(z - z_2)^2} \right)' = \\ &= 32\pi \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{(z - z_2)^2 - 2z(z - z_2)}{(z - z_2)^4} = 32\pi \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{z + z_2}{(z - z_2)^3} = \frac{3\pi}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

Указание к задаче 306.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Указание к задаче 306.1

Так как период подынтегральной функции равен  $\pi$ , то

$$\int_0^{\pi} \varphi(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \varphi(x) dx.$$

Далее можно воспользоваться заменой  $z = e^{ix-7}$ ..

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи  
Решения и указания

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 18. Вычисление несобственных интегралов



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Решение задачи 310.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 310.5

**Особые точки** подынтегральной функции:  $z_{1,2} = \pm i$  — **простые полюсы**. Замыкая контур интегрирования в верхнюю полуплоскость, получаем

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2\pi i \operatorname{Res}_i \frac{1}{1+z^2} = 2\pi i \left. \frac{1}{2z} \right|_{z=i} = \pi.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 310.6

Особые точки подынтегральной функции:  $z_1 = -2i$  — полюс второго порядка и  $z_2 = i$  — полюс пятого порядка. Естественно, искать вычет в полюсе второго порядка легче. Поэтому, перейдем при интегрировании перейдем в нижнюю полуплоскость:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{(x+2i)^2(x-i)^5} &= -2\pi i \operatorname{Res}_{z=-2i} \frac{z}{(z+2i)^2(z-i)^5} = -2\pi i \left( \frac{z}{(z-i)^5} \right)' \Big|_{z=-2i} = \\ &= -2\pi i \left( \frac{(z-i)^5 - 5z(z-i)^4}{(z-i)^{10}} \right)' \Big|_{z=-2i} = -2\pi i \left( \frac{z-i-5z}{(z-i)^6} \right)' \Big|_{z=-2i} = -\frac{14\pi}{3^6}. \end{aligned}$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Решение задачи 310.7

В силу четности подынтегральной функции

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1}.$$

Из четырех **особых точек** подынтегральной функции  $z_{1,2} = e^{\pm i \frac{\pi}{4}}$  и  $z_{3,4} = e^{\pm i \frac{3\pi}{4}}$  — **простых полюсов** — две,  $z_1 = e^{i \frac{\pi}{4}}$  и  $z_3 = e^{i \frac{3\pi}{4}}$  лежат в верхней полуплоскости. Тогда,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1} &= \frac{1}{2} 2\pi i \left( \operatorname{Res}_{z_1} \frac{z^2}{z^4 + 1} + \operatorname{Res}_{z_3} \frac{z^2}{z^4 + 1} \right) = \pi i \left( \frac{z^2}{4z^3} \Big|_{z=e^{i \frac{\pi}{4}}} + \frac{z^2}{4z^3} \Big|_{z=e^{i \frac{3\pi}{4}}} \right) = \\ &= \frac{\pi i}{4} \left( e^{-i \frac{\pi}{4}} + e^{-i \frac{3\pi}{4}} \right) = \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\pi\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Решение задачи 311.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 311.1

В силу четности функции  $1/(x^2 + 9)$  воспользуемся **формулой (18.1)**. В верхней полуплоскости расположена одна **особая точка** функции  $f(z) = 1/(z^2 + 9)$ :  $3i$  — **простой полюс**. Тогда

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos 4x}{x^2 + 9} dx = \pi i \operatorname{Res}_{3i} \frac{e^{4iz}}{z^2 + 9} = \pi i \frac{e^{4iz}}{z + 3i} \Big|_{z=3i} = \pi i \frac{e^{-12}}{6i} = \frac{\pi}{6 e^{12}}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Решения и указания

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Решение задачи 311.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Решение задачи 311.2

В силу нечетности функции  $x/(x^2 + 9)$  воспользуемся **формулой (18.2)**. В верхней полуплоскости расположена одна **особая точка** функции  $f(z) = 1/(z^2 + 9)$ :  $3i$  — **простой полюс**. Тогда

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin 4x}{x^2 + 9} dx = \pi \operatorname{Res}_{3i} \frac{z e^{4iz}}{z^2 + 9} = \pi \left. \frac{z e^{4iz}}{z + 3i} \right|_{z=3i} = \pi \frac{3i e^{-12}}{6i} = \frac{\pi}{2 e^{12}}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





## Решение задачи 311.3

Сложность при вычислении данного интеграла заключается в том, что функция  $f(z) = 1/z$  имеет на действительной оси особую точку  $z = 0$ .

Рассмотри контур  $L$ , состоящий из двух полуокружностей  $L_1$  и  $L_2$ , лежащих в верхней полуплоскости, с центрами в начале координат и радиусами  $R$  и  $r$  соответственно и двух отрезков  $[R, r]$  и  $[r, R]$  (см. рис. P.19). Полагаем также, что контур  $L$  обходится в положительном направлении.




Рис. P.19

По [интегральной теореме Коши](#)

$$\int_L \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$$

или

$$\int_{L_1} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx - \int_{L_2} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx = 0.$$



Вычислим интегралы в левой части последнего равенства при  $r \rightarrow 0$  и  $R \rightarrow \infty$ . Во-первых, повторяя рассуждения леммы Жордана, получаем

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{L_1} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

Во-вторых, для интеграла по  $L_2$  сделаем замену:  $z = r e^{i\varphi}$ ,  $dz = ri e^{i\varphi} d\varphi$ ,  $0 \leq \varphi \leq \pi$ . Тогда

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{L_2} \frac{e^{iz}}{z} dz = \lim_{r \rightarrow 0} \int_{\pi}^0 e^{ir} (\cos \varphi + i \sin \varphi) \frac{ri e^{i\varphi} d\varphi}{r e^{i\varphi}} = i \lim_{r \rightarrow 0} \int_{\pi}^0 e^{ir} (\cos \varphi + i \sin \varphi) d\varphi = i \int_{\pi}^0 d\varphi = -\pi i.$$

В-третьих,

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ R \rightarrow +\infty}} \left( \int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx \right) &= \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ R \rightarrow +\infty}} \left( - \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx \right) = \\ &= \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ R \rightarrow +\infty}} \left( \int_r^R \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx \right) = 2i \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx. \end{aligned}$$

Учитывая полученные равенства, заключаем

$$-\pi i + 2i \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = 0,$$

т.е.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$



## Решение задачи 311.4

Точки  $-2 \pm 4i$  являются особыми для функции  $f(z) = z e^{iz} / (z^2 + 4z + 20)$ . В верхней плоскости лежит  $-2 + 4i$  — простой полюс. Вычет в ней

$$\operatorname{Res}_{-2+4i} f(z) = \left. \frac{z e^{iz}}{z + 2 + 4i} \right|_{z=-2+4i} = \frac{2+i}{4} e^{-4-2i}.$$

В последнем равенстве выделим действительную часть

$$\operatorname{Re} \operatorname{Res}_{-2+4i} f(z) = \frac{2 \cos 2 + \sin 2}{4} e^{-4}.$$

Окончательно,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 4x + 20} dx = 2\pi \operatorname{Re} \operatorname{Res}_{-2+4i} f(z) = \pi \frac{2 \cos 2 + \sin 2}{2} e^{-4}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

# ОТВЕТЫ



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 1. Комплексные числа и действия над ними



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 1.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 1.1

$2, 2, -i, 0.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 1.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 1.2

2, 2,  $i$ , 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 1.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 1.3

$3 - i, 4 - 3i, -i, 0.$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 1.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 1.4

$1 + 2i, -1 + i, 1 - i, -1 + 2i.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 1.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 1.5

$1, 1 + i, -1 - i, -1 - 2i.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 1.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 1.6

$2, 10, -4/5 - 3/5i, -16.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 2.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 2.1

$\sqrt{2}, \pi/4, \sqrt{2}, -\pi/4, \sqrt{2}, 3\pi/4, \sqrt{2}, -3\pi/4.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 2.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 2.2

$2, \pi/3, 2, -\pi/3, 2, 2\pi/3, 2, -2\pi/3.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 2.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 2.3

$2, \pi/6, 2, -\pi/6, 2, 5\pi/6, 2, -5\pi/6.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 2.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 2.4

$1, \pi/2, 1, -\pi/2, 1, \pi/2, 1, -\pi/2.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 2.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 2.5

1, 0, 1, 0, 1,  $\pi$ , 1,  $\pi$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 2.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 2.6

$1, -\pi/4, 1, \pi/4, 1, -3\pi/4, 1, 3\pi/4.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 3.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 3.1

$$2e^{-\pi i/4}, 64i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 3.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 3.2

$2e^{-\pi i/3}$ , 64.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 3.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 3.3

$2e^{\pi i/6}, -64.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 3.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 3.4

$$\sqrt{2}e^{3\pi i/4}, 8i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 3.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 3.5

$e^{-\pi i/2}, -1.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 3.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 3.6

$e^{\pi i/2}, -1.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 4.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 4.1

$1, i, -1, -i.$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 4.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 4.2

$\sqrt{3}/2 - i/2, i, -\sqrt{3}/2 - i/2.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 4.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 4.3

$1/2 + i\sqrt{3}/2, -1, 1/2 - i\sqrt{3}/2.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 4.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 4.4

$\sqrt{2}/2(1 + i), \sqrt{2}/2(-1 + i), \sqrt{2}/2(-1 - i), \sqrt{2}/2(1 - i).$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 4.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 4.5

$$\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i, -2i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 4.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 4.6

$$\sqrt{6}/2 + i\sqrt{2}/2, -\sqrt{6}/2 - i\sqrt{2}/2.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 5.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 5.1

$0, -i, i.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 5.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 5.2

$4 + 3i$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 5.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 5.3

$$-1/3 - 2/3i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 5.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 5.4

$-1 - i, 2 - i.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 5.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 5.5

$$-1 + 3/2i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 5.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 5.6

0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 7.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 7.1

Окружность  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 7.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 7.2

Отрезок с концами в точках  $z_1 = 0$ ,  $z_2 = 4 + 8i$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 7.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 7.3

Гипербола  $y = 1/x$ ,  $x > 0$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 7.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 7.4

Парабола  $y = x^2$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 7.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 7.5

$$-1 + 3/2i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 1. Комплексные числа и действия над ними

Ответ к задаче 7.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 7.6

Полуокружность  $x^2 + y^2 = 1, y \geq 0$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 2. Элементарные трансцендентные функции



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 29.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 29.1

$$i(\pi + 2k\pi), e^{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi}, k \in \mathbb{Z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 29.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 29.2

$$i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), e^{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}, k \in \mathbb{Z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 29.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 29.3

$$\ln \sqrt{2} + i \left( \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right), e^{-\pi + 2k\pi}, k \in \mathbb{Z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 29.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 29.4

$$\ln \sqrt{2} + i \left( -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right), e^{2k\pi}, k \in \mathbb{Z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 29.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 29.5

$$\ln \sqrt{2} + i \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right), e^{-\frac{\pi}{3} + 2k\pi + i \ln \sqrt{2}}, k \in \mathbb{Z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 29.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 29.6

$$i\left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), e^{(-1+i)\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)}, k \in \mathbb{Z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 30.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 30.1

А)  $-2xy$ ,  $x^2 - y^2$ ; б)  $\cos x \operatorname{ch} y$ ,  $-\sin x \operatorname{sh} y$ ; в)  $e^{-\arg z} \cos(\ln |z|)$ ,  $e^{-\arg z} \sin(\ln |z|)$ ,  $\arg z \in (-\pi, \pi]$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 30.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 30.2

А)  $\frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + (y - 1)^2}, \frac{2x}{x^2 + (y - 1)^2}$ ; б)  $\cos y \operatorname{sh} x, \sin y \operatorname{ch} x$ ; в)  $e^{-\frac{\pi}{2}y} \cos \frac{\pi x}{2}, e^{-\frac{\pi}{2}y} \sin \frac{\pi x}{2}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 30.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 30.3

А)  $y^2 - x^2 - 2x$ ,  $-2xy + 2y$ ; б)  $\cos y \operatorname{ch} x$ ,  $\sin y \operatorname{sh} x$ ; в)  $e^{-\pi y} \cos \pi x$ ,  $e^{-\pi y} \sin \pi x$ . [[Вернуться к условию](#)]



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 30.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 30.4

А)  $\frac{x}{x^2 + y^2} + x$ ,  $\frac{-y}{x^2 + y^2} + y$ ; б)  $-\sin y \operatorname{ch} x$ ,  $\cos y \operatorname{sh} x$ ; в)  $e^{-\frac{\pi}{4}x} \cos \frac{\pi y}{4}$ ,  $e^{-\frac{\pi}{4}x} \sin \frac{\pi y}{4}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 30.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 30.5

А)  $x^2 + y^2 - y$ ,  $x$ ; б)  $-\cos x \operatorname{sh} y$ ,  $\sin x \operatorname{ch} y$ ; в)  $e^{\frac{\pi}{4}y} \cos \frac{\pi x}{4}$ ,  $-e^{\frac{\pi}{4}y} \sin \frac{\pi x}{4}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 30.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 30.6

А)  $\frac{x^2 + y^2 + x}{(x + 1)^2 + y^2}, \frac{y}{(x + 1)^2 + y^2};$  б)  $-\cos x \operatorname{sh} y, \sin x \operatorname{ch} y;$  в)  $e^{\ln|z| - \arg z} \cos(\arg z + \ln|z|),$   
 $e^{\ln|z| - \arg z} \sin(\arg z + \ln|z|), \arg z \in (-\pi, \pi].$  [\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 32.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 32.1

$$2k\pi - i \ln(\sqrt{2} - 1), \pi + 2k\pi - i \ln(\sqrt{2} + 1), k \in \mathbb{Z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 32.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 32.2

$$\pm \frac{\pi}{2} + 2k\pi \pm i \ln(\sqrt{2} \pm 1).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 32.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 32.3

$$2k\pi \pm i \ln(2 + \sqrt{3}).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 32.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 32.4

$$i \left( \frac{\pi}{4} + k\pi \right).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 32.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 32.5

$$\ln(\sqrt{5} \pm 2) + i\pi \left(2k \pm \frac{1}{2}\right).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 32.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 32.6

$$\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 33.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 33.1

$$2k\pi \pm i \ln(2 + \sqrt{3}).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 33.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 33.2

$$\frac{\pi}{4} + 2k\pi - i \ln(\sqrt{2} \pm 1).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 33.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 33.3

$$2k\pi - i \ln(\sqrt{2} - 1), (2k + 1)\pi - i \ln(\sqrt{2} + 1).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 33.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 33.4

$$\frac{1}{2} \left( \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + (2k + 1)\pi \right) + \frac{i}{4} \ln 5.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 33.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 33.5

$$i \left( \frac{\pi}{4} + k\pi \right).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 33.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 33.6

$$2k\pi \pm \frac{\pi}{3}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 33.7



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 33.7

$$2k\pi \pm i \ln(2 + \sqrt{3}).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 2. Элементарные трансцендентные функции

Ответ к задаче 33.8



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 33.8

$$i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 3. Функции комплексного переменного



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 51.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 51.1

Нет.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 51.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 51.2

Нет.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 51.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 51.3

Нет.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 51.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 51.4

Да, 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 51.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 51.5

Нет.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 51.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 51.6

Да, 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 53.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 53.1

А)  $z = 0$ , б)  $\emptyset$ , в)  $w'(0) = 0$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 53.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 53.2

А)  $z = x + ix$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , б)  $\emptyset$ , в)  $w'(z) = 2z$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 53.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 53.3

А)  $z = 0$ , б)  $\emptyset$ , в)  $w'(0) = 0$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 53.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 53.4

А)  $\forall z \in \mathbb{C}$ , б)  $\forall z \in \mathbb{C}$ , в)  $w'(z) = 3x^2 - 3y^2 + i6xy$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 53.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 53.5

А)  $z = 0$ , б)  $\emptyset$ , в)  $w'(0) = 0$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 53.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 53.6

А)  $z = 0$ , б)  $\emptyset$ , в)  $w'(0) = 1$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 54.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 54.1

$$a = -b, c = 1.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 54.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 54.2

$$c = 2a = -2b.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 54.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 54.3

$$a = -2b = -2c.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 54.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 54.4

$$a = c, b = -1.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 54.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 54.5

$$c = 2b = -2a.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 54.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 54.6

$$a = -c, b = 1.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 56.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 56.1

Нет.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 56.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 56.2

Да.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 56.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 56.3

Да.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 56.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 56.4

Да.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 56.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 56.5

Да.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 56.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 56.6

Да.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 57.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 57.1

$$f(z) = e^{iz}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 57.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 57.2

$$f(z) = ie^{iz}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 57.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 57.3

$$f(z) = i(z^2 - z).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 57.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 57.4

$$f(z) = \frac{i}{z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 57.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 57.5

$$f(z) = \sin z.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 57.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 57.6

$$f(z) = \operatorname{ch} z.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 66.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 66.1

Да,  $u = axy + b$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 66.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 66.2

Да,  $u = \alpha(ax + by) + \beta$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 66.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 66.3

Не существует.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 66.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 66.4

Да,  $u = a \arctg \frac{x}{y} + b$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 66.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 66.5

Да,  $u = a \ln(x^2 + y^2) + b$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 3. Функции комплексного переменного

Ответ к задаче 66.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 66.6

Да,  $u = \frac{ax}{x^2 + y^2} + b$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 76.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 76.1

$k = 3, \varphi = 0.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 76.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 76.2

$$k = 3, \varphi = \pi.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 76.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 76.3

$$k = 6, \varphi = \pi/2.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 76.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 76.4

$$k = 6, \varphi = -\pi/2.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 76.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 76.5

$$k = 6, \varphi = -\pi/2.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 76.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 76.6

$$k = 6, \varphi = \pi/2.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 77.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 77.1

$$k = 2\sqrt{2}, \varphi = -\pi/4.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 77.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 77.2

$k = 2, \varphi = 0.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 77.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 77.3

$$k = \sqrt{2}/2, \varphi = -\pi/4.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 77.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 77.4

$k = 1, \varphi = \pi.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 77.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 77.5

$k = \text{ch } 2, \varphi = 0.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 77.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 77.6

$$k = 4, \varphi = -\pi/2.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 78.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 78.1

$|z| < 1/\sqrt[3]{4}$  сжимается,  $|z| > 1/\sqrt[3]{4}$  растягивается.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 78.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 78.2

$(x - 1/2)^2 + y^2 < 1/4$  сжимается,  $(x - 1/2)^2 + y^2 > 1/4$  растягивается.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 78.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 78.3

$|z| > 1$  сжимается,  $|z| < 1$  растягивается.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 78.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 78.4

$|\operatorname{Re} z| < 1$  сжимается,  $|\operatorname{Re} z| > 1$  растягивается.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 78.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 78.5

$|z| > 1$  сжимается,  $|z| < 1$  растягивается.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 78.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 78.6

$|z - 1| > 1$  сжимается,  $|z - 1| < 1$  растягивается.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 79.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 79.1

$$|z| = 1/2.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 79.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 79.2

$$|z + 1| = 1/2.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 79.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 79.3

$$|z| = 1.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 79.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 79.4

$$|z - i| = \sqrt{2}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 79.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 79.5

$\operatorname{Re} z = 0$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 79.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 79.6

$$|z - 3| = 1/2.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 80.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 80.1

$\arg z = \pi$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 80.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 80.2

$$\arg z = -\pi/4.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 80.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 80.3

$\operatorname{Re} z > 0$  и  $\operatorname{Im} z = 1/2$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 80.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 80.4

$\operatorname{Re} z > 4$  и  $\operatorname{Im} z = 2$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 80.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 80.5

$\operatorname{Im} z = 0$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 80.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 80.6

$\operatorname{Re} z > 0$  и  $\operatorname{Im} z = 0$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 81.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 81.1

$\pi/4$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 81.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 81.2

$\pi/2$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 81.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 81.3

$\pi/2$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 81.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 81.4

$\pi/4$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 81.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 81.5

$\pi/4$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Ответ к задаче 81.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 81.6

0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 5. Линейная функция



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 94.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 94.1

$\tau = iz$  — поворот на угол  $\pi/2$ ,  $w = \tau + i$  — параллельный перенос.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 94.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 94.2

$\tau = -iz$  — поворот на угол  $-\pi/2$ ,  $w = \tau - 1 + i$  — параллельный перенос.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 94.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 94.3

$\tau = \sqrt{2}z$  — растяжение,  $\xi = e^{i\frac{\pi}{4}}\tau$  — поворот на угол  $\pi/4$ ,  $w = \xi + 1$  — параллельный перенос.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 94.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 94.4

$\tau = \sqrt{2}z$  — растяжение,  $\xi = e^{-i\frac{\pi}{4}}\tau$  — поворот на угол  $-\pi/4$ ,  $w = \xi - i$  — параллельный перенос.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 94.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 94.5

$\tau = e^{i\frac{\pi}{6}}z$  — поворот на угол  $\pi/6$ ,  $w = \tau - 1$  — параллельный перенос.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 94.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 94.6

$\tau = \sqrt{2}z$  — растяжение,  $\xi = e^{-i\frac{3\pi}{4}}\tau$  — поворот на угол  $-3\pi/4$ ,  $w = \xi + 1$  — параллельный перенос.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 95.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 95.1

$$w = -\frac{iz}{2} + 4i - 1.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 95.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 95.2

$$w = -(1 + i)z + 4(1 + i).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 95.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 95.3

$$w = -\frac{iz}{2} + i\frac{7}{2} - 1.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 95.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 95.4

$$w = (1 + i)z + 6(1 + i).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 95.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 95.5

$$w = -\frac{iz}{2} + i\frac{5}{2} - 1.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 95.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 95.6

$$w = -(1 + i)z + 1 + i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 96.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 96.1

$$w = (2 + i)z + 2 - 6i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 96.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 96.2

$$w = -z.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 96.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 96.3

$$w = (1 - i)z + i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 96.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 96.4

$$w = \frac{1}{2}z + \frac{i}{2}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 96.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 96.5

$$w = iz - 1 - i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 96.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 96.6

$$w = -iz - 1 - i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 97.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 97.1

$$z^* = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i, \varphi = 0, k = 3.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 97.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 97.2

Нет неподвижной точки.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 97.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 97.3

$$z^* = \frac{1}{10} + \frac{3}{10}i, \varphi = \frac{\pi}{2}, k = 3.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 97.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 97.4

$$z^* = -\frac{3}{2}i, \varphi = 0, k = 3.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 97.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 97.5

$$z^* = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}i, \varphi = \pi, k = 3.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 97.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 97.6

Нет неподвижной точки.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 98.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 98.1

$$w = 3e^{i\frac{\pi}{4}}z + 6 + 3i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 98.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 98.2

$$w = 3e^{-i\frac{\pi}{4}}z + 6 + 3i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 98.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 98.3

$$w = 3e^{i\frac{\pi}{3}}z + 6 + 3i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 98.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 98.4

$$w = 3e^{-i\frac{\pi}{3}}z + 6 + 3i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 98.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 98.5

$$w = 3e^{i\frac{\pi}{6}}z + 6 + 3i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 98.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 98.6

$$w = 3e^{-i\frac{\pi}{6}}z + 6 + 3i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 99.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 99.1

$$w = \frac{6 - z}{2} + i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 99.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 99.2

$$w = \frac{8 - z}{4} + i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 99.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 99.3

$$w = \frac{10 - z}{6} + i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 99.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 99.4

$$w = \frac{7-z}{2} + i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 99.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 99.5

$$w = \frac{9 - z}{4} + i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 99.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 99.6

$$w = \frac{11 - z}{6} + \frac{i}{2}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 105.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 105.1

$$w = z + b, w = -z + b - 4i, b \in \mathbb{R}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 105.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 105.2

$$w = z + bi, w = -z + 3 + bi, b \in \mathbb{R}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 105.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 105.3

$$w = az + bi, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad a > 0.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 105.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 105.4

$w = -i(az + b)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a > 0$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 105.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 105.5

$$w = az + bi, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad a > 0.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 105.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 105.6

$$w = i(az + b), \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad a > 0.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 105.7



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 105.7

$$w = -az + b, a, b \in \mathbb{R}, a > 0.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 105.8



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 105.8

$w = az + b$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a > 0$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 107



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 107

Квадрат с центром в точке  $-3$  и сторонами, параллельными осям координат. [[Вернуться к условию](#)]



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 108



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 108

$$w = \pm z + b(1 + i), \quad b \in \mathbb{R}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 111

$$w = 2iz + 4.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 112

Полоса  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 115



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 115

Полоса  $0 < \operatorname{Re} w < 1$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 5. Линейная функция

Ответ к задаче 117



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 117

$$w = e^{i\alpha} z, \alpha \in \mathbb{R}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 6. Дробно-линейная функция



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 118.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 118.1

Окружность  $u^2 + v^2 + 5v = 0$ , где  $w = u + iv$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 118.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 118.2

$$\left\{ w : \arg w = -\frac{\pi}{7} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 118.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 118.3

$$\left\{ w : \left| w - \frac{1}{12} \right| > \frac{1}{12}, \operatorname{Re} w > 0 \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 118.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 118.4

Окружность  $u^2 + \left(v + \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$ , где  $w = u + iv$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 118.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 118.5

$$\left\{ w : \operatorname{Im} w = -\frac{1}{6} \operatorname{Re} w \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 118.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 118.6

$$\{w : \operatorname{Im} w < 0\} \setminus \left\{w : |w| < \frac{1}{2}\right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 119.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 119.1

$$w = \frac{1-i}{2}(z+1).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 119.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 119.2

$$w = \frac{z(-1+i) - 1 + 3i}{z(-1+i) + 1 + i}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 119.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 119.3

$$w = \frac{3iz + 9i + 18}{z + 3}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 119.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 119.4

$$w = \frac{(1 + 2i)z + 6 - 3i}{5(z - i)}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 119.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 119.5

$$w = \frac{iz + 2 + i}{z + 1}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 119.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 119.6

$$w = (1 + i)z - 1.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 120.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 120.1

$\{w : |w| < 1\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 120.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 120.2

$\{w : \operatorname{Re} w > 0\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 120.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 120.3

$\{w : |w| < 1\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 120.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 120.4

$\{w : |w| < 1\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 120.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 120.5

$\{w : \operatorname{Im} w < 0\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 120.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 120.6

$\{w : |w| < 1\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 121.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 121.1

$\{w : |w| < 1, \operatorname{Im} w < 0\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 121.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 121.2

$\{w : |w| < 1, \operatorname{Re} w < 0\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 121.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 121.3

Область, ограниченная касающимися друг друга окружностями  $\left|w - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$  и  $\left|w - \frac{3}{4}\right| = \frac{1}{4}$ .  
[Вернуться к условию]



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 121.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 121.4

Область, ограниченная прямой  $\operatorname{Re} w = 1$  и касающейся ее окружностью  $\left| w - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}$ .  
[Вернуться к условию]





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 121.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 121.5

$$\{w : \operatorname{Im} w < 0\} \setminus \left\{ w : \left| w - \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \right| < \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 121.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 121.6

Двусвязная область, граница которой состоит из прямой  $\left\{ w : \operatorname{Re} w = \frac{1}{2} \right\}$  и окружности  $\left| w - \frac{4}{3} \right| = \frac{2}{3}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 122.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 122.1

$\{z : |z| = 2\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 122.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 122.2

$$\left\{ z : \operatorname{Re} z = \frac{1}{2} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 122.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 122.3

$$\left\{ z : \operatorname{Im} z = \frac{1}{2} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 122.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 122.4

$$\{z : |z - 2| = \sqrt{3}\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 122.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 122.5

$$\left\{ z : \left| z - \frac{i}{4} \right| = \frac{1}{4} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 6. Дробно-линейная функция

Ответ к задаче 122.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 122.6

$$\left\{ z : \left| z - \frac{1}{4} \right| = \frac{1}{4} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 7. Функция Жуковского



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 139.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 139.1

Гипербола  $\frac{u^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} - \frac{v^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 1$  в комплексной плоскости  $w = u + iv$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 139.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 139.2

$\{w : \operatorname{Re} w = 0\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 139.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 139.3

$\{w : \operatorname{Re} w \leq 1, \operatorname{Im} w = 0\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 139.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 139.4

Эллипс  $\frac{4u^2}{\left(R + \frac{1}{R}\right)^2} + \frac{4v^2}{\left(R - \frac{1}{R}\right)^2} = 1$  в комплексной плоскости  $w = u + iv$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 139.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 139.5

Эллипс  $\frac{4u^2}{\left(R + \frac{1}{R}\right)^2} + \frac{4v^2}{\left(R - \frac{1}{R}\right)^2} = 1$  в комплексной плоскости  $w = u + iv$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 139.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 139.6

Отрезок  $\{w : \operatorname{Im} w = 0, -1 \leq \operatorname{Re} w \leq 1\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 140.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 140.1

Внешность эллипса  $\frac{4u^2}{\left(\frac{5}{2}\right)^2} + \frac{4v^2}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} = 1$  в комплексной плоскости  $w = u + iv$ . [\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 140.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 140.2

Внешность эллипса  $\frac{4u^2}{\left(\frac{5}{2}\right)^2} + \frac{4v^2}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} = 1$  в комплексной плоскости  $w = u + iv$ . [\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 140.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 140.3

$$\mathbb{C} \setminus \{w : w \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 140.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 140.4

$$\mathbb{C} \setminus \{w : w \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 140.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 140.5

$\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 140.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 140.6

$\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 141.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 141.1

$\{w : \operatorname{Re} w > 0\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 141.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 141.2

$\{w : \operatorname{Re} w < 0\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 141.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 141.3

$\{w : \operatorname{Re} w > 0\}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 141.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 141.4

Верхняя половина внутренности эллипса  $\frac{4u^2}{(R + \frac{1}{R})^2} + \frac{4v^2}{(R - \frac{1}{R})^2} = 1$  комплексной плоскости  $w = u + iv$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 141.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 141.5

Нижняя половина внутренности эллипса  $\frac{4u^2}{(R + \frac{1}{R})^2} + \frac{4v^2}{(R - \frac{1}{R})^2} = 1$  комплексной плоскости  $w = u + iv$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 141.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 141.6

Область, ограниченная ветвями гиперболы  $\frac{u^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} - \frac{v^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 1$  комплексной плоскости  $w = u + iv$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 142.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 142.1

$$\mathbb{C} \setminus \left\{ w : w \in \left( -\infty, -\frac{13}{5} \right] \cup [-1, +\infty) \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 142.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 142.2

Нижняя половина внутренности эллипса  $\frac{u^2}{\left(\frac{17}{8}\right)^2} + \frac{v^2}{\left(\frac{15}{8}\right)^2} = 1$  комплексной плоскости  $w = u + iv$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 142.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 142.3

Верхняя половина внутренности эллипса  $\frac{u^2}{\left(\frac{13}{5}\right)^2} + \frac{v^2}{\left(\frac{12}{5}\right)^2} = 1$  комплексной плоскости  $w = u + iv$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 142.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 142.4

Нижняя половина внутренности эллипса  $\frac{u^2}{\left(\frac{5}{4}\right)^2} + \frac{v^2}{\left(\frac{3}{4}\right)^2} = 1$  комплексной плоскости  $w = u + iv$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 142.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 142.5

$$\mathbb{C} \setminus \left[ -\frac{37}{6}, +\infty \right).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 142.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 142.6

$$\mathbb{C} \setminus \left\{ w : w \in \left( -\infty, -\frac{5}{4} \right] \cup [-1, +\infty) \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 143.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 143.1

$$w = \sqrt{\frac{1}{2} \left( \frac{17}{4} - \left( z + \frac{1}{z} \right) \right)}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 143.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 143.2

$$w = \xi + \sqrt{\xi^2 - 1}, \text{ где } \xi = \frac{8}{21} \cdot \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) + \frac{13}{21}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 143.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 143.3

$$w = \sqrt{\frac{1}{2} \left( \frac{10}{3} - \left( z + \frac{1}{z} \right) \right)}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 143.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 143.4

$$w = \sqrt{\frac{\xi + \frac{17}{8}}{\frac{17}{8} - \xi}}, \text{ где } \xi = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 143.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 143.5

$$w = \xi + \sqrt{\xi^2 - 1}, \text{ где } w(i) = (1 - \sqrt{2})i, \xi = \frac{20}{111} \cdot \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) + \frac{91}{111}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 7. Функция Жуковского

Ответ к задаче 143.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 143.6

$w = \tau + \sqrt{\tau^2 - 1}$ , где  $\tau = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) - \frac{1}{4}$  и выбирается одна из однозначных ветвей корня.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 158.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 158.1

$$w_1(D_1) = \{w : 1 < |w| < 4\} \setminus [-4, -9/4], \quad w_2(D_2) = \{w : |w| < 64\} \setminus [-64, 0]$$
$$w_3(D_3) = \{w : |w| < 16\} \setminus [-16, 0].$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 158.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 158.2

$$w_1(D_1) = \mathbb{C} \setminus \{w : w \in [9, 36]\}, \quad w_2(D_2) = \{w : 0 < \arg w < \frac{\pi}{5}, 25 < |w| < 100\}$$
$$w_3(D_3) = \mathbb{C} \setminus \{w : \arg w = 0\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 159.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 159.1

$w_1(D_1) = \{w : e^2 < |w| < e^4, \pi/6 < \arg w < \pi/3\}$ ,  $w_1(D_2) = \{w : 0 < \operatorname{Re} w < 1, 0 < \operatorname{Im} w < \pi\}$ ..

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 159.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 159.2

$w_1(D_1) = \{w : 4 < |w| < 8, \pi/12 < \arg w < \pi/3\}$ ,  $w_1(D_2) = \{w : 1 < \operatorname{Re} w < \ln 6, 0 < \operatorname{Im} w < \pi/2\}$ ..

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 159.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 159.3

$w_1(D_1) = \{w : 1 < |w| < 2, \pi/6 < \arg w < \pi/3\}$ ,  $w_1(D_2) = \{w : 0 \leq \operatorname{Re} w \leq 1, 0 \leq \operatorname{Im} w \leq \pi/2\}$ ..

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 160.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 160.1

$$w(D) = \{w : \operatorname{Re} w > 0\} \setminus [0, 1].$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 160.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 160.2

$$w(D) = \{w : \operatorname{Im} w > 0\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 160.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 160.3

$$w(D) = \{w : |w| < 1\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 160.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 160.4

$$w(D) = \{w : \operatorname{Im} w > 0\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 160.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 160.5

$$w(D) = \{w : \operatorname{Re} w > 0\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 160.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 160.6

$$w(D) = \mathbb{C} \setminus \{(-\infty, -1] \cup (1, +\infty)\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 161.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 161.1

$$w = \exp(i\pi(z - 6)/6).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 161.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 161.2

$$w = e^{i3z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 161.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 161.3

$$w = \exp((1 - i)z\pi/2).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 161.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 161.4

$$w = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 161.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 161.5

$$w = -(1 + iz^4)/(i + z^4).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 161.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 161.6

$$w = \ln z + 2.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 162.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 162.1

$$w = \frac{1}{B\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)} \int_0^z \xi^{-\frac{2}{3}} (1 - \xi)^{-\frac{2}{3}} d\xi.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 162.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 162.2

$$w = \frac{1}{B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)} \int_0^z \xi^{-\frac{3}{4}} (1 - \xi)^{-\frac{3}{4}} d\xi + 2.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 162.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 162.3

$$w = \frac{1}{B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)} \int_0^z \xi^{-\frac{1}{2}} (1 - \xi)^{-\frac{3}{4}} d\xi.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 162.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 162.4

$$w = \frac{1}{B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)} \int_0^z \xi^{-\frac{3}{4}} (1 - \xi)^{-\frac{1}{2}} d\xi.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 162.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 162.5

$$w = \frac{1}{B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)} \int_0^z \xi^{-\frac{3}{4}} (1 - \xi)^{-\frac{3}{4}} d\xi + i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 162.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 162.6

$$w = \frac{-4}{B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)} \int_0^z \xi^{-\frac{3}{4}} (1-\xi)^{-\frac{3}{4}} d\xi + 3 + 3i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.1

$$w = (z + 1)^2 / (z - 1)^2;$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.2

$$w = i\sqrt{-z^2 - h^2};$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.3

$$w = i\sqrt{-e^{2z} - 1};$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.4

$$w = (z - 1)^2 / (z + 1)^2;$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.5

$$w = e^{-2\pi(1/z+i/2)};.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 168.6

$$w = i\sqrt{\frac{z-1}{z}}; .$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.7



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 168.7

$$w = i\sqrt{i(1/z + i)};$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.8



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.8

$$w = e^{2\pi i/z};.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.9



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.9

$$w = (z - \sqrt{3} - i)^2 / (z + \sqrt{3} - i)^2;$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.10



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.10

$$w = i((z + i)/(z - i))^2;$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.11



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 168.11

$$w = i\sqrt{i(z-1)/(z+1)};$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.12



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.12

$$w = \sqrt{(z+i)/(i-z)};.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.13



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.13

$$w = \sqrt{(z+1)/(1-z)};$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.14



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.14

$$w = e^{-i\pi/8} \sqrt{z - j};$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.15



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.15

$$w = \sqrt{z^2 + h^2}/z;$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.16



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.16

$$w = \frac{4}{\pi} \left( \ln \frac{z+i}{z-i} - i \frac{\pi}{2} \right);$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.17



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 168.17

$$w = i((\sqrt{z} + 1)/(\sqrt{z} - 1))^2;$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.18



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.18

$$w = \sqrt{(z+1)/(z-1)};.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.19



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 168.19

$$w = \sqrt{\left(\frac{z-1}{z+1}\right)^2 + 1};$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 8. Отображение с помощью элементарных функций

Ответ к задаче 168.20



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 168.20

$$w = \sqrt{\frac{1}{2} \left( \frac{5}{2} - z - \frac{1}{z} \right)}; .$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 172.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 172.1

А) 1; б) 2.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 172.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 172.2

А)  $2(i - 1)$ ; Б)  $-2(1 + i)$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 172.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 172.3

А)  $\frac{1}{2} + 4i$ ; б)  $\frac{3}{2} + 3i$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 172.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 172.4

А) 0; б) 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 172.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 172.5

A)  $-2i\sqrt{2}$ ; б)  $-2i\sqrt{2}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 172.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 172.6

А)  $1 + \frac{i}{3}$ ; б)  $1 - i$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 173.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 173.1

А)  $\pi$ ; б)  $-\pi$ ; в) 0; г) 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 173.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 173.2

А)  $\frac{\pi}{3}$ ; б)  $-\frac{\pi}{3}$ ; в) 0; г) 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 173.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 173.3

А)  $-2\pi i$ ; б)  $2\pi e i$ ; в)  $2\pi(e - 1)$ ; г) 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 173.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 173.4

А)  $-\frac{2\pi}{15}i$ ; б)  $\frac{\pi}{5}i$ ; в) 0; г) 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 173.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 173.5

А)  $\frac{2\pi}{63}i$ ; б)  $-\frac{\pi}{9}i$ ; в) 0; г) 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 173.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 173.6

А)  $-\frac{\pi}{4}i$ ; б)  $\frac{\pi}{4}i$ ; в) 0; г) 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 174.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 174.1

А) 0; б)  $\frac{2i}{\pi}$ ; в)  $\frac{2i}{\pi}$ ; г) 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 174.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 174.2

А) 1; б)  $-\frac{e}{2}$ ; в)  $1 - \frac{e}{2}$ ; г) 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 174.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 174.3

А)  $-4\pi i$ ; Б)  $4\pi i$ ; в) 0; г) 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 174.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 174.4

А) 0; б) 0; в) 0; г) 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 174.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 174.5

А)  $-\frac{\pi i}{32}(7 \sin 1 + 4 \cos 1)$ ; б)  $\frac{\pi i}{32} \sin 3$ ; в)  $-\frac{\pi i}{32}(7 \sin 1 + 4 \cos 1 - \sin 3)$ ; г) 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 174.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 174.6

А)  $-4\pi i$ ; Б)  $\frac{11\pi i}{e}$ ; В)  $\left(\frac{11}{e} - 4\right)\pi i$ ; Г) 0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 175.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 175.1

$-2\pi i, -\pi i, 0, \pi i, 2\pi i.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 175.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 175.2

$-2\pi i, -\pi i, 0, \pi i, 2\pi i.$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 175.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 175.3

$18\pi i, -14\pi i, 4\pi i, 0.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 175.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 175.4

$$\frac{\pi}{3} e^{3i}, -\frac{\pi}{3} e^{-3i}, \frac{\pi i}{6} \sin 3, 0.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 175.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 175.5

$$\frac{\pi}{4}(2 - i), -\frac{\pi}{4}(2 + i), \frac{\pi}{2}i, \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}i, -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}i, -\frac{\pi}{2}i, 0.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 9. Интегральная теорема и формула Коши

Ответ к задаче 175.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 175.6

$$-\frac{\pi}{10}(1+2i), \frac{2\pi}{5}i, \frac{\pi}{10}(1-2i), -\frac{\pi}{10}(1-2i), -\frac{2\pi}{5}i, \frac{\pi}{2}(1+2i), 0.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 10. Степенные ряды



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 196.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 196.1

$$R = 2, D = \{z : |z - i| < 2\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 196.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 196.2

$$R = \frac{1}{3}, D = \left\{ z : |z + 1| < \frac{1}{3} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 196.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 196.3

$$R = \frac{1}{5}, D = \left\{ z : |z - 1 - i| < \frac{1}{5} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 196.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 196.4

$$R = 1, D = \{z : |z| < 1\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 196.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 196.5

$$R = \frac{1}{e}, D = \left\{ z : |z + i| < \frac{1}{e} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 196.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 196.6

$$R = \frac{1}{4}, D = \left\{ z : |z - i| < \frac{1}{4} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 197.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 197.1

$$\frac{R}{3}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 197.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 197.2

*R.*

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 197.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 197.3

$\infty$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 197.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 197.4

$R^4$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 197.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 197.5

0.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 197.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 197.6

$R$ , если  $|z_0| \leq 1$  и  $\frac{R}{z_0}$ , если  $|z_0| > 1$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 198.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 198.1

Расходится во всех точках.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 198.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 198.2

Сходится во всех точках кроме  $z = 1$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 198.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 198.3

Сходится во всех точках.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 198.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 198.4

Сходится во всех точках кроме  $z = -1$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 198.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 198.5

Сходится во всех точках кроме  $z = 1$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 198.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 198.6

Сходится во всех точках.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 199.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 199.1

$$\frac{z}{(1-z)^2}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 199.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 199.2

$$\frac{1}{(1+z)^2}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 199.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 199.3

$-\ln(1 - z)$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 199.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 199.4

$$\frac{2}{(1+z)^3}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 199.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 199.5

$\ln(1 + z)$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 10. Степенные ряды

Ответ к задаче 199.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 199.6

$$\frac{1}{(1+z^2)^2}$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 11. Ряды Тейлора



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 216.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 216.1

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{4^{n+1}}, \quad D = \{z : |z| < 4\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 216.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 216.2

$$\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2i)^{2n}}, \quad D = \{z : |z| < 2\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 216.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 216.3

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-i)^n}{(2i)^{n+1}}, \quad D = \{z : |z-i| < 2\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 216.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 216.4

$$2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{(1-i)^{n+1}}, \quad D = \{z : |z-i| < \sqrt{2}\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 216.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 216.5

$$\frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-1)^n}{3^n}, \quad D = \{z : |z-1| < 3\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 216.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 216.6

$$3 \sum_{n=0}^{\infty} ((-1)^n - 3)(z - 2)^n, D = \{z : |z - 2| < 1\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 217.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 217.1

$$\frac{1}{e} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^n}{n!}, \quad D = \{z : |z| < +\infty\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 217.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 217.2

$$e^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^n}{n!}, D = \{z : |z| < +\infty\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 217.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 217.3

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{4^{n-1}}{(2n-1)!} z^{2n-1}, D = \{z : |z| < +\infty\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 217.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 217.4

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} z^{2n}, D = \{z : |z| < +\infty\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 217.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 217.5

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(z - \frac{\pi}{4}\right)^{2n} - \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} \left(z - \frac{\pi}{4}\right)^{2n-1}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 217.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 217.6

$$\cos i \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n}}{(2n)!} z^{2n} + \sin i \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^{2n-1}}{(2n-1)!} z^{2n-1}, D = \{z : |z| < +\infty\}. \quad [\text{Вернуться к условию}]$$



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 218.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 218.1

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n, D = \{z : |z| < 1\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 218.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 218.2

$$2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{2n+1}, \quad D = \{z : |z| < 1\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 218.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 218.3

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)z^n, D = \{z : |z| < 1\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 218.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 218.4

$$\sum_{n=1}^{\infty} n z^{3n-1}, D = \{z : |z| < 1\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 218.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 218.5

$$z^2 + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \left( \frac{z^{n+1}}{n} + \frac{z^n}{n} \right), D = \{z : |z| < 1\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 218.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 218.6

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n z^{2n-2}, \quad D = \{z : |z| < 1\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 219.1

$$z + \frac{1}{2}z^3 + \frac{5}{24}z^5 + \dots, D = \left\{ z : |z| < \frac{\pi}{2} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 219.2

$$z + \frac{3}{2}z^2 + \frac{11}{6}z^3 + \dots, D = \{z : |z| < 1\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 219.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 219.3

$$-1 + \frac{1}{2}z + \frac{1}{12}z^2 + \dots, D = \{z : |z| < 1\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 219.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 219.4

$$1 - 2z - 2z^2 + \dots, D = \left\{ z : |z| < \frac{1}{4} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 219.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 219.5

$$1 + z^2 + \frac{z^4}{3} + \dots, D = \{z : |z| < +\infty\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 11. Ряды Тейлора

Ответ к задаче 219.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 219.6

$$z - \frac{z^3}{3} + \frac{2}{15}z^5 - \dots, D = \left\{ z : |z| < \frac{\pi}{2} \right\}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 233.1

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 233.2

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 233.3

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 236.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 236.1

$$z_1 = 3i, z_2 = -3i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 236.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 236.2

$$z_1 = 2i, z_2 = -2i.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 236.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 236.3

$$z_k = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 236.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 236.4

$$z_k = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 236.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 236.5

$$z_k = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 236.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 236.6

$$z_k = \sqrt[3]{\frac{\pi}{2}} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 237.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 237.1

$n = 3.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 237.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 237.2

$n = 4.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 237.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 237.3

$n = 4.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 237.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 237.4

$n = 3.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 237.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 237.5

$n = 2.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 237.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 237.6

$n = 2.$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 238.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 238.1

$z_1 = 1$  — нуль порядка 2,  $z_2 = -1$ ,  $z_{3,4} = \pm i$  — простые нули.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 238.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 238.2

$z_{1,2}^* = \pm 2i$  — нули порядка 3,  $z_k = 2k\pi i$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , — простые нули.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 238.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 238.3

$z_0 = 0$  — нуль порядка 2,  $z_k = k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ , — нули порядка 3.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 238.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 238.4

$z_{-1,1} = \mp\pi$  — нули порядка 3,  $z_k = k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$ , — простые нули.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 238.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 238.5

$z_{1,2,3,4} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2} i$ ,  $z_5 = 1$ ,  $z_{6,7} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} i$  — простые нули.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 238.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 238.6

$z_0 = 4$  — нуль ветви, для которой  $\sqrt{1} = 1$ ,  $n_0 = 3$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 239.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 239.1

Не существует.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 239.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 239.2

Не существует.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 239.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 239.3

Существует,  $f(z) = 1/(z + 1)$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 239.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 239.4

Не существует.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 239.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 239.5

Существует,  $f(z) = z^2$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 239.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 239.6

Не существует.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 240.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 240.1

Не существует.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 240.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 240.2

Не существует.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 240.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 240.3

Не существует.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 240.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 240.4

Не существует.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 240.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 240.5

Таковыми функциями являются только константы.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 12. Нули аналитической функции. Теорема единственности

Ответ к задаче 240.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 240.6

Не существует.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 13. Ряд Лорана



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 256.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 256.1

$$A) -\frac{1}{2} \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{3^{n+1}} \right); \quad \text{б)} -\frac{1}{4} \sum_{n=-1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{2^n}; \quad \text{в)} \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (3^n - 1) \frac{1}{z^{n+1}}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



## Ответ к задаче 256.2

$$\text{А) } \frac{1+3i}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{z^{n+2}} + \frac{9-3i}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{n-1}}{3^{n+1}}; \quad \text{б) } \frac{3-i}{10} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(1-i)^n}{(z-1)^n} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(z-1)^n}{4^{n+1}} \right];$$
$$\text{в) } \frac{3-i}{10} \sum_{n=0}^{\infty} (i^n - (-1)^n 3^n) \frac{1}{z^n}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 256.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

### Ответ к задаче 256.3

$$\text{A) } - \sum_{n=0}^{\infty} \left( 1 + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \right) z^n; \text{ б) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} z^n; \text{ в) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{z^{n+1}}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 256.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 256.4

$$A) - \sum_{n=-1}^{\infty} z^n; \text{ б) } \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) (z+1)^n; \text{ в) } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{z^n}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 256.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 256.5

$$\text{A) } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}; \text{ б) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2i)^{n+1}} (z-i)^{n-1}; \text{ в) } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{z^{2n+2}}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 256.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 256.6

$$\text{A) } \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n; \text{ б) } - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}; \text{ в) } \sum_{n=1}^{\infty} (1 - 2^{n-1}) \frac{1}{z^n}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 257.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 257.1

$$-\frac{i}{4(z-i)} - \frac{1}{4(z-i)^2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+3)i^n(z-i)^n}{2^{n+4}}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 257.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 257.2

$$\frac{1}{9} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^n}{2^{n+1}} + \frac{1}{9} \sum_{n=-1}^{\infty} \frac{3n+2}{z^{n+2}}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 257.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 257.3

$$\frac{1}{9} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(z-1)^n} + \frac{1}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n+5}{2^{n+2}} (z-1)^n.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 257.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 257.4

$$\frac{1}{9} \left[ -\frac{2}{z} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3n-4}{z^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} \right].$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 257.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 257.5

$$\frac{1}{54} \sum_{n=0}^{\infty} \left[ \frac{(-1)^{n+1}}{4^{n+1}} - \frac{1}{2^{n+1}} \right] (z-1)^n - \frac{1}{9} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{(z-1)^n}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 257.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 257.6

$$\frac{1}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z+1)^{n+1}} + \frac{1}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+2}} (3n+5)(z+1)^n.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 258.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 258.1

$$z^4 - \frac{z^2}{2!} + \frac{1}{4!} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)! z^{2n-4}}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 258.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 258.2

$$\frac{1}{2} + z + z^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)!z^n}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 258.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 258.3

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!(z-1)^{n-1}} + (z-1).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 258.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 258.4

$$(z-1) + 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{(-1)^{n-1} \left( \frac{1}{(2n-1)!} - \frac{1}{(2n+1)!} \right)}{(z-1)^{2n-1}} + \frac{2(-1)^n}{(2n+1)!(z-1)^{2n}} \right].$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 258.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 258.5

$$-\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin\left(1 + \frac{n\pi}{2}\right)}{n!(z-1)^n}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 258.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 258.6

$$\cos 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{(-1)^n 4^{2n} \cos 1}{(2n)!(z-2)^{4n}} + \frac{(-1)^{n-1} 4^{2n-1} \sin 1}{(2n-1)!(z-2)^{4n-2}} \right].$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 259.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 259.1

Нет (в любом кольце, окружающем точку  $z_0 = 0$ , функция не является непрерывной).

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 259.2

Нет.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 259.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 259.3

Нет.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 259.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 259.4

Нет.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 259.5

Да.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 259.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 259.6

Нет.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 266.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 266.1

Нет.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 266.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 266.2

Да.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 266.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 266.3

Нет.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 266.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 266.4

Да.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 266.5

Да.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 266.6

Да.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 266.7

Нет.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 13. Ряд Лорана

Ответ к задаче 266.8



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 266.8

Да.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 272.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 272.1

$z_{1,2} = \pm i$  — полюсы первого порядка.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 272.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 272.2

$z_0 = 0, z_{1,2,3,4} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2} i$  — полюсы первого порядка.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 272.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 272.3

$z_1 = -1, z_{2,3} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$  — полюсы второго порядка.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 272.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 272.4

$z = 0$  — устранимая особая точка.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 272.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 272.5

$z = 0$  — существенно особая точка.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 272.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 272.6

$z_k = 2k\pi$ ,  $k = \pm 1, \pm 2, \dots$  — полюсы второго порядка;  $z = 0$  — полюс первого порядка.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 273.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 273.1

$z = 0$  — существенно особая точка,  $z = \infty$  — полюс первого порядка.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 273.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 273.2

$z = 0$  — полюс второго порядка,  $z = \infty$  — устранимая особая точка.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 273.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 273.3

$z_k = 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  — устранимые особые точки;  $z_k = (2k + 1)\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  — полюсы второго порядка.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 273.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 273.4

$z_k = 2k\pi \pm i \ln(2 + \sqrt{3})$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  — полюсы первого порядка;  $z = 0$  — полюс третьего порядка.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 273.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 273.5

$z = \infty$  — существенно особая точка.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 273.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 273.6

$z = 0$  — полюс второго порядка,  $z = i2k\pi$ ,  $k = \pm 1, \pm 2, \dots$  — полюсы первого порядка.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 274.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 274.1

$z = 0$  — устранимая особая точка,  $z_k = \frac{\pi}{2}(2k + 1)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  — полюсы первого порядка,  $z = \infty$  — предельная точка для полюсов. [\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 274.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 274.2

$z = 1$  — существенно особая точка,  $z = \infty$  — устранимая особая точка.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 274.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 274.3

$z = 0$  — существенно особая точка,  $z = \infty$  — устранимая особая точка.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 274.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 274.4

$z_k = k\pi$ ,  $k = \pm 1, \pm 2, \dots$  — полюсы первого порядка,  $z = \infty$  — предельная точка для полюсов.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 274.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 274.5

$z_k = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  — полюсы второго порядка,  $z = \infty$  — предельная точка для полюсов.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 274.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 274.6

$z_k = \frac{1}{k\pi}$ ,  $k = \pm 1, \pm 2, \dots$  — существенно особые точки,  $z = 0$  — точка, предельная для существенно  
особых точек,  $z = \infty$  — существенно особая точка. [\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 275.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 275.1

Да.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 275.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 275.2

Нет,  $z = \infty$  — предельная точка полюсов.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 275.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 275.3

Нет,  $z = \infty$  — предельная точка полюсов.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 275.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 275.4

Нет,  $z = \infty$  — предельная точка полюсов.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 275.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 275.5

Нет,  $z = \infty$  — предельная точка полюсов.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 14. Изолированные особые точки аналитической функции

Ответ к задаче 275.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 275.6

Нет,  $z = \infty$  — предельная точка полюсов.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 15. Вычисление вычетов



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 291.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 291.1

А) 1; б) 0..

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 291.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 291.2

А) 0; б) 1..

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 291.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 291.3

А)  $\frac{5}{6}$ ; 6) 0..

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 291.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 291.4

А)  $-\frac{1}{2}$ ; б) 0..

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 291.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 291.5

А) 0; б) 1..

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 292.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 292.1

–1..

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 292.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 292.2

0..

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 292.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 292.3

0..

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 292.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 292.4

1..

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 292.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 292.5

???.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 293.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 293.1

А)  $\operatorname{Res}_1 f(z) = e$ ; б)  $\operatorname{Res}_{-1} f(z) = 1..$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 293.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 293.2

А)  $\operatorname{Res}_2 f(z) = 5$ ; б)  $\operatorname{Res}_1 f(z) = 0..$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 293.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 293.3

А)  $\operatorname{Res}_{\pi k} f(z) = 5, k \in \mathbb{Z}$ ; б)  $\operatorname{Res}_1 f(z) = -\sin 1..$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 293.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 293.4

А)  $\operatorname{Res}_{\frac{\pi}{2} + \pi k} f(z) = 5, k \in \mathbb{Z}$ ; б)  $\operatorname{Res}_{\pi} f(z) = -1..$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 294.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 294.1

$$\operatorname{Res}_1 f(z) = 2; \operatorname{Res}_0 f(z) = -2..$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 294.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 294.2

$$\operatorname{Res}_{-1} f(z) = -\frac{17}{54e}; \operatorname{Res}_2 f(z) = \frac{e^3}{27}..$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 294.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 294.3

$$\operatorname{Res}_{e^{\frac{\pi}{4}i}} f(z) = \frac{1}{4} e^{\frac{-3\pi}{4}i}; \operatorname{Res}_{e^{\frac{3\pi}{4}i}} f(z) = \frac{1}{4} e^{\frac{-9\pi}{4}i}; \operatorname{Res}_{e^{\frac{-3\pi}{4}i}} f(z) = \frac{1}{4} e^{\frac{9\pi}{4}i}; \operatorname{Res}_{e^{-\frac{\pi}{4}i}} f(z) = \frac{1}{4} e^{\frac{3\pi}{4}i} .. \quad [\text{Вернуться к условию}]$$



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 294.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 294.4

$$\operatorname{Res}_{-1} f(z) = \frac{1}{27}; \operatorname{Res}_2 f(z) = -\frac{1}{27}..$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 15. Вычисление вычетов

Ответ к задаче 294.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 294.5

$$\operatorname{Res}_i f(z) = -\frac{i}{4}; \operatorname{Res}_{-i} f(z) = \frac{i}{4}..$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 299.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 299.1

$$-\frac{\pi i}{2}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 299.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 299.2

0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 299.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 299.3

0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 299.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 299.4

0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 299.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 299.5

$$\frac{\pi i(1+i)}{2}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 299.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 299.6

$6\pi i$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 300.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 300.1

$$-\frac{\pi i}{2e}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 300.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 300.2

$2\pi i$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 300.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 300.3

0.

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 300.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 300.4

π.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 300.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 300.5

$$\sqrt{2\pi}(j-1).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 301.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 301.1

0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 301.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 301.2

$2\pi i$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 301.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 301.3

$2\pi i$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 301.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 301.4

0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 16. Вычисление интегралов с помощью вычетов

Ответ к задаче 301.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 301.5

$2\pi i$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 17. Вычисление определенных интегралов



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 17. Вычисление определенных интегралов





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

Ответ к задаче 304.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 304.1

2п..

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

Ответ к задаче 304.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 304.2

$\pi i..$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

Ответ к задаче 304.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 304.3

2п..

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

Ответ к задаче 304.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 304.4

$\pi i..$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

Ответ к задаче 305.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 305.1

$$\frac{13\pi}{45} \dots$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

Ответ к задаче 305.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 305.2

$$\frac{3\pi\sqrt{2}}{2}..$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

Ответ к задаче 305.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 305.3

$$\frac{5\pi}{32} \dots$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

Ответ к задаче 305.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 305.4

$$\frac{4\pi\sqrt{3}}{9}..$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

Ответ к задаче 305.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 305.5

$$\frac{3\pi}{2\sqrt{2}}..$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

Ответ к задаче 305.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 305.6

$$-\sqrt{2}\pi i..$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

Ответ к задаче 305.7



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 305.7

$$\left(2 - \frac{3}{\sqrt{2}}\right)\pi..$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 17. Вычисление определенных интегралов

Ответ к задаче 305.8



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 305.8

$$\frac{4\pi}{3\sqrt{3}}$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Глава 18. Вычисление несобственных интегралов



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 310.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 310.1

$\pi\sqrt{2}$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 310.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 310.2

$$\frac{2\pi}{3}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 310.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 310.3

$$\frac{2\pi}{3}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 310.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 310.4

$$\frac{\pi}{2}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 310.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 310.5

$\pi^2$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 310.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 310.6

$$-\frac{14\pi}{3^6}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 310.7



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

Ответ к задаче 310.7

$$\frac{\pi\sqrt{2}}{4}.$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 311.1



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 311.1

$\pi/(6 e^{12})$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 311.2



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 311.2

$\pi/(2 e^{12})$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 311.3



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 311.3

$\pi/2$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 311.4



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 311.4

$$\pi(2 \cos 2 + \sin 2)/(2e^4).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)





Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 311.5



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 311.5

0.

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 311.6



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 311.6

$$\pi(e - 1)/(3e^2).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 311.7



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 311.7

$\pi \cos 1 / (2 e^2)$ .

[\[Вернуться к условию\]](#)



Меню

Часть II. Задачи

Ответы

Глава 18. Вычисление несобственных интегралов

Ответ к задаче 311.8



Вверх



Назад



Вперёд



Пред.



След.



Понятия



Помощь



Экран

## Ответ к задаче 311.8

$$-3\pi \sin 6/(2e^2).$$

[\[Вернуться к условию\]](#)